



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

3 vds. 25/-

QA

3

.N563

1744

1

ISAACI
NEWTONI
OPUSCULA
IN TRES TOMOS DISTRIBUTA.

THE
HISTORY OF
THE
CITY OF
NEW YORK

ISAACI
NEWTONI,

EQUITIS AURATI,

OPUSCULA

MATHEMATICA, PHILOSOPHICA

ET

PHILOLOGICA.

Collegit partimque Latinè vertit ac recensuit

JOH. CASTILLIONEUS

JURISCONSULTUS

TOMUS PRIMUS

Continens

MATHEMATICA.

Accessit Commentariolus de VITA AUCTORIS.



LAUSANNÆ & GENEVÆ,

Apud MARCUM-MICHAELEM BOUSQUET
& Socios.

MDCCXLIV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RESEARCH REPORT

NO. 1234

1955

BY

JOHN DOE

AND

JANE SMITH

ILLUSTRISSIMÆ
SOCIETATI REGIÆ

A

SERENISSIMO REGE

CAROLO II.

AD PHILOSOPHIAM PROMOVENDAM

FUNDATÆ,

ET

AUSPICIIS

AUGUSTISSIMI REGIS

GEORGGII

FLORENTI,

OPUSCULA HÆC

A

VIRO IMMORTALI

ejusdem

SOCIO CLARISSIMO, PRÆSIDE DIGNISSIMO,

ISAACO NEWTONO

CONSCRIPTA

DAT, DICAT, DEDICAT,

SEU POTIUS

REDDIT, RETRIBUIT, RESTITUIT

J. CASTILLIONEUS

Collector & Editor.

T v



TU Pater & rerum Inventor; Tu patria nobis
Suppeditas praecepta, tuisque ex, Inclute, chartis
Floriferis ut Apes in saltibus omnia limant,
Omnia nos itidem depascimur aurea dicta,
Aurea, perpetuâ semper dignissima vitâ.

LUCRET. De Rer. Naturâ

Lib. III. vers. 9. & seq.

PRÆFATIO



JOH. CASTILLIONEUS

LECTORIS



TOT summi ingenii nominisque in
 re literaria celebratissimi Viri doc-
 torum Opusculis, immò & Opuf-
 culorum fragmentis ac reliquiis col-
 ligendis, recensendis, & publicandis
 operam dedere, eaque insigni bene-
 ficio Scientiarum cultores affectos
 æqui omnes duxerunt eruditi, ut il-
 lorum exemplo, & istorum judicio,
 simul ac instituti utilitate plus satis
 profectò rationum habeat, quibus sese tueatur, consiliumque
 suum adprobet Censoribus, qui tempus, diligentiam & curam
 impenderit incepto hujusmodi. Quin etiam & rem studiosis,
 ad quorum usus monumenta ingenii doctrinæque pertinere pos-
 sunt, gratam se suscepisse eò magis jure constituet, quò præst-
 tantiora, orbis eruditi sententiâ, dudum habentur, quò insuper
 minùs erant parabilia, ac denique etiam pluribus eruditionis
 partibus illustrandis sunt aptissima. Inde cur ego, *Mathefi Phy-*
sicæque universæ deditus, Opuscula NEWTONI, præ ceteris
Is. Newtoni Opuscula, Tom. I. † id

id genus, elegerim colligenda, nemo earum cultor, quique quo pretio peritis Viri illius sint scripta quævis, vel famâ compere-rit, ut & ex iis esse aliqua, quibus, insuperabili poenè difficul-tate, exteris plerisque carendum in hunc usque diem fuerit, non intelliget continuò. Videbit certè momenta hæc singula, con-junctaque, animum discendi, & in commune aliquid etiam con-ferendi cupidum, excitâsse, impulsisseve tam vehementer, ad hanc ineundam provinciam, ut nec labori parceret, neque sumptibus absterri, aut difficultatibus, quas circumspiciebat, multis magnisque oppidò, à proposito avocari sese pateretur. Sciunt utique, qui frustra toties NEWTONI Scripta omnia comparare sibi laborarunt, vel fortunæ literatis minùs faventis injuriâ, vel Linguae Britannis vernaculæ, quâ Vir illustis plura publicavit, incitiâ nimis sanè communi eruditis aliàs hominibus peregrinis, vel commercii inter Regni illius Bibliopolas, & aliarum Regionum Librarios infrequentia, factum eò usque fuisse, ut ne oculis quidem usurpare potuerint longè hinc diffusi studiosi nonnulla, quorum desiderio maximè tenerentur. Ex-stare porrò alia veluti demersa in aliorum Scriptis pretii non levis, quæ propterea paucis emere licet, itidem notum est. Quibus sin & hoc addatur, nempe, omnium præcellentis illius Philosophi commentationum plenam Gentium aliarum eruditos notitiam nec dum esse consequutos, quarum idcirco nulla vel fera certè futura fuisset cupido, nedum acquisitio; haud malè me de iis mereri, cujus investigatione sollicitâ, voti, statim at-que conceptum erit, compotes fieri jam facillè poterunt, quan-tum saltem optata mihi datum est adipisci, prorsus confido. Reliquum igitur nihil est amplius, quod monere de his necesse sit. Verùm quid præstare conatus fuerim, quibusque auxiliis hanc collectionem susceperim, audire Lectorem interest, tum quæ ad historiam cujuscumque Opusculi spectantia repererim, non ignorare. Ea tamen dumtaxat hîc edisseram, quantum ad scopum meum facient, & ad asserendum Auctori suo NEWTONO, quæ sunt ab eo lucubrata. Cetera Vitæ magni Viri inserenda reservavi.

Et

Et primò quidem, utinam omnia NEWTONI Opuscula colligere potuissem, atque certò scire me omnia collegisse? Sed, cùm cum morientem (a) plures de Antiquitatibus, Historiâ, Mathematicis, Chemiâ, & Theologiâ, dissertationes ineditas reliquissè constet; cùmque etiam nunc (proh pudor!) hoc vitio docti teneantur, ut soli habere malint hujuscemodi thesauros cum summo publici boni detrimento, quàm eos divulgari sine ullo privato damno, quis audeat asserere se omnia cujusvis Scriptoris opera protulisse; seu potius, quis diligentiam suam plura fugisse non vereatur? Hic ergo tibi, benigne Lector, exhibeo non *omnia*, sed *quosquor* invenire licuit, Opuscula NEWTONI: reliqua, si quæ in manum veniant, eadem formâ, typisque, modico pretio, tanquam Appendicem editurus. Quæret forsitan aliquis, cur editionem in tempus illud non distulerim, quo cuncta me adeptum certò scirem? Sed certitudinem hanc nihil creare potest, nisi scriptum Auctoris Opera sua dinumerantis, & sua dumtaxat esse, quæ recensuit, testantis; quapropter, eadem, quæ nunc dico; semper dicendi locus fuisset; cùm præcipuè nihil intentatum, nihil inhausum reliquerim, ut omnium compos fierem. Nam, primò, quantâ potui diligentia, Celeberrimi hujus Viri scripta acquisivi, & conquisitorum indicem ad Clarissimum Doctissimumque GABRIELEM CRAMERUM, in Genevensi Academia Mathematicum Professore, misi, qui, præclarorum omnium Virorum, & idcirco NEWTONI, studiosissimus, atque litterariæ peritissimus historiæ, in Angliâ præterea diù versatus, & summi nominis Anglis familiaris, ea, quæ requirebam, Opuscula omnium optimè poterat indicare, & re ipsâ nonnulla, quæ me fugerant, pro summâ suâ humanitate indicavit: ac deinde, (ut præteream scripta bis à me hoc ipsum obsecrante in publicam lucem emissâ,) doctissimos Anglos aliquot, ut, quæ reperire possent, mihi compararent, exoravi.

Quoniam

(a) Vide ejus Vitam sub fine.

Quoniam de Clarissimo CRAMERO injecta mentio est ; locum opportuniorem non expectabo agendi pro beneficiis, quibus me cumulavit, gratias, & palàm testandi illum mihi hæc molienti ea tribuisse, ut plura à parente proficisci non potuerint. Neque hoc mirum ; siquidem Vir summus utilitatem publicam unicè diligit, eique se totum jamdiu devovit, ut melius pateret, si Vir modestissimus orbem eruditum scire quot & quanta ei debeat, aut passus esset, aut pateretur. Sciant ergo omnes CRAMBRI esse quidquid boni hic invenient, mihi & imbecillitati meæ atque ejus absentia, quidquid mali occurrer, esse tribuendum. Nunc Opuscula omnia singillatim prosequamur.

De Opusculis TOMUM PRIMUM constituentibus.

Seriem ducit *Analysis per Aequationes Numero Terminorum infinitas*. Hanc menſe Julio anno 1669. BAROVIO communicavit NEWTONUS (a) ; BAROVIVS autem COLLINSIO, qui eam transcripsit ; atque postea OLDEMBURGIO (b), qui eam dicit *universalem Methodum Analyticam*, *inſervientem menſurandis Arcibus omnium ejuſmodi Curvarum, & earumdem Perimetrorum, in quibus Ordinata eandem habent communem habitudinem ad Baſim*. Hanc autem Analyſim, de qua loquitur OLDEMBURGIUS, ipſiſſimam noſtram eſſe patet apertiffimè tum ex initio, (*Methodum generalem, quam excogitaveram,*), & ſine (*nec quidquam huiuſmodi ſcio perficiat,*) ibi relatis (c) ; tum ex deſcriptione, qua illic habetur (c). Sed animadvertendum videtur à NEWTONO ſinem pauliſper immutatum fuiſſe ; nam, in eo exemplo, quod OLDEMBURGIUS habuit, legebatur per verbum *perficiat* (d).

Et hæc de Arcibus Curvarum inveſtigandis dicta ſufficiant. Imò ; cum Problemata de Curvarum Longitudine, de Quantitate & Superficie

(a) *Commerc. Epistol. N°: I. pag. 65. 66. edit. ſecundæ.*

(b) *Ibidem N°: XIII. pag. 93.*

(c) *Ibidem pag. 94.*

(d) *Huius Collect. Tom. I. pag. 25.*

perficiæ Solidorum, & de Centro Gravitatis, possint eò tandem reduci, ut queratur Quantitas Superficiæ planæ Lineâ curvâ terminatæ, non opus est quidquam de iis adjungere (a).

Libellum hunc inter papyros à COLLINSIO vitâ functo relictas invenit. Clariss. JONES. descriptum ejusdem COLLINSII manu; &, cùm ex BAROWII litteris tribus (b) ibidem repertis eam esse NEWTONI didicisset, ab eo, ait ille (c); *sciscitatus sum num penes se adhuc esset autographum, quod quidem ille exquirens invenit, & mihi tradidit cum exemplari Collinsiano ad verbum usque conveniens.* Eundem COLLINSII manu descriptum habuerunt quoque Auctores *Commercii Epistolici* (d). Nos illum ab Auctore latine scriptum inde fideliter transcripsimus.

Secundo loco est *Methodus Fluxionum & Serierum infinitarum.* Mens NEWTONI priùs fuerat (e) illam adjungendi KINCKHUYSENI introductioni ad *Analyfin speciosam*, quam ipse prælo paraverat. Deinde, consilium mutans, eam edere constituerat (f) cum *Tractatu de Refractione Lucis & Coloribus*, quem tum * in promptu habebat, ut ipsius verbis utar, (nam Editores *Commercii Epistolici* asserunt hunc Tractatum illum ipsum esse, de quo mentio facta jam fuerat (e), quod liquet etiam ex Auctoris descriptione (g); sed objectiones à NEWTONI de Luce sententiâ natæ eum deterruerunt. Hanc KINCKHUYSENI introductionem à NEWTONO auctiorem redditam, cum hujus Methodi additamento, edendam sibi curæ fore pollicitus est COLLINSIUS (h); videtur autem obsti-

t. 3

natum

(a) Comm. Epistol. N°. XIII. pag. 94. 95. edit. secund.

(b) Hæ Litteræ fuerunt editæ in Comm. Epistol. N°. I. pag. 65. 66. edit. secund.

(c) Præfat. in *Analyf. per Quantitatum Series, Fluxiones, & Differentias*, &c.

(d) Comm. Epistol. N°. II. pag. 67. edit. sec.

(e) Ibidem Nris. XXII. XXIII. pag. 101. 102.

(f) Ibidem N°. LVII. pag. 149. & hujus pag. 334. Tom. I.

* Anno 1671.

(g) Ibidem.

(h) Ibidem N°. XXIII. pag. 102.

natum NEWTONI pacis studium huic negotio obstaculo fuisse. Multo tempore post librum hunc edere, NEWTONO consentiente, decreverat PEMBERTONUS, vetuit autem Auctoris mors. Ait enim Vir Clarissimus (a) se typis mandare decrevisse *mathematicum Tractatum*, quem Isaacus NEWTONUS multo tempore ante scripserat, *prima Fluxionum principia complectentem*; etenim, pergit ille, cum denique exoraveram ut hunc librum divulgari faceret. Omnes computationes examinaveram, & *figuras, partim, paraveram*: sed, cum ultima hujus Tractatus pars nondum esset perfecta, mihi curabat scripta, quibus ea suppleri possent, quae desiderantur. Ejusdem verò interitus obstitit quò minus rem exsequerer. Desideratur autem modus solvendi Problemata, quae ad Quadraturas reduci nequeunt. Siquidem Opusculum hoc tres continet partes, quarum prima de *Seriebus infinitis* agit (b), quae tamen in Tractatu isto non magnam partem obtinebant, ut ait ipse; Secunda circa Fluxiones versatur; Tertia verò docet quomodo Methodus Fluxionum ad Curvarum Geometriam accommodetur. Adjicienda restabat pars ea, quae decreverat *explicare modum solvendi Problemata, quae ad Quadraturas reduci nequeunt* (c); Atque utinam adjecisset. Multum enim perdidimus, licet aliquid de *Fundamentis* ejus posuerit (d). Illum tandem anglicè nobis impertivit Clarissimus COLSONUS, unde ego hunc exhibui.

Prætermittendum autem non videtur eundem Gallicâ Linguâ donatum à Doctissimo BUFFONO, typis excusum fuisse *Lettre Parisiorum* anno 1740. Quam versionem utiliter me consuluisse fateor, & eo nomine Clarissimo illius Auctori gratias multas ago.

Ceterum, ait WALLISIUS (e) se quidem audivisse NEWTONUM aliquid de Seriebus & Quadraturis prælo paratum habuisse

(a) Pemberton a View of Sir Isaac Newton's Philosophy. Prefac. sub fine.

(b) Comm. Epistol. N°. LVII. pag. 149. edit. sec. vel pag. 334. Tom. I. hujus.

(c) Ibidem.

(d) Ibidem.

(e) Oper. Math. Tom. II. pag. 390.

buisse anno 1671., sed quod infortunio quodam flammis periit. Utrùm WALLISIO falsa nunciata fuerint, utrùm aliud exemplum NEWTONUS superstes habuerit, utrùm denique *aliquid* illud à Tractatu hoc diversum fuerit, non definio.

Sequitur Tractatus de *Quadraturâ Curvarum*, quem primò NEWTONUS ipse edidit *Londini* anno 1704, (quamquam Typothetarum negligentia in titulo nostro legatur 1706,) ad finem suæ Optices, unâ cum sequente de *Enumeratione Linearum tertii ordinis*. Ipse usus sum editione Parisiensi collatâ cum eâ, quam Celeberrimus W. JONES curavit divulgandam *Londini* anno 1711, in collectione, cui titulus *Analysis per Quantitatum Series, Fluxiones, ac Differentias, cum Enumeratione Linearum tertii ordinis*.

Hanc ipsam enumerationem appellat Clarissimus BRAGELONGNIUS (a) spectaculum inter pulcherrima & maxima à Geometriâ edita referendum. Cùm NEWTONUS Analysis, quâ hæc Curvarum genera, earumdémque figuras & proprietates detexerat, celavisset; illustrissimus STIRLINGIUS tredecim annis pòst illam explicare aggressus, ejus principia vulgavit in libro, cui titulus *Illustratio Tractatus D. NEWTONI de enumeratione Linearum tertii ordinis*, edito *Oxonia* anno 1717*. Deinde Celeberrimus COEIN-MAC-LAURINUS hoc negotium profecutus est libro edito anno 1720 (b). Postea easdem consideravit Clarissimus NICOLIUS (b), & denique BRAGELONGNIUS (a) supra laudatus.

Hinc habetur *Methodus Differentialis*, quam, Auctore permittente, ex ejus autographo descripsit JONES (d). *Complectitur autem doctrinam describendi Curvas ex datis Differentiis Differentialiarum Ordinarum. Hæc Methodus Differentialis innotuit Problemati ducendi Curvam Parabolici generis per data quocunque Puncta;*

(a) *Memoir. de l'Acad. Royal. des Scienc. An. 1730. pag. 229. edit. Amst. an. 1733.*

* aut 1718. Vide *Memoir. de l'Acad. Royal. An. 1729. pag. 272.*

(b) *Ibidem.*

(c) *Anal. per Quantit. Ser. Flux. & Differ. &c., in Præfat. prope finem.*

Puncta; de quo *Clarissimus Auctor olim mentionem fecerat* (a) in *Epistolâ suâ ad OLDEMBURGIIUM* 24. Octob. 1676, & cujus solutionem dedis in *Lemm. V. lib. III. Princip. Philos.*; non tamen prorsus eandem, quoad constructionem, cum eâ, quam in *praesentiarum tradimus*. Hæc habet JONES loco citato, è quâ *Collectione nostræ Methodi Differentialis* exemplum desumpsimus.

Opusculi sexti Articulus primus proculdubio NEWTONI est, de secundo autem dubitatur; sed quoniam breve est, ad rem facit, & Auctoris ingenium sapere videtur, afferendum censui, melius me facturum arbitratus, siquid alienum ponerem, quàm si quid NEWTONI prætermitterem. Indubia sunt Opuscula reliqua.

Opusculum septimum *Newtonianum* esse testatur FONTENELLIUS (b).

Opusculum decimum & undecimum habentur etiam in *Collectione JONES* (c), & in *Operibus WALLISII* (d). Has editiones inter se diligenter contuli, & uno in loco, ubi varia lectio erat alicujus momenti, eam attuli.

Opusculum decimum tertium legitur in *WALLISII Operibus* (e), est etiam in *JONES Collectione*, sed minùs perfectum quàm in *WALLISII Operibus*. Est excerptum *Epistolarum, Newtonianarum*. Epistolas ipsas habere non potui. Neque id mirum, cùm JONES ipse Anglus, NEWTONO amicus eas habere nequiverit; siquidem excerptum dedit. Hæc Opuscula latinè ab Auctore scripta sunt. Reliqua gallicè edita sunt in libro, cui titulus, *Recueil de diverses pieces sur la Philosophie, la Religion naturelle, l'Histoire, les Mathematiques &c. Par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton & autres Auteurs célèbres*. Iterum edito *Amstelodami apud Franciscum Changuiou an. 1741.*

Tom.

(a) Pag. 340. hujus.

(b) Vide *Newtoni Elogium* in *Hist. de l'Acad. Royale des Sciences* An. 1727.

(c) *Anal. per Quantit. Serier. Flux. & Diff.* pag. 23. 31.

(d) Tom. III. pag. 622. & 634.

(e) Tom. II. pag. 391.

Tom. secund. initio & gallicè litteræ LEIBNITII, anglicè NEWTONI in libro inscripto Historia Fluxionum sive Tractatus originem & progressum peregregiæ istius Methodi brevissimo compendio, (& quasi synopticè) exhibens. Per Josephum Raphsonum A. M. & R. S. S. Londini, typis Pearsonianis an. 1715. à pag. 97. ad finem, unde versas eas hìc exhibui. Et hæc quidem de Tomo Primo.

De Opusculis TOMUM SECUNDUM componentibus.

Secundus initium ducit à Mundi systemate, quod Angli omnes NEWTONO tribuunt. Priùs editum fuit versum in Anglum sermonem, deinde verò latinè, ut ab Auctore conscriptum fuerat, & nos eum sistimus fideliter à latinâ editione transcriptum.

De Lectionibus Opticis quæ sequuntur, optimè, censeo referam partem præfationis editioni Londinensi præfixæ. Ibi dicimus esse has Prælectiones publicas primas, quas NEWTONUS Cantabrigiæ habuit, quando BARROVIUS anno 1669 ei concessit munus professorium in Cathedrâ Lucasianâ. Hunc librum edidisset ipse Auctor, nisi ineptæ quorundam imperitorum cavillationes eum deterruissent. (Hic forte est Tractatus ille de Refractione Lucis & Coloribus, quem, edendi cum Serierum infinitarum & Fluxionum Methodo consilium cœperat NEWTONUS.)

Liber de Opticis anno 1704 editus ab hoc tractatu haud parum differt. Multa quidem in utroque inveniuntur eodem sensu, sed ratione diversâ tradita; multa tamen præclara hìc occurrunt, quæ in altero non habentur. Ibi enim Auctor cavisse, quantum potuit, videtur, ne demonstrationes geometricas cum argumentis philosophicis immisceret; & ubi necesse fuit Propositionem mathematicam proponere, ejus demonstratio vix unquam occurrit. Contrà autem, hìc omnia geometrica in hoc argumento necessaria fusè demonstrat; quæ forsitan in altero libro ideo omiserit, quoniam haud dubitavit, quin hæ prælectiones aliquando lucem essent

Is. Newtoni Opuscula; Tom. I

††

visuræ;

visuræ; cùm non modò publicè Cantabrigiæ lectæ in Archivis fuerant repositæ, sed etiam alia exemplaria in amicorum manibus adservabantur. Quod spectat ad prima optices elementa, auctor noster hìc ubique BARROVII prælectiones opticas sequitur; & quæ, ille de omni luce scripserat, NEWTONUS persequitur ulteriùs, & applicat ad diversam Radiorum Refrangibilitatem; rem BARROVIO ignotam, sed ab eo omnino probatam quando ei ab auctore nostro explicata fuit; quod una ex epistolis D. COLLINSII in Commercio epistolico edita testatur, ubi BARROVIUS de his prælectionibus loquens, opus vocat, quò majus præsens ætas vix protulit. Hic etiam multæ propositiones demonstrantur, quas auctor cum BARROVIO communicavit, & in prælectionibus ejus, demonstrationibus prætermisissis, editæ fuere. Hic nimirum demonstratur modus illius focum superficierum sphæricarum inveniendi, & in omnibus aliis curvis locum habere ostenditur ope Radii, qui dicitur, curvaturæ; item causticæ, (quas vocant) à refractione ortæ hìc determinantur. Has utique causticas in superficiebus sphæricis, & ipse BARROVIUS determinavit. Hisce verò prælectionibus NEWTONUS in curvis omnibus Radii curvaturæ earum ope has causticas exhibet.

Harum prælectionum exemplum NEWTONUS olim GREGORIO astronomiæ Professore Saviliano dedit, à quo desumptum est illud unde hæc editio descripta est, quod summâ fide & curâ descriptum fuisse cum eo GREGORII conferentes invenimus. Exemplum autem Gregorii, cùm ab ipso NEWTONO fuisset acceptum, non dubitavimus, quin perfectum esset; sed postquam editio nostra typis fuerat impressa, audivimus exemplum illud Cantabrigiæ, in Academia archivis asservatum, magis esse absolutum; cujus exemplum nacti, ex collatione rem ita esse invenimus. Differentias igitur unà cum erratis typographicis ad libri calcem adnotavimus. (Nos autem eas locis suis opposuimus.) Notularum, quas Editor addiderat, eas reliquimus, quibus loca indicantur ad quæ Newtonus respicit,
vel

vel idem corrigitur. Unam aut alteram, quibus explicabatur, omisimus, quia ejus explicandi locus hic non est.

Ceterum cum hujus opusculi editio satis mendosa sit, & cum verosimillimum sit, non omnes Typographicos errores, in erratorum Indice, comprehensos fuisse; non pauca & conjecturâ correxi; sed quæ solùm ad stylum spectarent; & id quidem maximâ sobrietate, ita ut potius verear, ne reprehendar, quòd non satis NEWTONI latinum sermonem ad nativum nidorem restituerim, quàm quòd nimis audacter id fecerim.

Opusculum XIX. è Transactionibus totum desumptum est. Latine ab Auctoribus scripti fuerunt Articuli XII. XIII. XIV. XV. & XVI. cetera ex Anglo sermone verti. Ante Articulum XXXI. legitur in Transactionibus brevis dissertatio continens Refractionum historiam, & alia ad rem facientia, quam, quia NEWTONI non erat prætermisi.

Opusculum XX desumpsi ex HARRIS *Lexico Technico*, qui, illud à NEWTONO scriptum fuisse testatus, duo cum Auctoris veniâ affert exempla, latinum alterum autographum, alterum Anglicum à se concinnatum. Duo hæc exempla non paucis discriminibus inter se dissentiunt, quæ, licet Auctori fuerint approbata, prætereunda censui, quia levissima sunt. Sed hoc adest notatu dignum. Pag. 414. lin. 11, & 12. Tomi nostri secundi habetur. *Si Particula acida minori proportionem cum terrestribus jungantur, ut ab iis supprimi & occultari videantur.* Anglicum verò sonat. *Si hæc acida Particula jungantur terreis dumtaxat in parvâ Quantitate, adeò firmiter ab illis retinentur, ut omnino ab iis supprimi, & occultari videantur.* Et mihi quidem hæc secunda lectio ita primæ antestare videtur, ut diu dubitaverim an hanc afferrem, primamque supprimerem, sed Editoris fidei magis consonum judicavi Textum fideliter exhibere, & de hoc discrimine hoc loco monere.

Ultimum locum occupat *Scala Graduum Caloris & Frigoris*. Edita hæc fuit in Transactionibus Philosophicis sine Auctoris nomine; sed eam apertè NEWTONO tribuit COTTESIUS

aut ejus Interpres. (a) Ad eam quoque respicere videtur NEWTONUS (b) ipse, dum ait, *Thermometro expertus sum, quòd septuplo solis æstivi calore aqua ebullit*, ut optime notat Doctissimus Interpres. (b)

Sic igitur perlustrato Tomo secundo ad tertium veniamus.

De Opusculis TOMUM TERTIUM conficiendis.

De *Brevibus Chronicis* hæc habeo. (c) Dignissima Wallia Princeps, & deinde Britannia Regina, quæ ab ipso NEWTONO nonnulla de Chronologiâ suâ didicerat, eum per virum doctrinâ & sanguine nobilissimum, Abbatem CONTI, Patricium Venetum tunc in Britannia degentem, accivit petitura ea, quæ de Chronologiâ scripserat. Ille, scripta hæc imperfecta esse causatus, eorumdem summarium se confecturum recipit. Brevi conficit, affert, eò adigitur, ut ejus exemplum cum nullo communicandum Abbati CONTI impertiret. Hic postea, *Lutetiam Parisiorum* delatus, tantum thesaurum omnino celandum non putavit; quo factum est ut *Brevia Chronica*, in Gallicam Linguam à Clarissimo FRERETO versa cum quibusdam ejusdem observationibus, Auctore frustra renuente, ederentur *Lutetia Parisiorum* anno 1725. Deinde, post NEWTONI mortem, anglicè typis excusa fuerunt cum Chronologiâ, unde ego ea in Latinum sermonem verti. Ceterum, de ipsâ Wallia Principe, reor, verba facit (d) noster in Apologiâ suâ pro *Brevibus Chronicis*.

Asserit NEWTONUS ipse (e) se *Cantabrigia* degentem Historiâ & Chronologiâ reficere solitum, dum alia studia fatigatus

(a) Leçons de Physique expérimentale &c. traduites de l'Anglois de Mr. Cottes &c. à Paris 1742. pag. 384.

(b) Princip. Mathemat. cum Comment. P.P. Thoma le Sueur & Fracisci Jacquier Tom. III: Par. Prim. pag. 51. 52.

(c) Ex Elogio Newtoni supra cit. collato cum Opusc. XXIV. Hujus collec. T. III. pag. 275.

(d) Tom. III. hujus Collect. pag. 276. 277.

(e) Ibid. pag. 280.

tus intermittere cogeatur. Hinc orta est ejus *Chronologia*, quam ut publicæ luci destinaret, nondum animum inducere poterat anno 1725. Tamen, paulò ante quàm mortuus est, eam emendavit & edere constituerat (a), quod effectum fuit à CONDUITTO, ejus affine, anno 1728, qui mox (b), quòd, cùm Caput quintum cum aliis transcriptum non esset, dubitandum videbatur, an Auctor illud vulgare decrevisset. Quia tamen erat inter ejus scripta, &, (ut patet,) ad hujus operis prosecutionem pertinet, non omittendum censuit. Postea, eodem anno ab Anonymo, cui multum me debere fateor, in gallicam linguam versa typis vulgata fuit *Lutetia Parisiorum*.

Observationes ad DANIELIS vaticinia, nec non ad Sancti JOANNIS Apocalypsim, pariter post scriptoris interitum anno 1733 editæ fuerunt anglicè. Eisdem latinitate donavit egregius verbi divini minister *Guilielmus SUDERMANNUS* qui eas edidit Amstelodami anno 1738. Cùm Doctissimus Interpres multum operæ in hac versione impenderit, & cùm illam optimè exceperint Docti, melius me facturum putavi, si eam afferrem, quàm si novam, multo minoris pretii certè futuram, concinnarem. Jam Interpretem ipsum de hoc NEWTONI libello, & de versione suâ loquentem audiamus.

Quas tibi offerimus, Lector, Illustrissimi NEWTONI lucubrationes, non commentarium, (quem vocant,) ad DANIELEM & *Apocalypsim*, continent. *Observationum* illis, quod attendas, nomen est. Non singula hìc explicantur verba; minus, etiam, minutias sectatur Noster: nec ulla, tamen, in his vaticiniis extat res memorabilior, quæ, quòd referenda sit, ipsius judicio, non, in genere, saltem, innuat. Ex ipsis rerum eventibus vaticinia interpretatur, & hos, quidem, limites prætergredi, summo jure, ipsi stultum ac ridiculum videtur. Ceterum, absque ambagibus suam sententiam exponit, rerumque gestarum historiâ illustrat.

†† 3

Supereſt,

(a) Monit. in Chronol. edit. Londinen.

(b) Ibidem.

Supereſt, ut quid, hac in verſione & editione, ego præſtiterim, paucis exponam. Quantum potui Latinè locutus ſum; nec tamen, in rebus plerumque Eccleſiaſticis, omninò vocibus Barbaris abſtinere licuit; quibus ipſis, tamen, vix, niſi cùm vel prorſus, vel eàdem notione, Latinæ deérant, uſus ſum. Ceterùm multùm abeſt, ut ſtylus ſit, qualem vel ipſe cupiebam, vel reddere eum potuiſſe mihi videor. In alienis vertendis, ipſius Auctoris ſtylo, quantum poſſit, inhærendum eſſe Interpreti cenſeo. Simpliſſimus, verò, eſt ſtilus NEWTONI. Aliis nihilominus, phraſibus & vocibus hìc illic uti licuiſſet. Scias, autem, Lector, me, poſtquàm integram hanc verſionem adornàſſem adedò majorum negotiorum majori copiâ fuiſſe prohibitum quantum decreveram temporis illi limandæ impendere, ut vel ipſa ejusdem editio hac de cauſâ nunquam fortasſe fuiſſet proditura, niſi illam fermè qualis eſſet emittere, in eorum gratiam qui Anglica non intelligunt, quàm premere, melius duxiſſem. Porrò, Sacræ Scripturæ loca, Noſtro citata, ſimpliciter, prout hìc ea vel ipſe vertit, vel ex Anglicâ verſione deſumſit, Latinè reddidi, nullam ex Latinis quæ exſtant verſionibus ſequutus, eò quòd ſæpiùs ipſa Anglicana verſio ab aliis, ſæpiùs etiam NEWTONUS ab illâ differt. Eodem modo egi in locis, Noſtro ex veteribus & Eccleſiæ Patribus citatis. Ubicumque Anglicè ea promebat, Latinè ea verti; ubicumque ipſe Latinè, ſive ex ſuâ, ſive ex aliorum interpretatione, ea dabat, verbotenus deſcripſi. Sæpiſſimè aliter facere omninò non licuit, multis eorum, quos citat NEWTONUS, Auctorum, non inſtructo; atque hoc ipſum in cauſâ fuit, quòd non ſemper, ubi ſuos ille Auctores adſcribit, & loca diſtinctè adnotat, num id rectè fecerit, conſulère potuerim. Sæpiùs, itaque, hoc factum, ſæpiùs etiam citationes indè emendatæ: ſæpiùs notata Auctorum, quos nomine tenus dumtaxat Noſter appellabat, loca. Sæpiùs, autem, fieri non potuit, cùm nec ipſos Auctores aliquando noſter innueret. Vitia, inſuper, Typographica ſuſtuli; ex. gr. p. 400. bis legebatur *Philometor*, tùm pro *Epiphane*, tùm pro *Seleuco Philopatore*. Aliquando tamen Lectores vitii monendos eſſe, cenſui,

cenfui, ut p. 326 &c. Aliquando, etiam, bis eadem occurrerant, ubi ſemel omittenda duxi; ſcilicet, non tantum pag. 362 & 406, ubi illud monui, verum etiam pag. 355 & 356. Præter animadverſiones quafdam, & ſummaria rerum in margine, tres indices ad calcem adjeci. (Quorum duos rejeci, ne liber nimium excreſceret, alterum inter meum invenies.)

De Notis, autem, pauca monenda ſunt. Meas, ab illis quæ Auctori debentur, unciculis, quibus illæ includuntur, diſtinctas videbis. Longè autem plura adnotare erat animus, ſed eadem, cujus mentionem feci, negotiorum majorum, & quæ minimè negligi fas eſt, copia, obſtitit quò minus variis rebus penitiùs investigandis otium ſuppeteret: quo ſi majori gaviſus fuiſſem, de fundamentis expoſitionum NEWTONI & aliorum, præſertim quod ad vaticinium *de ſeptuaginta hebdomadibus*, egiſſem diſtinctiùs. Eadem mihi otii penuria in cauſa fuit, quare non examinaverim, num rectè, nùmve perperam Noſter hiftorias, (ſi qua de iis ſit inter Viros Doctos controverſia) referat; quod tamen aliquatenus feci ad initium Cap. IX. Et ad illud quidem caput, quid ad ſingula præſtare intenderam, ſpecimen exhibui. Non, itaque, credendum, me, ubicumque nihil notavi, vel ejuſdem cum noſtro eſſe ſententiæ, vel nihil notandum duxiſſe. Multa erant præ manibus, verum ulterius expendenda, aliique ad illa conſulendi ſcriptores, priùs quàm par eſſet ea emitte-
tere: atque hæc omittenda potiùs, quàm non coſta ſatis tibi offerenda, videbantur. Uno loco, paginâ, ſcilicet, 422, ad hanc meam Præſationem te remitto, quòd, variis de cauſis, melius videbatur, hic, quàm illic, quæ neceſſe erat, monere. Docet ibi Noſter, in variarum quæ memoraverat, ſuperſtitio-
num propagatione anteaſignanos fuiſſe Monachos, atque hiſce ducem ANTONIUM. Egerat, autem, præcipuè de invocatione Sanctorum, atque hanc in Eccleſiam introductam dixerat honoribus, Sanctorum reliquiis exhibitis, eò maximè, quòd Ægyptii Martyrum cadavera inhumata, in lectulis, privatim in ædibus ſuis, ſervabant. Fuit, autem, in Angliâ, qui NEWTONUM poſtremæ oſcitantiz accuſavit, eò quòd harum ſuperſtitio-
num

stitutionum non tantum eximium promotorem faciat ANTONIUM, verum etiam, & hoc praesertim ex ATHANASII loco citato id probaretur: integer, enim ATHANASII locus, cujus partem Noster citat, alienissimum ab iis superstitionibus fuisse ANTONIUM, iudice hoc Anonymo, testatur. Hæc cum accusatio, fortè fortunâ, mihi innotuisset, ATHANASIUM consulendum, atque omnia quò respicit, hîc describenda censui. Ita, ergo, Episcopus Alexandrinus, in *Vita ANTONII*, versùs finem, *Operum Vol. II. pagg. 501. &c. Editionis Parisiensis, annâ 1627.* Quis, verò, *vita finis ipsi fuerit, æquum est & me commemorare, & vos cupide audire, cum & hoc amulationem mereatur.* Monachos, more suo, in monte exteriori visibat: divinâque providentiâ de vita sua exitu certior factus; postremum vos jam viso, inquit fratribus, &c. — Ad hæc cum fratres ipsum, ut maneret secum, vel invitum, adigere conarentur, ibidemque vitâ fungi, refragatus est, cum alias ob multas causas, quòd ipse silentio ostendit, tum ob hanc potissimum: *Amant Egyptii piè defunctorum, atque in primis sanctarum Martyrum corpora funerare quidem & linteis involvere; non autem mandare terra, sed, lectulo imposta, intra privatos parietes retinere; mortuos eâ ratione honore se afficere existimantes.* ANTONIUS idcirco sapius Episcopos rogavit ut populum erudirent; similiter etiam laicis pudorem iniecit, & mulieres objurgavit; hoc neque legitimum, neque omnino sanctum esse adserens. Nam & Patriarcharum & Profetarum corpora, ad hunc usque diem sepulchris servari, ipsum etiam Domini corpus in monumentum positum fuisse, saxum quoque obvolutum, quo segeretur, donec die tertio resurgeret. Quibus verbis peccare demonstravit eum, qui post mortem, defunctorum corpora non humaret, quamvis sancta essent: quid, enim, majus sanctiûsve corpore Domini. Multi, ergo, hoc audito, postea sub terram condiderunt cadavera, gratiasque Deo egerunt, quòd tam probè instituti essent. ANTONIUS, autem, hujus moris gnarus, metuensque ne & suo ita cadaveri facerent, postquam Monachis, qui in exteriori erant monte, mandata dedisset, sese inde abstulit, montemque interiorem ingressus, ubi commorari solebat, post menses paucos in morbum incidit. Tum vocatis iis,

qui

qui cum ipso erant (duo erant hi, qui & intus manebant, quindecim annos ἀσκήσαντες, εἴque, propter senectutem, ministrantes) ipsis dixit: Equidem, ut scriptum est, viam patrum proficiscor; me, quippe, à Domino vocari video: vos, autem, sobrii estote, nec diuturnam vestram ἀσκήσιν perditē, sed, tanquam primordio jam capto, alacritatem animi vestri ut retineatis incumbite. Nostis insidiatores Damones, nostis quàm sicut immanes quidem, at viribus imbecilles. Ne, igitur, istos timeatis, verùm potiùs semper Christum spirate, εἴque credite, ac vivite tanquam in dies morientes, ipsi vobis caventes, earumque memores admonitionum, quas ex me audiistis. Nulla, porro, vobis sit cum schismaticis consuetudo, neque omnino cum hæreticis Arianis: scitis enim qui & ego illos sum aversatus, propter perversam ipsorum Christiòque adversam sectam. Σπαράξτε δὲ μάλλον καὶ ὑμεῖς, αἰεὶ συνάπτεσθαι ἐαυτῶν, προσηγμένως μὲν τῷ Κυρίῳ, ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἁγίοις: ἵνα μετὰ θάνατον ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς, ὡς Φίλους καὶ γνωρίμους, δέξωμαι καὶ αὐτοί. Ἰαυτί λογίζεσθε, Ἰαυτί φρονεῖτε. καὶ εἰ μέλει ὑμῖν περὶ ἐμῶν, καὶ μνημονεύετε ὡς περὶ πατρός: μὴ ἀφῆτέ τινας τὸ σῶμά μου λαβεῖν εἰς Ἀιγύπτου, μὴ πῶς ἐν τοῖς οἴκοις ἀπόθῃμαι. Ἰστέ γὰρ χάριν εἰς ἡλθον εἰς τὸ ἔρος, καὶ ἡλθεν ὧδε. οἴδατε δὲ καὶ πῶς αἰεὶ ἐνέτροπον ἴδεν τέτοιο ποιῶντας, καὶ παρήγγελον παύσασθαι τῆς ἰοιούτης συνηθείας. θάψατε ἔν τῳ ὑμετέρῳ ὑμεῖς, καὶ ὑπὸ γῆν κρύψατε. καὶ ἔσω τὸ παρ' ἐμῶν ῥῆμα φυλαττόμενον παρ' ὑμῖν, ὥστε μηδένα γινώσκειν τὸν τόπον, πλην ὑμῶν μόνων. ἐγὼ γάρ, ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν νεκρῶν, ἀπολήψομαι παρὰ Ἰᾶ Σωτήρος ἀφθάρτου αὐτό. [Vos, autem, & ipsi potiùs operam navate ut adheratis; primò, quidem, Domino, deinde Sanctis; ut post mortem vos, in aeterna tabernacula, tanquam amicos & notos, & ipsi recipiant. Hac observate, hac animadvertite, ac si qua vobis mei cura, & instar patris mei mementote. Ne sinatis ullos meum cadaver in Ægyptum ferre, ne quando in suis domibus id deponant. Propterea, enim, in montem abii, & huc veni. Scitis, autem, & quomodo semper objurgaverim illud facientes, & adhortatus sim ut mitterent illum morem. Vos, itaque, meum cadaver sepelite, & sub terrâ condite: ac observetur à vobis id quod dixi, addeò ut nemo, præter vos solos, locum sciat. Ego, enim, in resurrectione

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I. † † † mortuo-

mortuorum, illud incorruptum à Servatore recipiam.] Censet ANONYMUS nullam esse, quâ ingentis criminis absolvatur NEWTONUS, rationem, nisi vel ipsum ATHANASIUM non legisse, sed tantum, hæc, alii citata, memoriæ causâ notâsse, postea exactiùs expendenda; vel has posthumas Observationes, ut alias aliorum magnorum virorum, nihil esse, præter adversaria, è quibus opus ejusmodi componere mors Auctorem prohibuit. Postrema conjectura non omnino præter rationem videtur. Attamen & aliâ ratione, criminis certè magni, absolvi NEWTONUS possit, etiam si ipse, quo modo eæ sunt editæ, has Observationes perscripserit. Scilicet, nihil aliud culpât ANTONIUS, nisi corpora inhumata servari; nihil aliud vetat, nulli alii rei moribundus prospicit, nisi ne suum inhumatum servetur. Miraculorum edendorum virtutem ossibus Sanctorum adscribere non vetat; nec magis animarum eorum invocationem. Quin hanc potiùs, quæ superstitionum NEWTONO est cumulus, tacitè probat, jubendo ut Discipuli sui *Sanctis adhæreant, ut & hi ipsos, post mortem, quasi amicos & nos, recipiant in aterna tabernacula.* Minimùm Sanctorum animabus, rerum, quæ in terris aguntur, conscientiam, tacitè adscribit: quod satis profectò esse queat, nec multùm superstitioni deditis hominibus, ut haud frustra sese illas invocatuos credant.

Hæc etiam adnotanda proponit vir omni laude dignus.

Ad ea, quæ leguntur pag. 336. 337. (Cum Noster Senatuum populùmque & Principatum Romanum inter decem cornua, Cap. VI. non memoraverit, Imperiique veteris Romani reliquias jam in regno Ravennæ statuerit, manifestum est, humani aliquid passum fuisse Virum Summum, cum hæc scriberet.)

Ad pag. 410. lin. 2. à fine [Errat NEVVTONUS, cujus memoriæ non rectè obversatus esse sequens locus ATHANASII (in fine Præfationis ad Vitam ANTONII) videtur. *Διὰ τὸ αὐτὸς ἴε γινώσκω, πολλάκις γὰρ αὐτὸν εἶρακα, καὶ αἰ μαθεῖν ἡδυνήθην παρὰ τῷ ἀκολουθήσαντι αὐτῷ χρόνῳ ἐκ ὀλίγον, καὶ ἐπιχέαντος ἡδωρ κατὰ χειρὸς αὐτοῦ, γράψαι τῇ εὐλαβείᾳ ὑμῶν ἐσπέδασα. Προσετα. & quæ ipse novit, (scire, enim, illum vidi,) & quæ discere ab eo potui.*

potui, qui non parum temporis ipsum sequutus est, & aquam manibus adfudit, vestra benevolentia scribere diligenter studui.]

Totam Præfationem, utpote longiusculam, non descripsi, hæc afferre contentus, quæ præcipua visa sunt.

Ultimum Opusculum de *Sacro Judæorum Cubito &c.* Latinè ab Auctore scriptum, Anglicè editum fuit inter Opera miscellanea Celeberrimi *Johannis GRAVII*, Tom. II. pag. 405. ann. 1737. *Londini*, unde nos illud desumpsimus.

En, Lector optime, quæ tibi in præsentia possum offerre. Si meum rem tibi gratam & utilem faciendi studium non displiceat, voti reus factus sum. Ceterum, in versionibus meis perspicuitatem sum potius quàm elegantiam secutus. Res ipsa id petere videbatur, tum, quia Mathematica, Physica, & hujuscemodi sunt dilucidè tradenda, tum, quia *NEWTONI* stylus (cui meum accommodandum censui,) omnino simplex est & omni ornamento destitutus præter illud, quod sponte gignunt verba, cum

— — provisam rem non invita sequuntur (a).

Præterea, frustra, fateor, elegantiam esse venatus. Nam; & profectò patet

— — — *Anglorum* obscura reperta
Difficile inlustrare Latinis versibus esse,
(Multa novis verbis præsertim cum sit agendum,)
Propter egestatem linguæ, & rerum novitatem (b);

& Romanè

Judice, quem nosti, *CLERICO* (c)

scribere solùm datur illi, qui per aliquot annos, ceteris omnibus neglectis, optimos illius linguæ Auctores diurnâ nocturnâ-

† † † 2

que

(a) Horat. Art. Poet. vers. 311.

(b) Lucret. de rerum nat. Lib. I. vers. 137. 138. 139. 140.

(c) Cler. Biblioth. Ant. & Nov. Tom. 25. pag. 381.

que manu versavit. Mihi verò, ab ineunte ætate, rebus potiùs quàm verbis addiscendis destinato, quantùm voluissèm operæ Latinis Litteris navare non licuit. Sed, peropportunè accidit, ut hìc ornamenta non requirantur, perspicuitas & fidelitas sufficiant. Quæ duo utrùm præstiterim, penes Doctos judicium esto. Nihil certè, quod ad utrumqne, & præcipuè ad fidelitatem versionis, conduceret, prætermisi. Quandoquidem, postquàm, quantâ potui diligentia opusculum aliquod sum interpretatus, illud cum Gallicâ, siqua aderat, versione accuratè contuli, aut, quantùm licuit, cum Viris rerum ipsarum, & Anglicæ ac Latinæ Linguae peritissimis emendavi. Quamobrem illis à me debetur gratia maxima, eosque obsecro, ut publicum hoc grati animi testimonium non respuant. Quamquam autem totis viribus errores vitaverim, eos non evitavi, satis sciò. Tuam, igitur, cùm pro meis, tum pro Typographorum mendis clementiam imploro, Lector benigne. Vale, & memento quòd, humanæ naturæ vitio,

— — Opere in longo fas est obrepere somnum (a).

(a) Horat. Art. Poetic. vers. 360.



DE



D E V I T A
ISAACI NEWTONI
COMMENTARIOLUS.



ISAACUS NEWTONUS, natus est *Woolstropia* in *Lincolni* Regione ipso *Nati-
vitatibus Dominica* die (Veteri Stilo) anno
1642 ; originem suam referebat ejus fami-
lia ad natu maximum *Johannis NEWTONI*
Equitis aurati, & *Woolstropia* Domini, fi-
lium. Hujus Gens per totos ducentos an-
nos in *Woolstropiam* dominata fuerat, ubi
se transfulerat ex *Wejiby* in eadem Regio-
ne ; orta autem erat *Newtoni*, quæ *Lan-
castri* Urbs est. Matrem habuit ISAACUS
noster *Annam ASCOUGH*, antiquo ge-
nere progeneratam, quæ, cum Virum, Auctoris nostri patrem, amisisset,
iterum nupsit. Hæc filium suum, duodecim annos natum, misit in pu-
blicum *Granthami* Ludum litterarium ; unde illum aliquot post annis re-
movit, ut res suas ipse curare consuefceret. A quo negotio tam alienum,
& tam libris suis deditum experta est, ut eum *Granthamum* remitteret,
quò sibi posset indulgere. Hinc transiit ad Collegium *Trinitatis* in Uni-
versitate *Cantabrigiensi* ; anno 1660, ætatis annum agens duodevicesimum.
Auctor est FONTENELLIUS (a) eum, Mathematica discere cupientem,
operam

† † † 3

(a) *Histoire de l'Acad. Royale des Sciences. An. 1727. Eleg. Newt.*

operam *Euclidi* non dedisse, utpote qui nimis perspicuus, nimis simplex, & indignus, in quo pervolvendo tempus tereretur, illi videbatur. PEMBERTONUS ferè eadem narrat; affirmat (a) enim se NEWTONUM sæpius querentem audisse, quòd Mathematicum curriculum aggrediens totum se tradidisset libris CARTESII & aliorum *Algebristarum*, minus attentè perlectis EUCLIDIS elementis, quam tantus Auctor merebatur. Perfunctoriè igitur evolutis elementis sedulam operam dedit CARTESII *Geometriae*, & KEPLERI *Opticis*. Patet ex ejus expensè rationibus illum SCHOOTENII *Miscellanea*, & CARTESII *Geometriam*, atque WALLISII opera emisse anno 1663 paulò ante diem quo Domini nativitas celebratur. Hos libros, dum legebat, notis & observationibus augebat, ac scientias, de quibus agebant, multum promovebat. Sic (b) annis 1664, 1665, dum proferre conabatur *Wallisianam* interpolationem, excogitavit rationem Serierum obtinendarum per Radicum Extractionem & per Divisionem. Anno 1664 artium Baccalaureus factus est. Anno (c) 1666 admirandæ suæ *Opticæ* fundamenta jecit; & anno 1668 artium Magister creatus fuit, cum jam Collegii focius fuisset electus. Hoc eodem anno, mense *Septembri* (sunt verba (d) Clarissimi COLLINSII) MERCATOR *Logarithmotechniam* edidit suam, quæ specimen hujus Methodi, (videlicet *Serierum infinitarum*) in unicâ tantum Figurâ, nempe *Quadraturam Hyperbole* continet. Haud multo postquam in publicum prodierat liber, exemplar ejus Clarissimo WALLISIO *Oxoniam* misi . . . , aliûmque BARROVIO *Cantabrigiam*, qui quasdam NEWTONI chartas (e) . . . extemplo remisit. E quibus, & ex aliis, quæ olim ab Auctore cum BARROVIO communicata fuerant, patet illam Methodum à dicto NEWTONO aliquot annis antea excogitatam, & modo universali applicatam fuisse; ita ut ejus ope in quâvis Figurâ curvilineâ propositâ, quæ unâ vel pluribus proprietatibus definitur, *Quadratura* vel *Area* dictæ Figuræ, accurata, si possibile sit, sin minus, infinitè vero propinqua; *Evolutio* vel *Longitudo* Lineæ curvæ; *Centrum Gravitatis* Figuræ; *Solida* ejus rotatione genita, & eorum *Superficies*, sine ullâ Radicum Extractione, obtineri queant; quo invento, ait Celeberrimus FONTENELLIUS (f), nihil subtilius nihil felicius excogitari potest ad opem humani intellectûs imbecillitati ferendam.

Tamen tanta erat NEWTONI modestia, ut (g) *maturam ad scribendum*

(a) Pembert. *Pref. in a View of Sir Isaac Newton's Philosophy.*

(b) Vide Tom. I. hujus, pag. 329 -- 332.

(c) Vide Tom. II. hujus, pag. 379.

(d) Comm. Epistol. N°. XXIV. pag. 103. edit. sec.

(e) Hæ chartæ sunt *Analysis per Aequationes numero Terminorum infinitas.*

(f) Loco citato.

(g) Vide Tom. I. hujus, pag. 333.

non aetatem expectaret, licet, vel MERCATOREM ipsum jam nosse (a) *Extractionem Radicum aequè ac Divisionem, vel alios saltem, Divisione patefactâ inventuros reliqua* suspicaretur; id est, licet alios inventionis gloriam occupaturos putaret. Libellus igitur de *Seriebus*, quem conscripserat, communicatus tantummodo fuit cum COLLINSIO & Vice-Comiti BROUNCHERO. Electus fuit anno 1669. Mathematicum Professor in Universitate *Cantabrigiensi*, quam Provinciam BARROVIUS abdicaverat. Eodem anno & duobus proximis publicè prælegit *Lectiones Opticas*, illas, quas nos exhibuimus (b), quæ, in Anglicum sermonem conversæ, editæ fuerunt *Londini* anno 1728 in 8^{vo}., & postea Latine, quemadmodum scriptæ fuerant pariter *Londini* an. 1729 in 4^o. Ibi continentur ea, quæ de Luce & Coloribus detegere coeperat anno 1666, & de quibus docuit *Regiam Societatem* anno 1671, scriptæ quodam, quod insertum fuit *Philosophicis Transactionibus* Februarii 19 an. 1672. N^o. 80. (c). Hinc ortæ sunt plures controversiæ, quæ NEWTONUM, illarum inimicissimum, à *Lectionibus* ipsis edendis cum *Tractatu de Methodo Serierum infinitarum* & *Fluxionum* absterruerunt (d). In iisdem *Transactionibus* Martii 28 an. 1672 N^o. 81. descripsit novum *Cata-Dioptricum Telescopium* à se excogitatum, quam descriptionem Doctissimus Abbas GALLOIS inseruit in *Eruditorum Diario* Februarii 29 an. 1679, additâ HUGENII Epistolâ (d), quâ Vir omni laude major ostendit quot & quantis commodis hoc genus Telescopia cetera antecellant. Adfunt in *Philosophicis Transactionibus* alia scripta (e) ad Telescopium hoc, & ad novam Theoriam de Luce & Coloribus pertinentia, quæ Auctoris ingenium, diligentiam, atque perspicacitatem in præpatulo ponunt. Anno 1672 edidit *Cantabrigia* in 8^{vo}. librum, cui titulus Bernardi VARENI *Geographia generalis, in quâ affectiones generales Telluris explicantur, aucta & illustrata ab ISAACO NEWTON*, quæ rursus excusa fuit, pariter in 8^{vo}., anno 1687; sed ea, quæ NEWTONUS, publicæ utilitati studens, & gloriam suam negligens, contulit ad eam augendam & illustrandam, ita cum reliquis confusa sunt, ut ab iis distingui, nedum separari nequeant. Hyeme illo, qui finis fuit anni 1676, & principium anni 1677, NEWTONUS demonstravit quod, si vires centripetæ reciprocè sint ut Quadrata distantiarum, Planeta motu suo describet Ellipsim circa Centrum virium sitam in inferiore Ellipseos Foco, & Radii ad hoc Centrum ducti, Areas describet Temporibus proportionales. Anno 1683 hoc argumentum rursus meditari coepit, & jam detectæ Propositioni nonnullas alias ad cœlestia Corpora spectantes adjecit; inter quas non ultimum locum occupat Demonstratio notissimæ illius *Keplerianæ* Propositionis, quod, scilicet, Planeta in Ellipsis moventur; &, si Radii ducantur.

(a) Tom. II. pag. 75. &c.

(b) Tom. II. hujus, pag. 279.

(c) Vide Tom. I. hujus, pag. 334.

(d) Vide Tom. II. hujus, pag. 295. ad 300.

(e) Vide Tom. II. hujus, p. 301. ad 409.

tur ad Solem situm in inferiore Ellipseos Foco, Areas Temporibus proportionales describunt. Hanc Demonstrationem misit Celeberrimo HALLEIO mense Decembri 1684, qui eam cum Regali Societate communicavit, & in hujus Tabulariis inscripta fuit. Celeberrima hac Societate rogante, & HALLEIO etiam pervicaciter contendente, ad id adductus tandem fuit NEWTONUS, ut sua Principia scriberet, quorum duo priores libri manu exarati Regali Societati lecti fuerunt; sed, cum HOOKIUS se ante nostrum Auctorem KEPLERI Problema demonstravisse contenderet, tertium librum suppressere statuit NEWTONUS, quod tamen ne faceret ejus Amici exoraverunt. Asserit PEMBERTONUS (a), quod prima cogitata, quibus ad Principia sua manuductus fuit, ei in mentem venerunt anno 1666, cum Cantabrigiæ, metu Pestilentiae, recessisset. Nam, solus in hortis deambulans Gravitatis vim, (aliqui dicunt à pyro cadente admonitus) considerare coepit; quod, nempe, quoniam hæc vis sensibus non deprehenditur imminuta ad maxima à Terræ Centro intervalla, ad quæ pervenire liceat, neque ad fastigia altissimorum ædificiorum, neque etiam ad sublimiorum montium cacumina inde conficiendum probabiliter videtur, quod hæc vis multo latius patet, quam vulgo credi soleat; quidni ad Lunam usque, tacitus dicebat? Si verò ita se res haberet, certè vim istam Lunæ motus sentiret, & ab eà fortasse Luna in orbita suâ retineretur. Quanquam autem vis Gravitatis non mutetur, (quod quidem sensibus percipi possit,) exiguis mutationibus intervallorum à Centro telluris, ad quæ evadere possumus, tamen arbitrabatur fieri posse, ut hæc vis multò minor esset apud Lunam, quam apud nos. Detecturus quanta esset hæc imminutio, secum ipse reputabat, quod, si Lunam in orbe suo retinet vis Gravitatis, procul dubio Planetæ primarii circa Solem à non absimili vi circumducuntur. Et, plurium Planetarum Periodos cum eorundem à Sole intervallis comparans, invenit, quod, si quæ vis Gravitati similis Planetas in suis orbitis continet, hæc decrescere debet in duplicatâ ratione incrementorum distantiarum; ad quam conclusionem venit, ponens Planetas accuratè describere Circulos Soli concentricos, à quibus quidem circulis orbes à pluribus Planetis descripti vix differunt. Igitur, supponens vim Gravitatis, ad Lunam usque se extendentem, in eadem ratione decrescere, rationes subducere coepit, perspecturus utrùm hæc vis ad Lunam in orbita suâ retinendam sufficeret. Cum verò tunc libris destitueretur, posuit, quemadmodum Geographi passim, & Angli Nautæ, antequam NORWOODUS Terram esset dimensus, arbitrabantur, quod unus Latitudinis gradus in terrestri superficie sexaginta milliaria Anglica complectitur; sed, quoniam hæc hypothesis à verò non parum aberrat, quandoquidem singuli gradus novem & sexaginta

(a) Pembert. Pref. in à View of Sir Isaac Newton's Philosophy.

sexaginta millia Anglica eum dimidio, circiter, continent, hinc factum est, ut ejus rationes spern fallerent; hinc opinatus est aliquam aliam causam saltem jungendam esse vi Gravitatis in Lunam agentis. Ea de re hujus argumenti considerationem aliquamdiu intermisit. Sed aliquot annis post HOOKII epistola eum excitavit ad investigandum quamnam Lineam reipsa describat corpus è sublimi cadens, si Terræ circa suum Axem motus non negligatur. Hujuscemodi Corpus, cum servet motum illum, quem Terræ revolutio tribuit loco, quem cadendo deserit, considerari debet tanquam anteriorem partem versus projectum, & simul tractum deorsum, ad Terræ Centrum. Hinc iterum ad meditando Lunæ motum animum adjecit; atque usus Terræ dimensionibus, quas paulò prius Celeberrimus PICARTUS constituerat, Lunam in orbe suo retineri à solâ Gravitatis vi perspexit: unde sequebatur hanc viam decrescere quò magis à Terræ Centro receditur, quemadmodum ipse jampridem conjecerat. Ex hoc principio deduxit Lineam à cadente Corpore descriptam esse Ellipsin, cujus Focus alter est Terræ Centrum. Et, quoniam primarii Planetæ circa Solem in gyrum acti Ellipticos Orbes describunt, disquisitionem hanc, quam animi gratiâ susceperat, ad altiora posse accommodari non sine voluptate cognovit. Composuit igitur, duodecim, præterpropter, Propositiones ad Planetarum præcipuorum circa Solem motum pertinentes. Aliquot post annis, sermonibus HALLII, qui, eum inviturus, *Cambrigiæ* petierat, eo adductus est, ut rursus meditationes suas ad hoc argumentum converteret, atque inde de hac re librum, cui titulus *Philosophiæ naturalis Principia mathematica* divulgavit. Hic liber tot, & tam accuratè excogitarum rerum plenus, duodeviginti mensibus conscriptus fuit, quamquam ferè nullam, præter eam quam retulimus, suppellectilem sibi paravisset. Hactenus PEMBERTONUS. Hic liber primò editus fuit *Londini* in 4^o. anno 1687; atque iterum pluribus in locis ab Auctore auctus & emendatus *Cambrigiæ* anno 1713 in 4^o curante Rogero COTTESIO, Viro illustrissimo, & in eâ Universitate Astronomiæ atque Physicæ experimentalis Professore: Tertiò *Amstelodami*, anno 1714; & denique *Londini* anno 1726 curâ Henrici PEMBERTONI rursus auctus. Hic liber, (juxta FONTENELLIUM (a),) in quo novum Philosophiæ Systema profundissimæ Geometriæ superstruitur, statim omnes illas laudes non obtinuit, quas merebat, & quas aliquando habiturus erat. Quoniam acutissimè cogitata multa paucis verbis efferuntur, & ex principiis summa celeritate deducuntur ea, quæ inde confici possunt, atque Lector non pauca, quibus principia & conclusiones connectantur, proprio Marte supplere debet, tempore opus erat ut intelligeretur. Mathematicorum Principes diligentem & sedulam operam illi navare coacti sunt,

J. Newtoni Opuscula, Tom. I. † † † &

[a] Hist. de l'Acad. Royale des Sciences, An. 1727. Elog. de Mr. Newton.

& ii, qui minis ingenio & doctrinâ pollebant, illud mare navigare non sunt aggressi, nisi quando Principum testimonia animos addiderunt. Sed tandem, quando libri pretium satis perspectum fuit, undique concurrerunt suffragia, quæ tam lenis sibi adquisiverat, & omnia plausus compleverunt. Omnes mirati sunt mentem rerum inventricem, & quasi creatricem, mentem, quæ, si minus modesta fuisset, meliori, quam LUCRETIVS, jure exclamare potuisset,

Avia Pieridum peragro loca, nullius antè
Trita solum; juvat integros accedere fontes,
Atque haurire

mentem, quam in sæculo felicissimo vix unus aut alter è totâ Doctorum Republicâ sortiuntur. Et, quò quisque magis ingenio pollebat, eò magis mirabatur, ita ut HOSPITALIUS ille, Eruditorum nobilissimus, & Nobilium eruditissimus, ab Anglis (a) eum invisentibus petere soleret, NEWTONUS-ne vester, edit, bibis, dormit, ut homines alii faciunt? Ego quidem illum mihi fingo tanquam Genium, & mentem à corporeis vinculis omnino solutam. Innituntur Principia Mathematica duabus præcipue Theoriis, doctrinâ virium centralium, & Mediorum resistentiâ: utraque ferè prorsus nova est, & per sublimem Auctoris nostri Geometriam explicata. KEPLERUS ex coelestibus TECHONIS observationibus tria confecerat. Primo, quòd iidem Planetæ æqualibus temporibus æquales Areas circa Solem describunt. Secundo, quòd per Ellipses moventur, in quarum communi Foco est Sol. Tertiò, quòd, in diversis Planetis, Quadrata ex temporibus periodicis sunt ut Cubi ex transversis Orbitalium Diametris. Ex primo Phænomeno confecit Auctor Planetas versus Centrum Solis attrahi. Ex secundo vires hujus attractionis esse, reciproce, ut Quadrata spatiorum, quibus Planetæ distans à Solis Centro. Ex tertio denique Planetas omnes eandem Centripetam vim sentire. Eodem anno, quo Principia ista fuerunt edita, Rex JACOBUS II. privilegia Universalitatis Cantabrigiensiis aggressus est, pro quibus, inter alios, acerrimè stetit NEWTONUS, qui fuit inter illos, quos Universitas ad Alti Confessus Curiam delegavit. Electus pariter fuit unus ex ejus Membris; dum anno 1688. Pactionis Comitia fuerunt coacta, quibus adfuit quamdiu manserunt. Anno 1696. Illustrissimus MOUNTAGUE, tunc Scaccarii Cancellarius, & postea Comes Hallifaxium illi à Rege GULLIELMO munus Custodis pecuniæ feriundæ obtinuit, quo munere dum fungeretur, eximia fuit ejus opera quando nummi jam cunctis novis imaginibus signandi fuerunt. Tribus annis post creatus fuit Magister Fabrorum nummos cudentium, unde non exiguum lucrum ei redibat, & hoc munere, quoad vixit, potitus:

(a) Des Mémoires. Recueil de diverses Pièces sur la Philosophie &c. Pref.

potitus est. Anno 1699 in *Regiam Scientiarum Academiam*, quæ *Lutetia Parisiorum* floret, cooptatus fuit. Anno 1701 iterum ab Universitate *Cantabrigiensi* Comitiorum Membrum electus fuit. Anno 1703 creatus fuit Præfex *Regalis* apud *Londinenses Societatis*, quam Dignitatem per totum vitæ suæ tempus, hoc est, tres & viginti continuos annos, obtinuit. Anno 1704 edidit *Londini* in 4^o. suam *Opticam*, seu librum de Reflexionibus, Refractionibus, Inflexionibus, & Coloribus Lucis; qui liber auctus iterum typis excusus fuit pariter *Londini* anno 1718 in 8^{vo}., ac tertiò anno 1721 in 8^{vo}. In Latinam linguam versus ex primâ editione à Celeberrimo *Samuele CLARKE* editus fuit *Londini* anno 1706 in 4^o. & ex secundâ anno 1719 pariter *Londini* in 4^o. Illustris *Petrus COSTE* eundem Gallicâ Linguâ donavit ex editione secundâ, & sic vestrum edidit *Amstelodami* 1720 in 12^{mo}. in duo volumina divisum, & *Lutetia Parisiorum* eadem formâ anno 1722. Juxta ingeniosissimum *FONTENELLIUM* (a) hic liber totus circa Lucis Anatomiam versatur. Tenuissimus Lucis Radius in cubiculum prorsus obscurum intromissus, (qui tamen, quantumvis sit exilis, semper est quasi *Fasciculus* ex infinito Radiorum numero constans,) ita dividitur & dissecatur, ut exhibeat tandem elementares componentes Radios ab aliis segregatos, atque singulos propriis Coloribus imbutos, & post hanc separationem, nullis mutationibus obnoxios. Omnes hi Radii diversimodè colorati, si commisceantur, eo ipso Albedinem, quâ totus Radius præditus est, constituunt atque progignunt. Primigenii & colorati Radii, numquam fortasse separari potuissent, nisi ita naturâ comparati fuissent, ut, dum idem Medium, idem vitreum Prisma transmeant, sub diversis Angulis refringerentur, & hoc pacto, ad commoda intervalla excepti, disgregati comparerent. Hæc varia rubei, flavi, viridis, coerulei, purpurei, & aliorum mediis coloribus distinctorum quamplurium Radiorum refrangibilitas, de quâ nulla fuerat suspicio, & ad quam vix conjiciendo poterat deveniri, est præcipua veritas circa quam hic *NEWTONI* liber versatur. Ab hac ducimur ad variam reflexibilitatem. Quinimo, radii sub eodem angulo super eandem superficiem cadentes alternè refringuntur & reflectuntur. Præterea, Radii qui prope Corporum extremitates transeunt, licet illa non tangerent, attamen à Lineâ rectâ detorquentur, quæ sola res non primùm *NEWTONO* perspecta fuit, & *inflexio* nuncupatur. Ex his omnibus exsurgit nova Optica, ab aliis tam diversa, ut hæc Scientia tota Auctori nostro debita videatur. Huic libro, cum primùm editus fuit, subjecit Tractatus duos, de *Speciebus & magnitudine Figurarum curvilinearum*, hoc est, de *Quadraturâ Curvarum*, & *Enumeratio Linearum tertii ordinis*, quos deinde sustulit, quia de rebus nimium ab Opticâ alienis agebant. Anno 1705 Eques creatus fuit ab *ANNA* Regina.

†††† 2

Anno.

[a] Mémoir. de l'Acad. Royal. des Sciences, an. 1727. Elog. de *Mr. Newton*.

Anno 1707 *Cambrigiæ* primum edita fuit ejus *Aritmetica Universalis*, *sive de Compositione & Resolutione Aritmetica liber*; idque infcio Auctore, atque etiam, quando rescivit, ægrè ferente (a). Illam scripserat NEWTONUS triginta fere annis antequam ederetur, anno nempe 1677, cum *Mathemata Cambrigiæ* profiteretur, & quidam currenti calamo, pro urgentis officii ratione, & ejus exemplum, pro more, in Universitatis Tabulariis reliquerat, unde editus fuit. Secundò editus fuit *Londini* anno 1722; sed in statu perfectiore, (ut Clarissimi s'GRAVESANDE verbis utar (b),) ut quis. facile percipiat non omninò factum abdicasse Virum Celeberrimum. Eundem satis amplo Commentario, quem suadente eodem s'GRAVESANDE jam diu perfeci, in lucem proditurum prope diem, & hoc ipso fortassis anno, spero. Anno 1711 vulgata fuit ejus *Analysis per Quantitatum Series, Fluxiones, & Differentias, cum Enumeratione Linearum tertii ordinis, Londini* in 4°. à Gulielmo JONES, Armigero, qui primùm illam reperit inter scripta Joannis COLLINSII, quæ anno 1669 à BARROVIO acceperat. Anno 1712 plures NEWTONI epistolæ impressæ fuerunt in libello, cui titulus *Commercium Epistolicum D. Joannis COLLINS & aliorum de Analysis promotâ, jussu Societatis Regiæ editum*.

GEORGIO I. regnum obtinente melius etiam in Aulâ cognitus fuit NEWTONUS, quandoquidem ornatissima *Walliæ* Princeps, ac deinde *Britannia* Regina illum pluribus de rebus ad sublimiores disciplinas pertinentibus, interrogare solebat, & à respondentis ore pendebat, ita ut sæpè se felicem prædicaverit, cui eodem, quo NEWTONUS, tempore vivere, illumque audire contigisset. Scripserat hic de Chronologia librum, quem in lucem non emittere decreverat; at optima Princeps, cum quâ præcipua sui Systematis chronologici capita communicaverat, tantum novitatis & ingenii in illis perspexit, ut sibi summarium optaverit, quod nemini daret, & apud se summâ fide & diligentia servaret. Veruntamen unum hujus Summarii exemplum in Galliam pervenit, ubi in Gallicam Linguam conversum fuit & editum *Lutetiæ Parisiorum*, cum nonnullis in illud observationibus. Quapropter NEWTONUS Transactionibus Philosophicis, inseruit animadversiones quasdam in has observationes, quæ animadversiones itidem Gallicâ Linguâ donatæ fuerunt, typisque divulgatæ: *Lutetiæ Parisiorum* anno 1726 in 8^{vo}. cum epistolâ Excellentissimi Abbatis CONTI, quâ respondebat ad nonnulla, quæ de eo dixerat NEWTONUS in suis animadversionibus. Anno autem 1728 ipsa Chronologia edita fuit *Londini* in 4°. In eo libro præcipuè de hoc agitur, ut acutè sanè & ingeniosè, legendo tenuissima nonnulla vetustioris Græcorum Astrologiæ vestigia, investigetur quænam locum tempore *Chironis Cambrigiæ* Colurus:

[a] s'Gravesande præfat. in *Arithma. Univers.* Newtoni edit. *Lugd. Batav.* 1732.

[b] Ibidem.

Colurus Equinoctiorum occuparet. Siquidem, quoniam hodie notum est fixas Stellæ unum in Longitudinem Gradum peragrarè spatio annorum duorum & septuaginta, si sciremus per quas Stellæ transiret Colurus ille CHIRONIS temporibus, dimetiendo intervallum, quo distant Stellæ, per quas nunc transit, ab illis per quas tunc transibat, facile quot anni à Chironis tempore ad præsens elapsi sint, determinaretur. Et, quia CHIRON fuit inter *Argonautas*, hinc notissimæ hujus expeditionis, & idcirco *Trojanæ* belli tempus definiretur, duorum nempe maximorum facinorum, ex quibus tota vetus Chronologia pendet. Ea statuit NEWTONUS totis annis quingentis recentiora, quàm alii vulgò Chronologi. Contra hoc Systema scripserunt duo docti *Galli*, atque tres *Angli*, *Arthurus BEDFORD*, & *Samuel SHUGFORD* in præfatione ad secundum Volumen suæ *Connexionis Historiæ sacræ atque profanæ*, atque *WARBURTON* in Sectione V. Lib. IV. de *Divinâ Mosis legatione*. Ceterum non tantum suis laboribus orbem litteratum ditavit, sed etiam alios ad idem compulit, ut de se testatur *WOODWARDUS*. (a).

Bona valetudine usus est ad octogesimum ætatis annum usque, quorinæ incontinentiâ affligi coepit; attamen quinque sequentibus annis, per satis magna intervalla bene se habuit, aut certè non malè, quod prudenti victus ratione, curisque, quarum antea non indiguerat, efficiebat. Provinciam suam curandæ Monetæ Nobili Viro *CONDUITTO*, qui *NEWTONI* Neptem uxorem duxerat, demandare coactus fuit. Magnos dolores nunquam perpeffus est præter viginti postremos vitæ suæ dies; tunc pro certo creditum est eum calculo laborare, & valetudinem recuperare non posse. Dum tantis doloribus cruciatur, ut sudor largiter per vultum diffunderet, nunquam ejulatum edidit, aut eos ægrè se ferre testatus est, &, si qua dabatur quies, subridere statim, ut solebat, & lætâ facie loqui. Semper aliquot horas quotidie lectioni aut scriptioni dederat. Scripta, quibus quid novi acciderit, enarratur, legit die Sabbathi duodevicesimo Mensis Martii anno 1727, & diutius cum Cèleberrimo *MEADIO*, quo Medico utebatur, collocutus est, atque omnino sensuum & mentis compos erat, sed sub vesperam mente lapsus est, nec unquam sibi redditus. E vitâ decessit proximo die Lunæ, vicesimo ejusdem mensis, natus annos octoginta quinque. Compositum fuit ejus cadaver in lecto funebri ad pompam ornato in Cubiculo *Jerosolymæ Westmonasterii*, unde offeruntur Magnates, & aliquando Reges. Latum ad sepulturam fuit in Abbatia *Westmonasterii*, & pallam, seu stragulum, quo feretrum obducum erat, sustinebant supremus Angliæ Cancellarius, Dux Montrosiæ, Dux Roxburgi, Comes Pembrockiz, Comes Suffexii, & Comes Malesfieldi. Episcopus Rochestriæ, quem omnes ejus Ecclesiæ Clerici comitaban-

†††† 3.

mitaban-

[a] Woodward, ad calcem sibi libri, cui titulus *Fossils of all Kinds digested in two Methods suitable*.

xxx

ISAACI NEWTONI

mitabantur; funereas preces recitavit. Cadaver sepultum fuit ubi aditus est ad Chorum. Ejus Familia monumentum illius memorize posuit, in quo insculptum fuit hoc Epitaphium :

H. S. E.

ISAACUS NEWTONUS EQUES AURATUS:

QUI ANIMI VI PROPE DIVINA
PLANETARUM MOTUS, FIGURAS,
COMETARUM SEMITAS, OCEANIQUE ÆSTUS,
SUA MATHESI FACEM PRÆFERENTE,
PRIMUS DEMONSTRAVIT.

RADIORUM LUCIS DISSIMILITUDINES,
COLORUMQUE INDE NASCENTIUM PROPRIETATES,
QUAS NEMO ANTE SUSPICATUS ERAT,
PERVESTIGAVIT.

NATURÆ, ANTIQUITATIS, S. SCRIPTURÆ,
SEDULUS, SAGAX, FIDUS INTERPRES.
DEI O. M. MAJESTATEM PHILOSOPHIA APERUIT,
EVANGELII SIMPLICITATEM MORIBUS EXPRESSIT.

SIBI GRATULENTUR MORTALES
TALE TANTUMQUE EXTITISSE
HUMANI GENERIS DECUS.

NAT. xxv. DEC. A. D. MDCLII. OBIIT.
MART. xx. MDCCXXVI

Deinde Poëta summus *Alexander* POPE hoc Epitaphium in ejus honorem conscripsit.

ISAACUS NEWTONUS

QUEM IMMORTALEM
TESTANTUR TEMPUS, NATURA, COELUM:

MORTALEM
HOC MARMOR FATETUR.

& id quidem latine, sequitur autem distichum anglicum, quod sic exprimere conati sumus.

Naturam, legesque suas nos atra tegebat :

Sis NEWTONUS, ait Deus, & Læx cuncta fuerunt.

Fuit staturâ mediocri, & subpinguis, saltem senex. Vultu fuit jucundo simul & venerando, præsertim, cum, fictitiâ comâ ablata, veram detegeret canam densamque. Nunquam perspicillis usus est, & unum dentem amiserat. Fuit illi, juxta FONTENELLIUM, acies oculorum vivida & acris, sed juxta alios, qui NEWTONUM noverunt, & præsertim juxta Episcopum *Atherburyensem*, in quadam epistolâ, res longè aliter se habebat; saltem, inquit ille, viginti ab hinc annis, quo tempore, circiter, illum noscere coepi. Neque in vultu, neque in agendo acutam illam sagacitatem, quæ in ejus libris deprehenditur, præfererebat; quin potius languorem quemdam, qui nihil magni pollicebatur illis, qui eum ignorabant. Lenissimus erat, & pacis studiosissimus. Maluisset obscuram agere vitam, quàm in illas lites & controversias incidere, quibus Viri ingenio doctrinâque præstantissimi sunt obnoxii. Hinc factum est, ut *Lectiones Opticas*, & *Methodus Fluxionum* & *Serierum infinitarum*, quamvis jam Typis paratas, supprimeret, siquidem, ut ait ipse (a), subortæ statim per diverforum Epistolas, (objectionibus, aliisque refertas,) crebræ interpellationes me prorsus à consilio deterruerunt, & effecerunt ut me arguerem imprudentiæ, quod, umbram captando, eatenus perdideram quietem meam, rem prorsus substantialem. Sed, observat FONTENELLIUS (b), hac umbrâ fraudatus non fuit, neque ut eam sibi compararet, amisit quietem, quam tanti faciebat, & insuper ex hac umbrâ tantum veræ felicitatis, quantum ex quiete, accepit. Modestia fuit summâ, & ab eâ ne latum quidem unguem discessit, quamvis omnes in illam conspirarent. Semper ita de se, & de aliis locutus est, ut ab omni vel minimâ jactantiæ suspitione remotus unicuique, etiam iniquissimo, videretur. Simplex erat & affabilis, atque, ad cuiusque captum se accommodans, omnibus parem se præstabat. Nunquam à vitæ communis officiis immunem redditum ingenio, aut famâ, quibus pollebat, se credidit. Quamquam Ecclesiæ Anglicanæ foret addictus, nunquam tamen aliter sentientes vexavisset, ut illos ad eam revocaret; non quia Religionem naturalem dumtaxat admitteret, nam Revelationi firmiter adhærebat, ita ut inter tot libros, quos assidue versabat, nullum sæpius & attentius legeret, quàm Sacra Volumina. Nullam se beneficium præstandi neglexit occasionem, in quâ re sibi indulgere poterat,

[a] Epistolâ post. ad Oldemb. Tom. I. pag. 334. hujus.

[b] Loco sæpè citato.

rat, quandoquidem & avitâ re opimâ, & quæstuoso munere potiebatur, quos redditus prudentissimâ dispensatione augebat. Splendidus enim erat & magnificus, quando res ferebat, ceteroquin frugi, & ab omni divitiarum ostentatione, & apparatus atque deliciarum studio alienissimus. Hinc factum est, ut non semel in affines, seu potius in indigos quoscunque liberalissimus esse posset. Cum testamento largiri donum non putaret, intestatus mortuus est, & reliquit triginta & duo millia librarum *sterlinarum*, rerum quidem mobilium. Ceterum, uxorem nunquam duxit. Quamquam, cum jam esset magno natu, & morti proximus, memoriâ minus firmâ uteretur, attamen libros suos intelligebat (a); quod, (ait PEMBERTONUS,) adversatur iis, quæ à pluribus audiui. Cujus rei ratio fortassis est, quod aliquando minus ad sermones de hisce rebus habendos paratus erat, quàm optabatur. Sed animadvertendum est magnos Viros animo non rarò peregrè esse, non solum quando agitur de rebus ad vitam pertinentibus, sed etiam quando res est de scientiis, quibus præcipuam operam navarunt. Inventores non eodem, quo reliqui, pacto cogitata in mente congerere & disponere videntur. Etenim, quoties illa proferre debent, partim saltem quodammodo rursus investigare coguntur; ideo non semper sibi sunt æquales: sed illi, qui res ope firmæ memoriæ retinent, sæpè inventoribus ipsis peritiores videntur. Ab eodem discimus NEWTONUM pauciores, quàm quis crederet, ex recentioribus Mathematicis legisse; sed inveniendi facultas, quæ miranda in illo erat, facile illi sufficiebat, quæ necessaria erant ad prosequendum argumentum, quod susceperat. Sæpius se reprehendebat quod res rære geometricas algebraicis rationibus tractavisset, & quod libro suo de Algebra *Arithmetica Universalis* titulum posuisset, melius asserens CARTESIUM suum de re eadem volumen dixisse *Geometriam*, ut sic ostenderet has computationes subsidia tantum esse Geometris ad inveniendum. Magni faciebat SLUSIUM, BARROVIUM, & HUGENIUM, qui hac corruptelâ vitari se non svisissent. Commendare solebat laudabile inceptum *Hugonis de Omerique*, qui veterum Analysis restituere tentaverat, & summo in pretio habebat APOLLONII libros de *Sectione Rationis*, quia, cujus generis esset hæc Analysis, perspicuè demonstrant. Quamquam BARROVIUS inveniendi facultate non minus, quin etiam fortasse magis valeat, quàm recentiorum quilibet, præter Auctorem nostrum, tamen NEWTONUS præcipuè HUGENIUM commendare solebat, quem recentiorum elegantissimum & optimum Veterum imitatore nuncupabat. Horum institutum & demonstrandi rationem vehementer mirabatur, semet ipse reprohans, quod non magis illis adhæsisset; lugebat errorem, in quo se incidisse dicebat, cum, quando Mathesi coepit incurrere, CARTESII, aliorumque de Algebra Scriptorum libris sese totum tradidisset non prius, quanta

[a] Pemberton *A View of Sir Isaac Newton's Philosophy*. Prefa.

quantâ par erat diligentia consideratis EUCLIDIS Elementis, quæ, ut alia Veterum Geometrarum scripta tanti faciebat, (a) ut dicere solet nihil necesse futurum de Geometria atque adeo universa Mathesi scribere, si veterum commentationes ad nos pervenissent. Postquam ei creditum fuit munus argenti ferendi nihil magni, quod ad Philosophiam & Matheses attineret, aggressus est. Nam, quamvis pro magno incepto haberi possit solutio notissimi Problematis de *Trajectoriis*, quod Anglis, tanquam ingenii lapis lydius proposuerat LEIBNITIUS cum illis contendens, & quod, utpote intricatissimum & difficillimum, elegerat, tamen ludus jocisque fuit, NEWTONO, qui ut asseritur illud sub vespere recepit revertens ex æde, in quâ nummi constantur, & quidem lassus, atque illud solvit, antequam cubitum abiret. Dissertationes plures de Antiquitatibus, Historiâ, Theologiâ, Chymiâ, aliisque argumentis reliquit. Refert Clarissimus COSTIUS (b), quod cum aliquando cum NEWTONO colloqueretur de iis, quæ habet LOCKIUS in libro suo de Mente Humanâ lib. IV. Cap. X. §. 18. quod, scilicet, fieri posset, ut quamvis imperfectè, aliquo tamen pacto cognoscatur quomodo materies Dei virtute creata fuerit, ab illo audivit se auctorem esse hujus explicationis, quam indicat LOCKIUS; illam sibi in mentem venisse dum de hoc re verba faceret cum eodem LOCKIO, & Anglo quodam non minus ingenio & doctrinâ, quàm genere claro, & hanc esse. Aliquo pacto, aiebat, intelligere liceret quo pacto Materies creata fuerit, si supponeretur Deum suâ potentiâ vetuisse ne quid penetrare posset in certam Spatii partem, quod purum Spatium naturâ est penetrabile, æternum, necessarium, infinitum; sic enim illa Spatii pars impenetrabilitate gauderet, quæ qualitas de Materiei essentiâ est: &, quoniam purum Spatium omnino uniforme est, supponi posset Deum hoc impenetrabilitatis genus alteri Spatii parti impertivisse, & hinc quodammodo ideam mobilitatis haberemus, quæ iterum qualitas ad essentiâ materiei pertinet.

(a) Auctor Versionis Gallicæ Chronol. Newt. in Præfat.

(b) Essai Philosoph. de Locke traduit par Mr. Coste Edit. sec. 1729.



I N D E X

O P U S C U L O R U M

T O M I P R I M I.

O P U S C U L U M I.

Analyſis per *Æquationes* numero Terminorum infinitas, pag. 3

O P U S C U L U M II.

Methodus Fluxionum & Serierum infinitarum, cum ejuſdem applicatione ad Curvarum Geometriam,

Introductio. *De Reſolutione Æquationum per Series infinitas*, 31

Problema I. *Datâ Relatione, quam invicem habent fluentes Quantitates, determinare Rationem, qua inter earum Fluxiones intercedit*, 55

Problema II. *Datâ Æquatione, qua contineat Quantitatum Fluxiones, invenire quam Relationem habeant inter ſe ha Quantitates fluentes*, 61

Problema III. *Quantitatum maxima & minima determinare*, 86

Problema IV. *Ducere Tangentes ad Curvas*, 89

Problema V. *Determinare Quantitatem Curvatura, quam habet data quævis Curva in dato Puncto*, 104

Problema VI. *Determinare Qualitatem Curvatura ad datum Punctum cujuſlibet Curva*, 125

Problema VII. *Reperire quotlibet Curvas, quarum Area poſſint exhiberi finitâ Æquatione*, 137

Problema VIII. *Invenire quotlibet Curvas, quarum Area ad Arcum*

††††† 2

cam

<i>eam cujuscunque data Curva habeant Relationem expostam finitâ</i>	
<i>Æquatione,</i>	132
Problema IX. <i>Determinare Arcam cujuscunque Curva proposita,</i>	134
Problema X. <i>Invenire quotlibet Curvas, quarum Longitudo finitâ æquatione possit exprimi,</i>	176
Problema XI. <i>Invenire quotlibet Curvas, quarum Longitudines comparari possint cum aliquâ Curvâ propositâ, aut cum suis Arcis applicatis data Linea, idque per finitam Æquationem,</i>	185
Problema XII. <i>Determinare Curvarum Longitudinem,</i>	191

OPUSCULUM III.

De Quadraturâ Curvarum.

<i>Introductio,</i>	203
<i>Tractatus de Quadraturâ Curvarum,</i>	208

OPUSCULUM IV.

Enumeratio Linearum tertii ordinis,	247
-------------------------------------	-----

OPUSCULUM V.

Methodus Differentialis,	273
--------------------------	-----

OPUSCULUM VI.

Solutio duorum Problematum à Johanne BERNOULLIO propositorum,	286
<i>De Ratione Temporis, quo Grave labitur per Rectam data duo Puncta conjungentem ad Tempus brevissimum, quo vi Gravitatis transit ab horum uno ad alterum per arcum Cycloidis,</i>	291

OPUSCULUM VII.

Problematis cujusdam solutio,	293
-------------------------------	-----

OPUS-

OPUSCULUM VIII.

Excerptum Epistolæ NEWTONI ad COLLINSIUM, 297

OPUSCULUM IX.

Artic. I. *Excerptum Epistolæ* OLDEMBURGII ad SLUSIUM *in quo continetur pars Epistolæ* NEWTONI, 299

Artic. II. *Excerptum ex Epistolâ* LEIBNITII ad OLDEMBURGIIUM, 300

Artic. III. *Excerptum ex Epistolâ* OLDEMBURGII ad LEIBNITIUM, *quâ superiori respondetur*, 301

Artic. IV. *Excerptum ex Epistolâ* OLDEMBURGII ad LEIBNITIUM, 302

Artic. V. *Excerptum ex Epistolâ* LEIBNITII ad OLDEMBURGIIUM, 303

Artic. VI. *Excerptum ex Epistolâ* COLLINSII ad OLDEMBURGIIUM, *quâ superiori respondetur*, 304

OPUSCULUM X.

Epistola Prior NEWTONI ad OLDEMBURGIIUM, 307

OPUSCULUM XI.

Epistola Posterior NEWTONI ad OLDEMBURGIIUM,

Artic. I. *Excerptum ex Epistolâ* LEIBNITII ad OLDEMBURGIIUM, 325

Artic. II. *Excerptum ex Epistolâ* TSCHURNAUSII ad OLDEMBURGIIUM, 327

Artic. III. *Epistolâ* NEWTONI ad OLDEMBURGIIUM, 328

OPUSCULUM XII.

Fragmentum Epistolæ NEWTONI ad COLLINSIUM, 358

††††† 3

OPUS-

XXVIII INDEX OPUSCULORUM

OPUSCULUM XIII.

Excerptum ex duabus Epistolis NEWTONI ad WALLISIUM, 361

OPUSCULUM XIV.

Epistola NEWTONI ad CHAMBERLAYNUM,
Artic. I. *Excerptum ex Epistolâ* LEIBNITII ad CHAMBERLAY-
NUM, 373
Artic. II. *Epistolâ* NEWTONI ad CHAMBERLAYNUM, 375

OPUSCULUM XV.

Epistola NEWTONI ad Abbatem CONTI,
Artic. I. *Pars Epistolæ* LEIBNITII ad Abbatem CONTI, 379
Artic. II. *Epistola* NEWTONI ad Abbatem CONTI, 383

OPUSCULUM XVI.

Notæ NEWTONI in Epistolam LEIBNITII ad Abbatem
CONTI,
Artic. I. *Epistola* LEIBNITII ad Abbatem CONTI, 391
Artic. II. *Animadversiones* NEWTONI in *superiorem* LEIBNITII
Epistolam, 401

OPUS-

OPUSCULUM I.
ISAACI NEWTONI
ANALYSIS
PER ÆQUATIONES NUMERO
TERMINORUM INFINITAS,

Edita LONDINI 1711.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I

A

1. THE FIRST

THE SECOND

THE THIRD

THE FOURTH

THE FIFTH

THE SIXTH

THE SEVENTH



D E

A N A L Y S I

P E R Æ Q U A T I O N E S N U M E R O

T E R M I N O R U M I N F I N I T A S .

Methodum generalem, quam de Curvarum quantitate per Infinitam terminorum Seriem mensuranda, olim excogitaveram, in sequentibus breviter explicatam potius quam accuratè demonstratam habes.



Asi AB (Fig. 1.) Curvæ alicujus AD , sit Applicata BD perpendicularis: Et vocetur $AB = x$, $BD = y$, & sint a, b, c , &c. Quantitates datæ, & m, n , Numeri Integri. Deinde,

TAB. I.

Curvarum Simplicium Quadratura.

R E G U L A I

Si $ax^{\frac{m}{n}} = y$; Erit $\frac{an}{m+n} x^{\frac{m+n}{n}} = \text{Area } ABD.$

A 2

Res

Res Exemplo patebit.

1. Si $x^2 (= 1x^2) = y$, hoc est, $a = 1 = n$ & $m = 2$; Erit $\frac{1}{3}x^3 = ABD$.
2. Si $4\sqrt{x} (= 4x^{\frac{1}{2}}) = y$; Erit $\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} (= \frac{8}{3}\sqrt{x^3}) = ABD$.
3. Si $\sqrt[5]{x^5} (= x^1) = y$; Erit $\frac{5}{6}x^{\frac{6}{5}} (= \frac{5}{6}\sqrt[5]{x^6}) = ABD$.
4. Si $\frac{1}{x^2} (= x^{-2}) = y$, id est, si $a = 1 = n$, & $m = -2$;
Erit $(-\frac{1}{1}x^{-1}) = -x^{-1} (= -\frac{1}{x}) = aBD$, infinite ver-

TAB. I. sùs a protensæ (Fig. 2.), quam Calculus ponit negativam, propterea quod jacet ex altera parte Lineæ BD.

5. Si $\frac{1}{\sqrt{x^3}} (= x^{-\frac{3}{2}}) = y$; Erit $(-\frac{2}{1}x^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{2}{\sqrt{x}} = BD a$.
6. Si $\frac{1}{x} (= x^{-1}) = y$; Erit $\frac{1}{0}x^0 = \frac{1}{0}x^0 = \frac{1}{0} \times 1 = \frac{1}{0} =$ Infinitæ, qualis est Area Hyperbolæ ex utraque parte Lineæ BD.

Compositarum Curvarum Quadratura ex Simplicibus.

REGULA II.

Si valor ipsius y ex pluribus istiusmodi Terminis componitur, Area etiam componetur ex Arcis quæ à singulis Terminis emanant.

EXEMPLA PRIMA.

J. T.

Si $x^2 + x^{\frac{5}{2}} = y$; Erit $\frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} = ABD$.

Etenim (Fig. 3.) si semper sit $x^2 = BF$, & $x^{\frac{5}{2}} = FD$, erit, ex præcedente Regula, $\frac{1}{3}x^3 =$ superficiæ AFB descriptæ per Lineam BF, & $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} = AFD$ descriptæ per DF; Quare $\frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} =$ toti ABD.

Sic si $x^2 - x^{\frac{3}{2}} = y$; Erit $\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} = ABD$.

Et si $3x - 2x^2 + x^3 - 5x^4 = y$; Erit $\frac{3}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 - x^5 = ABD$.

EXEM-

DE ANAL. PER ÆQUAT. INFIN. 3

EXEMPLA SECUNDA.

Si $x^{-2} + x^{-\frac{3}{2}} = y$; Erit (*Fig. 6.*) $x^{-1} - 2x^{-\frac{1}{2}} = aBD$. TAB. I.

Vel si $x^{-2} - x^{-\frac{3}{2}} = y$; Erit $x^{-1} + 2x^{-\frac{1}{2}} = aBD$.

Quarum signa si mutaveris, habebis Affirmativum valorem ($x^{-1} + 2x^{-\frac{1}{2}}$ vel, $x^{-1} - 2x^{-\frac{1}{2}}$) superficiei aBD , modò tota cadat supra basim ABa .

Sin aliqua pars cadat infra (quod fit cum Curva decussat suam Basin inter B & a , ut hìc (*Fig. 4.*) vides in d ,) istà parte à parte superiori subductà, habebis valorem Differentiæ: Earum verò Summam si cupis, quære utramque Superficiem seorsim, & adde. Quod idem in reliquis hujus Regulæ exemplis notandum volo.

EXEMPLA TERTIA.

Si $x^2 + x^{-2} = y$; Erit $\frac{1}{2}x^3 - x^{-1} =$ Superficiei descriptæ. Sed hìc notandum est, quòd dictæ Superficiei partes sic inventæ jacent ex diverso latere Lineæ BD .

Nempe, (*Fig. 5.*) posito $x^2 = BF$, & $x^{-2} = FD$; Erit $\frac{1}{2}x^3 = ABF$ Superficiei per BF descriptæ, & $-x^{-1} = DF$ Superficiei descriptæ per DF .

Et hoc semper accidit cum Indices ($\frac{m+n}{n}$) rationum Basis x in valore Superficiei quæsitæ, sint variis signis affecti. In hujusmodi Casibus, pars aliqua $BDd\beta$ Superficiei media (quæ sola dari poterit, cum Superficies sit utrinque infinita) sic invenitur.

Subtrahe Superficiem ad minorem Basin $A\beta$ pertinentem, à Superficie ad majorem Basin AB pertinente, & habebis βBDd Superficiem differentiæ Basium insistentem. Sic in hoc Exemplo. (*Vide Fig. præcedentem.*)

Si $AB = 2$, & $A\beta = 1$; Erit $\beta BDd = \frac{17}{8}$:

Etenim Superficies ad AB pertinens ($ABF - DF a$), erit $\frac{3}{2} - \frac{1}{4}$ sive $\frac{5}{4}$; & superficies ad $A\beta$ pertinens ($A\phi\beta - d\phi a$)

A. 3.

erit $\frac{1}{2} = 1$, five $-\frac{2}{3}$: & earum differentia ($ABF = DF a$
 $= A\phi\beta + \delta\phi a = \beta BD\delta$) erit $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ five $\frac{1}{2}$.

Eodem modo, si $A\beta = 1$, $AB = x$; Erit $\beta BD\delta = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x^3 - x^{-1}$.

Sic si $2x^3 - 3x^2 - \frac{2}{3}x^{-1} + x^{-\frac{2}{3}} = y$, & $A\beta = 1$;

Erit $\beta BD\delta = \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^6 + \frac{2}{3}x^{-1} + \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{4}{18}$.

Denique notari poterit, quod si quantitas x^{-1} in valore ipsius y reperiatur, iste Terminus (cum Hyperbolicam superficiem generat) seorsim à reliquis considerandus est.

TAB. I. Ut si (Fig. 6.) $x^2 + x^{-1} + x^{-1} = y$; Sit $x^{-1} = BF$, & $x^2 + x^{-1} = FD$, ac $A\beta = 1$; Et erit $\delta\phi FD = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^{-2}$, utpote quæ ex Terminis $x^2 + x^{-1}$ generatur.

Quare, si reliqua Superficies $\beta\phi FB$, quæ Hyperbolica est, ex Calculo aliquo sit data, dabitur tota $\beta BD\delta$.

Aliarum omnium Quadratura.

REGULA III.

Sin valor ipsius y , vel aliquis ejus Terminus sit precedentibus magis compositus, in Terminos Simpliciores reducendus est; operando in Literis ad eundem modum quo Arithmetici in Numeris Decimalibus dividunt, Radices extrahunt, vel affectas Aequationes solvunt; & ex istis Terminis quasitam Curva Superficiem, per precedentes Regulas deinceps elicies.

Exempla Dividendo.

TAB. II. Sit $\frac{a^2}{b+x} = y$; Curvâ nempe existente Hyperbolâ (Vid. Fig. 11.)

DE ANAL. PER ÆQUAT. INFIN. 7

Jam ut Æquatio ista à Denominatore suo liberetur, Divisionem sic instituo.

$$b + x) aa + 0 \left(\frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aax^2}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4} \&c. \right.$$

$$\frac{aa + \frac{aax}{b}}{1}$$

$$0 - \frac{aax}{b} + 0$$

$$- \frac{aax}{b} - \frac{aax^2}{b^2}$$

$$0 + \frac{aax^2}{b^2} + 0$$

$$+ \frac{aax^2}{b^2} + \frac{aax^3}{b^3}$$

$$0 - \frac{aax^3}{b^3} + 0$$

$$- \frac{aax^3}{b^3} - \frac{aax^4}{b^4}$$

$$0 + \frac{aax^4}{b^4}$$

&c.

Et sic vice hujus $y = \frac{aa}{b+x}$, nova prodit $y = \frac{a^2}{b} - \frac{a^2x}{b^2} + \frac{a^2x^2}{b^3}$

$- \frac{a^2x^3}{b^4}$, &c. serie istac infinitè continuatà; Adeoque (per Re-

gulam Secundam) Area quæsitæ ABDC æqualis erit ipsi $\frac{a^2x}{b} - \frac{a^2x^2}{2b^2}$

$+ \frac{a^2x^3}{3b^3} - \frac{a^2x^4}{4b^4}$ &c. infinitæ etiam seriei, cujus tamen Termini pauci

initiales sunt in usum quemvis satis exacti, si modo x sit aliquo-

ties minor quam b . Eodem modo, si fit $\frac{1}{1+xx} = y$, Dividendo prodibit

$y = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8$ &c. Unde (per Regulam Secun-

dam) erit ABDC $= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9$ &c.

Vcl

Vel si Terminus xx ponatur in divifore primus, hoc modo $(xx+1)$, prodibit $x^{-2} - x^{-4} + x^{-6} - x^{-8}$ &c. pro valbre ipfius y ; Unde (per Regulam Secundam) erit $BDa = -x^{-1} + \frac{1}{3}x^{-3} - \frac{1}{5}x^{-5} + \frac{1}{7}x^{-7}$ &c. Priori modo procede cum x eft fatis parva, pofteriori cum fatis magna fupponitur.

Denique fi $\frac{2x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{1+x^{\frac{1}{2}}-3x} = y$; Dividendo prodit $2x^{\frac{1}{2}} - 2x + 7x^{\frac{3}{2}}$
 $- 13x^{\frac{5}{2}} + 34x^{\frac{7}{2}}$ &c. unde erit $ABDC = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^2 + \frac{14}{5}x^{\frac{5}{2}}$
 $- \frac{13}{7}x^{\frac{7}{2}}$ &c.

Exempla Radicem extrahendo.

Si fit $\sqrt{aa+xx} = y$, Radicem fic extraho,

$$\begin{array}{r}
 aa + xx \quad (a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \text{ \&c.} \\
 \hline
 aa \\
 \hline
 0 + xx \\
 \hline
 xx + \frac{x^3}{4a^2} \\
 \hline
 0 - \frac{x^3}{4a^2} \\
 \hline
 - \frac{x^3}{4a^2} - \frac{x^5}{8a^4} + \frac{x^7}{64a^6} \\
 \hline
 0 + \frac{x^5}{8a^4} - \frac{x^7}{64a^6} \\
 \hline
 + \frac{x^7}{8a^4} + \frac{x^9}{16a^6} - \frac{5x^{11}}{64a^8} + \frac{x^{13}}{256a^{10}} \\
 \hline
 0 - \frac{5x^9}{64a^6} + \frac{x^{11}}{64a^8} - \frac{x^{13}}{256a^{10}} \\
 \hline
 \text{\&c.}
 \end{array}$$

Unde, pro æquatione $\sqrt{aa+xx} = y$, nova producitur,

$$y = a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} \text{ \&c. Et (per Reg. 2.) Area}$$

TAB. I. quæfita (Fig. 7.) $ABDC$ erit $= ax + \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} + \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1152a^7}$
 &c. Et hæc eft Quadratura Hyperbolæ. Eodem

DE ANALYSE PER ÆQUAT. INFIN.

9

Eodem modo, si fit $\sqrt{ax - x^2} = y$, ejus Radix erit

$$a - \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7}, \&c. \text{ Adeoque (Fig. 12.) Area TAB. II.}$$

$$\text{quæfita ABDC erit æqualis } ax - \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} - \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1152a^7}, \&c.$$

Et hæc est Quadratura Circuli.

Vel, si ponas $\sqrt{x - xx} = y$, erit Radix æqualis infinitæ feriei.

$$x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}} - \frac{5}{128}x^{\frac{9}{2}}, \&c. \text{ Et (Fig. 1.) TAB. I.}$$

$$\text{Area quæfita ABD æqualis erit } \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}}$$

$$- \frac{5}{704}x^{\frac{11}{2}}, \&c., \text{ five } x^{\frac{1}{2}} \text{ in } \frac{2}{3}x - \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{28}x^3 - \frac{1}{72}x^4$$

$$- \frac{5}{704}x^5, \&c. \text{ Et hæc est Area Circuli Quadratura.}$$

Si $\frac{\sqrt{1+ax^2}}{\sqrt{1-bx^2}} = y$, (Cujus Quadratura dat Longitudinem curvæ ellipticæ;) Extrahendo Radicem utramque prodit

$$\frac{1 + \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{8}a^2x^4 + \frac{1}{16}a^3x^6 - \frac{5}{128}a^4x^8}{1 - \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{8}b^2x^4 - \frac{1}{16}b^3x^6 - \frac{5}{128}b^4x^8}, \&c.$$

Et dividendo, sicut fit in Fractionibus Decimalibus, habes

$$\begin{aligned} &1 + \frac{1}{2}bx^2 + \frac{3}{8}b^2x^4 + \frac{5}{16}b^3x^6 + \frac{35}{128}b^4x^8, \&c. \\ &+ \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}ab + \frac{3}{16}a^2b^2 + \frac{5}{32}ab^3 \\ &- \frac{1}{8}a^2 - \frac{1}{16}a^2b - \frac{3}{64}a^3b^2 \\ &+ \frac{1}{16}a^3 + \frac{1}{32}a^3b \\ &- \frac{5}{128}a^4 \end{aligned}$$

$$\text{Adeoque Aream quæfitam } x + \frac{1}{6}bx^3 + \frac{3}{40}b^2x^5, \&c.$$

$$+ \frac{1}{6}a + \frac{1}{20}ab - \frac{b}{40}x^2$$

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

B

Sed

Sed observandum est, quod Operatio non raro abbreviatur per debitam Æquationis præparationem, ut in allato Exemplo $\frac{\sqrt{1+ax^2}}{\sqrt{1-bx^2}} = y$.

Si utramque partem Fractionis per $\sqrt{1-bx^2}$ multiplices prodibit

$$\frac{\sqrt{1+ax^2} - abx^2}{1-bx^2} = y,$$

& reliquum opus perficitur extrahendo Radicem Numeratoris tantum, & dividendo per Denominatorem.

Ex hisce, credo, satis patebit modus reducendi quemlibet valorem ipsius y (quibuscumque Radicibus vel Denominatoribus sit perplexus, ut hic videre est;

$$x^3 + \frac{\sqrt{x^3 - \sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{ax^2 + x^3}} - \frac{\sqrt{x^3 + 2x^2 - x^2}}{\sqrt{x^3 + x^2 - \sqrt{2x^2 - x^2}}} = y \text{ in series}$$

infinitas simplicium Terminorum, ex quibus, per Regulam Secundam, quæsitæ Superficies cognoscetur.

Exemple per Resolutionem Æquationum.

NUMERALIS ÆQUATIONUM AFFECTARUM RESOLUTIO.

Quia tota difficultas in Resolutione latet, modum quo ego utor in Æquatione Numerali primam illustrabo.

Sit $y^2 - 2y - 2 = 0$, resolvenda: Et sit 2, numerus qui minus quam decima sui parte differt à Radice quæsitâ. Tum pono $2 + p = y$, & substituo hunc ipsi valorem in Æquationem, & inde nova prodit $p^3 + 6p^2 + 10p - 1 = 0$, ejus Radix p exquirenda est, ut Quotienti addatur: Nempe (neglectis $p^3 + 6p^2$ ob parvitatem) $10p - 1 = 0$, five $p = 0,1$, prope veritatem est; itaque scribo 0,1 in Quotiente, & suppono $0,1 + q = p$, & hunc ejus valorem, ut prius substituo, unde prodit $q^3 + 6,3q^2 + 11,23q + 0,061 = 0$.

Et cum 11,23q + 0,061 = 0 veritati prope accedat, five fere sit q æqualis $-0,0054$ (dividendo nempe donec tot eliciantur Figuræ quot locis primæ Figuræ hujus & principalis Quotientis exclusive distant), scribo $-0,0054$ in inferiori parte Quotientis, cum negativa sit.

Et supponens $-0,0054 + r = q$, hunc ut prius substituo, & operationem sic produco quo usque placuerit. Verum si ad his tot.

figuras tantum quot in Quotiente jam reperiuntur unâ demptâ, operam continuare cupiam, pro q substituo $-0,0054+r$ in hanc $6,3q^2 + 11,23q + 0,061$, scilicet primo ejus Terminò (q^3) propter exilitatem.

$y^3 - 2y - 5 = 0$		$+ 2,10000000$ $- 0,00544853$ $+ 2,09455147 = y$
$2 + p = y$	$+ y^3$	$+ 8 + 12p + 6p^2 + p^3$
	$- 2y$	$- 4 - 2p$
	$- 5$	$- 5$
	Summa	$- 1 + 10p + 6p^2 + p^3$
$0,1 + q = p$	$+ p^3$	$+ 0,001 + 0,03q + 0,3q^2 + q^3$
	$+ 6p^2$	$+ 0,06 + 1,2 + 6,0$
	$+ 10p$	$+ 1, + 10,$
	$- 1$	$- 1,$
	Summa	$+ 0,061 + 11,23q + 6,3q^2 + q^3$
$-0,0054 + r = q$	$+ 6,3q^2$	$+ 0,000183708 - 0,06804r + 6,3r^2$
	$+ 11,23q$	$- 0,060642 + 11,23$
	$+ 0,061$	$+ 0,061$
	Summa	$+ 0,000541708 + 11,16196r + 6,3r^2$
$-0,00004853 + r = r$		

suam neglecto, & prodit $6,3r^2 + 11,16196r + 0,000541708 = 0$ fere; live (rejectione $6,3r^2$) $r = \frac{-0,000541708}{11,16196} = -0,00004853$ fere, quam scribo in negativa parte Quotientis. Denique negativam partem Quotientis ab Affirmativa subducens habeo $2,09455147$ Quotientem quæsitam.

Æquationes plurium dimensionum nihilo fecius resolvuntur, & operam sub fine, ut hic factum fuit, levabis, si primos ejus Terminos gradatim omiseris.

Præterea notandum est quod in hoc exemplo, si dubitarem an $0,1 = p$ veritati satis accederet, pro $10p - 1 = 0$, finxissem $6p^2 + 10p - 1 = 0$, & ejus Radicis primam Figuram in Quotiente scripsissem; & secundam vel tertiam Quotientis Figuram sic explorare convenit, ubi in Æquatione ista ultimo resultante quadratum coefficientis penultimi Terminì, non sit decies majus quam factus ex ultimo Terminò ducto in coefficientem Terminì antepenultimi.

Imo laborem plerumque minues, præsertim in *Æquationibus* plurimarum dimensionum, si Figuras omnes Quotienti addendas dicto modo (hoc est extrahendo minorem Radicum, ex tribus ultimis Terminis *Æquationis* novissime resultantis) exquiras. Isto enim modo Figuras duplo plures qualibet vice Quotienti lucraberis.

Hæc Methodus resolvendi *Æquationes* pervulgata an sit nescio, certe mihi videtur præ reliquis simplex, & usui accommodata. Demonstratio ejus ex ipso modo operandi patet, unde cum opus sit, in memoriam facile revocatur.

Æquationes in quibus vel aliqui vel nulli Termini desint, eadem fere facilitate tractantur; & *Æquatio* semper relinquitur, cujus Radix unâ cum acquisita Quotiente adæquat Radicem *Æquationis* primo propositæ. Unde Examinatio Operis hîc æque poterit institui ac in reliqua Arithmetica, auferendo nempe Quotientem à Radice primæ *Æquationis* (sicut Analystis notum est) ut *Æquatio* ultima vel Termini ejus duo tresve ultimi producantur inde. Quicquid laboris hîc est, istud in Operatione substituendi quantitates unas pro aliis reperietur: Id quod varie perficias, at sequentem modum maxime expeditum puto, præsertim ubi Numeri coefficientes constant ex pluribus Figuris.

Sit $p + 3$ substituenda pro y in hanc $y^4 - 4y^3 + 5y^2 - 12y + 17 = 0$. Et cum ista possit resolvi in hanc formam

$y^4 - 4 \times y + 5 \times y - 12 \times y + 17 = 0$. *Æquatio* nova sic generabitur
 $p^4 - 11 \times p + 3 = p^4 + 2p - 3$. & $p^4 + 2p + 2$ in $p + 3 = p^4 + 5p^2 + 8p + 6$. & $p^4 + 5p^2 + 8p - 6$ in $p + 3 = p^4 + 8p^2 + 23p^2 + 18p - 18$. & $p^4 + 8p^2 + 23p^2 + 18p - 18 = 0$, quæ quærebatur.

LITERALIS *ÆQUATIONUM* AFFECTARUM RESOLUTIO.

His in numeris sic ostensis: Sit *Æquatio* literalis $y^3 + a^2y - 2a^3 + a \times y - x^3 = 0$, resolvenda.

Primum

Primum inquiri valorem ipsius y cum x sit nulla, hoc est, elicio Radicem hujus Æquationis $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$, & invenio esse $+a$. Itaque scribo $+a$ in Quotiente, & supponens $+a + p = y$, substituo pro y valorem ejus, & Terminos inde resultantes ($p^3 + 3ap^2 + 4a^2p$, &c.) margini appono; Ex quibus assumo $+4a^2p + a^2x$ Terminos utique ubi p & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & eos nihilo fere æquales esse suppono, sive $p = -\frac{1}{4}x$ fere, vel $p = -\frac{1}{4}x + q$. Et scribens $-\frac{1}{4}x$ in Quotiente, substituo $-\frac{1}{4}x + q$ pro p ; Et Terminos inde resultantes iterum in margine scribo, ut vides in annexo schemate, & inde assumo Quantitates $+4a^2q - \frac{1}{16}ax^2$, in quibus utique q & x seorsim sunt minimarum dimensionum, & fingo $q = \frac{xx}{64a}$ fere, sive $q = +\frac{xx}{64a} + r$; & adnectens $+\frac{xx}{64a}$ Quotienti, substituo $\frac{xx}{64a} + r$ pro q ; & sic procedo quo usque placuerit.

$y^3 + a^2y - 2a^3 + axy - x^3 = 0$ $y = a - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3}, \&c.$		
$+a+p=y$	$+y^3$ $+a^2y$ $+axy$ $-2a^3$ $-x^3$	$+a^3 + 3a^2p + 3ap^2 + p^3$ $+a^3 + a^2p$ $+a^2x + axp$ $-2a^3$ $-x^3$
$-\frac{1}{4}x+q=p$	$+p^3$ $+3ap^2$ $+4a^2p$ $+axp$ $+a^2x$ $-x^3$	$-\frac{1}{64}x^3 + \frac{3}{16}x^2q - \frac{3}{4}xq^2 + q^3$ $+\frac{3}{16}ax^2 - \frac{1}{2}axq + 3aq^2$ $-a^2x + 4a^2q$ $-\frac{1}{4}ax^2 + axq$ $+a^2x$ $-x^3$
$+\frac{x^2}{64a}+r=q$	$+3aq^2$ $+4a^2q$ $-\frac{1}{2}axq$ $+\frac{3}{16}x^2q$ $-\frac{1}{16}ax^2$ $-\frac{65}{64}x^3$	$+\frac{3x^4}{4096a} + \frac{3}{32}x^2r + 3ar^2$ $+\frac{1}{16}ax^2 + 4a^2r$ $-\frac{5}{128}x^3 - \frac{5}{2}axr$ $+\frac{3x^4}{1024a} + \frac{3}{16}x^2r$ $-\frac{5}{16}ax^2$ $-\frac{65}{64}x^3$
$+4a^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{2}{32}x^2) + \frac{131}{128}x^3 - \frac{15x^4}{4096a} (+ \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3})$		

Sin duplo tantum plures Quotienti Terminos, uno dempto, jungendos adhuc vellem : Primo Termino (q^3) Equationis novissime resultantis misso, & ista etiam parte ($-\frac{3}{4}q^2$) secundi, ubi x est tot dimensionum quot in penultimo Quotientis; In reliquos Terminos ($3aq^2 + 4a^2q$, &c.) margini adscriptos ut vides, substituo $\frac{x^2}{64a} + r$ pro q ; & ex ultimis duobus Terminis ($\frac{15x^4}{4096a} - \frac{131}{128}x^3$

+

$+ \frac{9}{32} x^2 r - \frac{1}{2} axr + 4a^2 r$) Equationis inde resultantis, facta divisione, $4a^2 - \frac{1}{2} ax + \frac{9}{32} x^2$) $+ \frac{131}{128} x^r - \frac{15x^4}{4096a}$ elicio $(+ \frac{131x^3}{512a^2}$
 $+ \frac{509x^4}{16384a^3}$) Quotienti adnectendos.

Denique Quotiens ista $(a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a}, \&c.)$ per Regulam secundam, dabit $ax - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048a^2} + \frac{509x^5}{81920a^3}, \&c.$ pro Area quaesita, quæ ad veritatem tanto magis accedit, quanto x fit minor.

Alius modus eandem Resolvendi.

Sin valor Areæ tanto magis ad veritatem accedere debet quanto x fit major; Exemplum esto $y^3 + axy + x^2y - a^3 - 2x^3 = 0$. Itaque hanc resoluturus excerpo Terminos $y^3 + x^2y - 2x^3$ in quibus x & y vel seorsim, vel simul multiplicatæ, sunt & plurimarum, & æqualium ubique dimensionum; & ex iis quasi nihilo æqualibus Radicem elicio. Hanc invenio esse x , & in Quotiente scribo. Vel, quod eodem recidit, ex $y^3 + y - 2$ (unitate pro x substituta) Radicem extraho, quæ hic prodit 1, & eam per x multiplico, & factum (x) in Quotiente scribo. Denique pono $x + p = y$, & sic procedo ut in priori Exemplo, donec habeam Quotientem

$x - \frac{a}{4} + \frac{aa}{64x} + \frac{131a^3}{512x^2} + \frac{509a^4}{16384x^3}, \&c.$ Adeoque Aream
 $\frac{x^2}{2} - \frac{ax}{4} + \left[\frac{aa}{64x} \right] - \frac{131a^3}{512x} - \frac{509a^4}{32768x^2},$ de qua vide exempla tertia Regulæ secundæ. Lucis gratia dedi hoc exemplum in omnibus idem cum priori, modò x & a sibi invicem ibi substituantur, ut non opus esset aliud Resolutionis exemplum hic adjungere.

Area autem $(\frac{xx}{2} - \frac{ax}{4} + \left[\frac{aa}{64x} \right], \&c.)$ terminatur ad Curvam quæ juxta Asymptoton aliquam in infinitum serpit; & Termini initiales $(x - \frac{1}{4}a)$ valoris extracti de y , in Asymptoton istam semper terminantur; unde portionem Asymptoti facillè invenies. Idem semper
 notan-

notandum est cum Area designatur Terminis plus plúsque divisís per x continuè, præterquamquod vice Asymptoti rectæ quandoque habeatur Parabola conica, vel alia magis composita.

Sed hunc modum missum faciens, utpote particularem, quia non applicabilem Curvis in orbem ad instar Ellipsium flexis; de altero modo per exemplum $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, supra ostenso (scilicet quo dimensiones ipsius x in Numeratoribus Quotientis perpetuo augeantur) annotabo sequentia.

1. Si quando accidit quod valor ipsius y , cum x nullum esse fingitur, sit quantitas furda vel penitus ignota, licebit illam litera aliqua designare. Ut in exemplo, $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = 0$; si Radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3$ fuisset furda vel ignota, finxissem quamlibet (b) pro ea ponendam; & Resolutionem ut sequitur perfecissem. Scribens b in Quotiente, suppono $b + p = y$, & istum pro y substituo, ut vides; unde nova $p^3 + 3bp^2$, &c. resultat, rejectis Terminis $b^3 + a^2b - 2a^3$, qui nihilo sunt æquales, propterea quod b supponitur Radix hujus $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$. Deinde Termini $3b^2p + a^2p + abx$ dant $-\frac{abx}{3b^2 + a^2}$ Quotienti apponendum, & $-\frac{abx}{3b^2 + a^2} + q$ substituendum pro p , &c.

$y^3 + axy$

$y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$. Sit $cc = 3b^2 + a^2$. $y = b - \frac{abx}{c^2} + \frac{a^2bx^2}{c^6} + \frac{x^3}{c^3} + \frac{a^3b^3x^3}{c^6} - \frac{a^5bx^3}{c^8} + \frac{6a^5b^3x^3}{c^{10}}$, &c.		
$b + p = y$	$+ y^3$ $+ axy$ $+ aay$ $- x^3$ $- 2a^3$	$+ b^3 + 3b^2p + 3bp^2 + p^3$ $+ abx + axp$ $+ aab + aap$ $- x^3$ $- 2a^3$
$-\frac{abx}{cc} + q = p$	$+ p^3$ $+ 3bp^2$ $+ axp$ $+ ccp$ $- x^3$ $+ abx$	$- \frac{a^3b^3x^3}{c^4}$, &c. $+ \frac{3a^3b^3x^3}{c^4} - \frac{6ab^3x}{c^2} q$, &c. $- \frac{a^2bx^2}{c^2} + axq$ $- abx + ccq$ $- x^3$ $+ abx$
$c^2 + ax - \frac{6ab^3x}{cc} - \frac{a^2bx^2}{c^4} + x^3 + \frac{a^3b^3x^3}{c^6} \left(\frac{a^2bx^2}{c^6} + \frac{x^3}{c^2} + \frac{a^3b^3x^3}{c^8} \right)$, &c.		

Completo opere, fumo numerum aliquem pro a , & hanc $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$, sicut de numerali Æquatione ostensum suprà, resolvo; & Radicem ejus pro b substituo.

2. Si dictus valor sit nihil, hoc est, si in Æquatione resolvendâ nullus sit Terminus, nisi qui per x vel y sit multiplicatus, ut in hac $y^3 - axy + x^3 = 0$; tum Terminos ($-axy + x^3$) seligo, in quibus x seorsim & y etiam seorsim, si fieri potest, aliàs per x multiplicata, sit minimarum dimensionum. Et illi dant $+\frac{xx}{a}$ pro pri-

mo Terminò Quotientis, & $\frac{xx}{a} + p$ pro y substituendum. In hac $y^3 - a^2y + axy - x^3 = 0$, licebit primum Terminum Quotientis vel ex $-a^2y - x^3$, vel ex $y^3 - a^2y$ elicere.

3. Si valor iste sit imaginarius, ut in hac $y^4 + y^3 - 2y + 6 - x^2y^2 - 2x + x^2 + x^4 = 0$, augeo vel imminuo quantitatem x donec dictus valor evadat realis.

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

C

Sib

TAB. II. Sic in annexo *schemate* (Fig. 8.), cum AC (x) nulla est, tum CD (y) est imaginaria.

Sin minuatur AC per datam AB, ut BC fiat x ; tum posito quòd BC (x) sit nulla, CD (y) erit valore quadruplici (CE, CF, CG, vel CH) realis; quarum Radicum (CE, CF, CG, vel CH) quælibet potest esse primus Terminus Quotientis, prout superficies BEDC, BFDC, BGDC, vel BHDC desideratur. In aliis etiam casibus, si quando hæsit, te hoc modo extricabis.

Denique, si index potestatis ipsius x vel y sit fractio, reduco ipsum ad integrum: ut in hoc exemplo $y^4 - xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{4}{3}} = 0$. Posito $y^{\frac{1}{2}} = v$, & $x^{\frac{1}{3}} = z$, resultabit $v^8 - z^4v + z^4 = 0$, cujus Radix est $v = z + z^3$, &c. five (restituendo valores) $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{3}} + x$, &c. & quadrando $y = x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{4}{3}}$, &c.

Et hæc de arcis Curvarum investigandis dicta sufficiant. Imo, cum Problemata omnia de Curvarum Longitudine, de quantitate & superficie Solidorum, deque Centro Gravitatis, possunt eò tandem reduci, ut quæatur quantitas Superficie planæ lineâ curvâ terminatæ, non opus est quicquam de iis adjungere. In istis autem quo ego operor, modo dicam brevissime.

Applicatio prædictorum ad reliqua istiusmodi Problemata.

TAB. II. Sit (Fig. 9.) ABD Curva quævis, & AHKB rectangulum, cujus latus AH vel BK est unitas. Et cogita rectam DBK uniformiter ab AH motam, areas ABD & AK describere; & quòd BK (1) sit momentum, quo AK (x), & BD (y) momentum, quo ABD gradatim augetur; & quòd ex momento BD perpetim dato, possis, per prædictas regulas, aream ABD ipso descriptam investigare, five cum areâ AK (x) momento 1 descriptâ conferre.

Jam, quâ ratione Superficies ABD ex momento suo perpetim dato, per præcedentes regulas elicitur, eadem quælibet alia quantitas ex momento suo sic dato elicitur. Exemplo res fiet clarior.

Longi-

Longitudines Curvarum invenire.

Sit (Fig. 10.) ADLE Circulus, cujus Arcus AD longitudo est TAB. II. indaganda. Ducta tangente DHT, & completo indefinite parvo rectangulo HGBK, & posito $AE = 1 = 2AC$. Erit, ut BK, five GH, momentum Basis AB (x), ad HD momentum Arcus AD

$$:: BT : DT :: BD (\sqrt{x - xx}) : DC (\frac{1}{2}) :: 1 (BK) :$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x - xx}} (DH). \text{ Adeoque } \frac{1}{2\sqrt{x - xx}} \text{ five } \frac{\sqrt{x - xx}}{2x - 2xx} \text{ est mo-}$$

mentum Arcus AD. Quod reductum fit $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{16}x^{\frac{3}{2}}$

$+ \frac{5}{32}x^{\frac{5}{2}} + \frac{35}{256}x^{\frac{7}{2}} + \frac{63}{512}x^{\frac{9}{2}}$, &c. Quare, per regulam secundam,

longitudo Arcus AD est $x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{6}x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{40}x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{112}x^{\frac{7}{2}} + \frac{35}{1152}x^{\frac{9}{2}}$

$+ \frac{63}{2816}x^{\frac{11}{2}}$, &c. five $x^{\frac{1}{2}}$ in $1 + \frac{1}{6}x + \frac{3}{40}x^2 + \frac{5}{112}x^3 + \frac{35}{1152}x^4$

$+ \frac{63}{2816}x^5$, &c.

Non secus pōnendo CB esse x , & Radium CA esse 1, invenies Arcum LD esse $x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7$, &c.

Sed notandum est, quòd unitas ista, quæ pro momento ponitur, est Superficies cum de Solidis, & Linea cum de Superficiebus, & Punctum cum de Lineis (ut in hoc exemplo) agitur.

Nec vereor loqui de unitate in Punctis, five Lineis infinite parvis, siquidem proportionales ibi jam contemplantur Geometræ, dum utuntur methodis Indivisibilium.

Ex his fiat conjectura de Superficiebus & quantitibus Solidorum, ac de Centris Gravitatum.

Invenire prædictorum conversum.

Verùm si è contra ex areâ vel longitudine &c. Curvæ alicujus: data longitudo Basis AB desideratur, ex Æquationibus per præcedentes regulas inventis extrahatur Radix de x .

Inventio Basis ex Area data.

TAB. II. Ut si (Fig. 11.) ex areâ ABDC Hyperbolæ ($\frac{1}{1+x} = y$) datâ, cupiam basim AB investigare, areâ istâ z nominatâ, extraho Radicem hujus z (ABCD) $= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$, &c. neglectis illis Terminis, in quibus x est plurium dimensionum quàm z in Quotiente desideratur.

Ut, si vellem quòd z ad quinque tantum dimensiones in Quotiente ascendat, negligo omnes $-\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{8}x^8$, &c. & Radicem hujus tantum $\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - z = 0$ extraho.

$x = z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5; \&c.$		
$x + p = x$	$+$ $\frac{1}{5}x^5$ $-$ $\frac{1}{4}x^4$ $+$ $\frac{1}{3}x^3$ $-$ $\frac{1}{2}x^2$ $+$ x $-$ z	$+$ $\frac{1}{5}z^5, \&c.$ $-$ $\frac{1}{4}z^4 - z^3p, \&c.$ $+$ $\frac{1}{3}z^3 + z^2p + zp^2, \&c.$ $-$ $\frac{1}{2}z^2 - zp - \frac{1}{2}p^2$ $+$ $z + p$ $-$ z
$\frac{1}{2}x^2 + q = p$	$+$ zp^2 $-$ $\frac{1}{2}p^2$ $-$ z^3p $+$ z^2p $-$ xp $+$ p $+$ $\frac{1}{5}z^5$ $-$ $\frac{1}{4}z^4$ $+$ $\frac{1}{3}z^3$ $-$ $\frac{1}{2}z^2$	$+$ $\frac{1}{4}z^5, \&c.$ $-$ $\frac{1}{8}z^4 - \frac{1}{2}z^2q, \&c.$ $-$ $\frac{1}{2}z^3, \&c.$ $+$ $\frac{1}{2}z^4 + z^2q$ $-$ $\frac{1}{2}z^3 - xq$ $+$ $\frac{1}{2}z^2 + q$ $+$ $\frac{1}{5}z^5$ $-$ $\frac{1}{4}z^4$ $+$ $\frac{1}{3}z^3$ $-$ $\frac{1}{2}z^2$
$1 - z + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{8}z^4 + \frac{1}{20}z^5 - (\frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5)$		

Analyfin, ut vides, exhibui propter adnotanda duo sequentia

C. 3.

I. Quod

1. Quòd inter substituendum, istos Terminos semper omitto, quos nulli deinceps alii fore praevideam. Cujus rei regula esto, quòd post primum Terminum ex qualibet quantitate sibi collateralì resultantem, non addo plures Terminos dextrorsum, quam istius primi Termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ unitatibus distat. Ut in hoc exemplo, ubi maxima dimensio est 5, omisi omnes Terminos post z^5 , post z^4 posui unicum, & duos tantum post z^3 . Cum Radix extrahenda (x) sit parium ubique, vel imparium dimensionum, hæc esto regula; Quòd post primum Terminum ex qualibet quantitate sibi collateralì resultantem, non addo plures Terminos dextrorsum, quam istius primi Termini index dimensionis ab indice dimensionis maximæ binis unitatibus distat; vel ternis unitatibus, si indices dimensionum ipsius x unitatibus ubique ternis à se invicem distant, & sic de reliquis.

2. Cum video p , q , vel r , &c. in Equatione novissime resultantem esse unius tantum dimensionis, ejus valorem, hoc est, reliquos Terminos Quotienti addendos, per divisionem quæro. Ut hic vides factum.

Inventio Basis ex data Longitudine Curva.

TAB. II. Si (Fig. 12.) ex dato arcu aD Sinus AB desideratur; Equationis $z = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7$, &c. supra inventæ, (posito nempe $AB = x$, $aD = z$, & $Aa = 1$;) Radix extracta erit $x = z - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 - \frac{1}{5040}z^7 + \frac{1}{362880}z^9$, &c.

Et præterea, si Cosinum $A\beta$ ex isto arcu dato cupis, fac $A\beta$ ($= \sqrt{1 - xx}$) $= 1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{24}z^4 - \frac{1}{720}z^6 + \frac{1}{40320}z^8 - \frac{1}{3628800}z^{10}$, &c.

De Serie progressionum continuanda.

Hic obiter notetur, quòd 5 vel 6 Terminis istarum Radicum cognitis, eas plerumque ex analogia observata poteris ad arbitrium producere.

Sic

Sic hanc $x = z + \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{24} z^4 + \frac{1}{120} z^5$, &c. produces dividendo ultimum Terminum per hos ordine numeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

Et hanc $x = z - \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{120} z^5 - \frac{1}{5040} z^7$, &c. per hos $2 \times 3, 4 \times 5, 6 \times 7, 8 \times 9, 10 \times 11$, &c.

Et hanc $x = 1 - \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{24} z^4 - \frac{1}{720} z^6$, &c. per hos $1 \times 2, 3 \times 4, 5 \times 6, 7 \times 8, 9 \times 10$, &c.

Et hanc $x = z + \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{40} z^5 + \frac{1}{112} z^7$, &c. multiplicando per hos $\frac{1 \times 1}{2 \times 3}, \frac{3 \times 3}{4 \times 5}, \frac{5 \times 5}{6 \times 7}, \frac{7 \times 7}{8 \times 9}$, &c. Et sic in reliquis.

Applicatio prædictorum ad Curvas mechanicas.

Et hæc de curvis geometricis dicta sufficiant. Quinetiam Curva etiamfi mechanica sit, methodum tamen nostram nequaquam requirit.

Exemplo fit (*Fig. 13.*) Trochoides A D F G, cujus vertex, A, & axis A H, & A K H rota, quâ describitur. Et quærat Superficies A B D. Jam posito A B = x , B D = y , ut supra, & A H = 1; primo quæro Longitudinem ipsius B D. Nempe ex natura Trochoidis est K D = arcui A K. Quare tota B D = B K + arc. A K. Sed

est B K (= $\sqrt{x - xx}$) = $x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16} x^{\frac{7}{2}}$, &c.

& (ex prædictis) arcus A K = $x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{6} x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{40} x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{112} x^{\frac{7}{2}}$,

&c. Ergo tota B D = $2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{20} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{56} x^{\frac{7}{2}}$, &c.

Et (per Reg. 2.) area A B D = $\frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{15} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{70} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{252} x^{\frac{9}{2}}$, &c.

Vel brevius sic: Cum recta A K tangenti T D parallela sit, erit A B ad B K sicut momentum lineæ A B ad momentum lineæ B D, hoc est x ;

$\sqrt{x - xx}$

$$\sqrt{x-xx} :: 1 : \frac{1}{x} \sqrt{x-xx} = x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{8} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{16} x^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{128} x^{\frac{7}{2}}, \text{ \&c. Quare (per Reg. 2.) } BD = 2x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{20} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{56} x^{\frac{7}{2}} - \frac{5}{576} x^{\frac{9}{2}}, \text{ \&c. Et Superficies ABD} = \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{15} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{70} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{252} x^{\frac{9}{2}} + \frac{5}{3168} x^{\frac{11}{2}}, \text{ \&c.}$$

Non diffimili modo (posito C centro Circuli, & CB = x.) obtinebis aream CBDF, &c.

Sit (Fig. 14.) area ABDV Quadratricis VDE (cujus vertex est V, & A centrum circuli interioris VK cui aptatur) invenienda. Ducta qualibet AKD, demitto perpendiculares DB, DC, KG. Erítque KG: AG::AB(x):BD(y), five $\frac{x \times AG}{KG} = y$. Verùm ex naturâ Quadratricis est BA (=DC) = arcui VK, five VK = x. Quare posito AV = 1, erit GK = $x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5$, &c., ex supra ostensis, & GA = $1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 - \frac{1}{720} x^6$, &c.

$$\text{Adeòque } y (= \frac{x \times AG}{KG}) = \frac{1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 - \frac{1}{720} x^6}{1 - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{120} x^4 - \frac{1}{5040} x^6}, \text{ \&c.}$$

five, divisione factâ, $y = 1 - \frac{1}{3} x^2 + \frac{1}{45} x^4 - \frac{2}{945} x^6$, &c. & (per Reg. 2.) area AVDB = $x - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{225} x^5 - \frac{2}{6615} x^7$, &c.

Sic longitudo Quadratricis VD, licet calculo difficiliore, determinabilis est.

Nec quicquam hujusmodi scio, ad quod hæc methodus, idque variis modis, sese non extendit. Imo tangentes ad curvas mechanicas (si quando id non aliàs fiat) hujus ope ducantur. Et quicquid vulgaris Analyſis per Æquationes ex finito Terminorum numero constantes

tantes, (quando id fit possibile,) perficit, hæc per Æquationes infinitas semper perficiat: Ut nil dubitaverim nomen Analysis etiam huic tribuere. Ratiocinia nempe in hac non minus certa sunt quàm in illà, nec Æquationes minus exactæ; licet omnes earum Terminos, nos homines & rationis finitæ nec designare neque ita concipere possimus, ut quantitates inde desideratas exacte cognoscamus: Sicut Radices surdæ finitarum Æquationum nec numeris nec quavis arte analyticà ita possunt exhiberi ut alicujus quantitas à reliquis distincta exacte cognoscatur.

Denique ad Analyticam meritò pertinere censeatur cujus beneficio Curvarum areæ & longitudines &c. (id modò fiat) exactè & geometricè determinentur. Sed ista narrandi non est locus; respicienti duo, præ reliquis, demonstranda occurrunt.

I.

*Demonstratio quadraturæ Curvarum simplicium
in Regula prima.*

Preparatio pro Regula prima demonstranda.

Sit itaque (Fig. 15.) Curvæ alicujus AD δ Basis AB = x , perpendiculariter applicata BD = y , & area ABD = z , ut priùs. Item sit B β = o , BK = v , & rectangulum B β HK (ov) æquale spatio B β δ D.

Eft ergo A β = $x + o$, & A δ β = $z + ov$. His præmissis, ex relatione inter x & z ad arbitrium assumptà, quæro y isto, quem sequentem vides, modo.

Pro lubitu fumatur $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = z$, five $\frac{4}{9} x^3 = z z$. Tum $x + o$

(A β) pro x , & $z + ov$ (A δ β) pro z substitutis, prodibit $\frac{4}{9}$ in $x^3 + 3x^2o + 3xo^2 + o^3 = (\text{ex natura Curvæ}) z^2 + 2zov + o^2v^2$.

Et sublati ($\frac{4}{9} x^3$ & $z z$) æqualibus, reliquisque per o divis, restat

$\frac{4}{9}$ in $3x^2 + 3xo + o^2 = 2zv + ov^2$. Si jam supponamus B β in

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

D

infi-

infinitum diminui & evanescere, five o esse nihil, erunt v & y æquales, & Termini per o multiplicati evanescent, quare restabit $\frac{4}{9} \times 3xx = 2zv$, five $\frac{2}{3}xx (=zy) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}y$, five $x^{\frac{1}{2}} (= \frac{x^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}}) = y$.

Quare è contra, si $x^{\frac{1}{2}} = y$, erit $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$.

Demonstratio.

Vel generaliter, si $\frac{n}{m+n} \times ax^{\frac{m+n}{n}} = z$; five ponendo $\frac{na}{m+n} = c$, & $m+n=p$, si $c x^{\frac{p}{n}} = z$, five $c^n x^p = z^n$: tum $x+o$ pro x , & $z+ov$ (five, quod perinde est, $z+ay$) pro z , substitutis, prodit c^n in $x^p + po x^{p-1}$, &c. $= z^n + noy z^{n-1}$, &c. reliquis nempe Terminis, qui tandem evanescent, ommissis. Jam sublatis $c^n x^p$ & z^n æqualibus, reliquisque per a divisis, restat $c^n p x^{p-1} = ny z^{n-1}$ ($= \frac{ny^n}{z} = \frac{ny c^n x^p}{c x^{\frac{p}{n}}}$ five, dividendo per

$c^n x^{\frac{p}{n}}$, erit $p x^{\frac{p}{n}-1} = \frac{ny}{c} \text{ five } p c x^{\frac{p-n}{n}} = ny$; vel restituendo

$\frac{na}{m+n}$ pro c , & $m+n$ pro p , hoc est, m pro $p-n$, & na pro pc ,

fiet: $ax^{\frac{m}{n}} = y$. Quare è contra si $ax^{\frac{m}{n}} = y$, erit $\frac{n}{m+n} ax^{\frac{m+n}{n}} = z$.

Q. E. D.

Inventio Curvarum quæ possunt quadrari.

Hinc in transitu notetur modus quo Curvæ tot quot placuerit, quarum aræ sunt cognitæ, possunt inveniri; fumendo nempe quamlibet.

libet æquationem pro relatione inter aream z & basin x ut inde quærat applicata y . Ut si supponas $\sqrt{aa+xx} = z$, ex calculo invenies $\frac{x}{\sqrt{aa+xx}} = y$. Et sic de reliquis.

I I.

Demonstratio resolutionis Æquationum affectarum.

Alterum demonstrandum est literalis Æquationum affectarum resolutio. Nempe, quòd Quotiens, cùm x sit satis parva, quo magis producitur eo magis ad veritatem accedit, ut defectus (p , q , vel r , &c.) quo distat ab exacto valore ipsius y , tandem evadat minor quavis data quantitate; & in infinitum producta sit ipsi y æqualis. Quod sic patebit.

1. Quoniam ex ultimo Termino Æquationum, quarum p , q , r , &c. sunt Radices, quantitas illa, in qua x est minimæ dimensionis (hoc est, plusquam dimidium istius ultimi Termini, si supponis x satis parvam esse) in qualibet operatione perpetuo tollitur: iste ultimus Terminus (per 1. 10. *Elem.*) tandem evadet minor quavis data quantitate; & prorsus evanescet si opus infinite continuatur.

Nempe si $x = \frac{1}{2}$, erit x dimidium omnium $x + x^2 + x^3 + x^4$, &c., & x^2 dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4 + x^5$, &c. Itaque si x superet $\frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + x^2 + x^3$, &c., & x^2 plusquam dimidium omnium $x^2 + x^3 + x^4$, &c. Sic si $\frac{x}{b}$ major sit $\frac{1}{2}$, erit x plusquam dimidium omnium $x + \frac{x^2}{b} + \frac{x^3}{bb}$, &c. Et sic de reliquis. Et numeros coefficientes quod attinet, illi plerumque descrescunt perpetuo, vel si quando increscant, tantum opus est ut x aliquoties adhuc minor supponatur.

2. Si ultimus Terminus alicujus Æquationis continuo diminuatur donec tandem evanescat, una ex ejus Radicibus etiam diminuetur donec cum ultimo Termino simul evanescat.

3. Quare quantitatum p , q , r , &c. unus valor continuo decre-

D 2

cit

cit donec tandem, cùm opus in infinitum producitur, penitus evanescat.

4. Sed valores istarum p , q , vel r , &c. unâ cum Quotiente eatenus extractâ adæquant Radices Æquationis propositæ (Sic in resolutione Æquationis $y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, supra ostensâ, percipies $y = a + p = a - \frac{1}{4}x + q = a - \frac{1}{4}x + \frac{xx}{64a} + r$, &c.) Unde satis liquet propositum, quòd Quotiens infinite productus sit unus ex valoribus de y .

Idem patebit substituendo Quotientem pro y in Æquationem propositam. Videbis enim Terminos illos sese perpetuo destruere, in quibus x est minimarum dimensionum.




OPUS

OPUSCULUM II.
METHODUS
FLUXIONUM ET SERIERUM
INFINITARUM,
Cum ejusdem
APPLICATIONE AD CURVARUM
GEOMETRIAM;
AUCTORE
ISAACO NEWTONO,
Equite & Regia Societatis Praeside,

Anglicè edita

à JOHANNÉ COLSONO M. A. & R. S. S. &c.

LONDINI An. 1736.



METHODUS FLUXIONUM ET SERIERUM INFINITARUM.

INTRODUCTIO.

De Resolutione Æquationum per Series infinitas.



UM animadvertissēm, quòd multi ex recentioribus Geometris, neglectā Vèterum syntheticā methodo, præcipuam dederant operam colendæ arti analyticiæ, quâ freti perficere valuerunt tot, & tam ardua, ut omnes geometricas speculationes pertractasse & exhaustisse videantur, præter Curvarum quadraturas, & nonnulla alia hujus generis nondum satis perspecta & ponderata: non extra rem putavi libellum hunc in Tyronum Geometrarum gratiam conscribere, in quo fines Analyseos proferre, & Curvarum doctrinam augere conatus sum.

Operatio-

Operationes, quæ *speciebus*, & ex quæ vulgaribus *numeris* perficiuntur, per similes sunt, & solum differre videntur characteribus quibus exponuntur, quorum primi sunt generales & indefiniti, alteri verò definiti, & peculiares; quapropter miror neminem animum appulisse (si saltem excipias Hyperbolæ quadraturam inventam à NICOLAO MERCATORE) ad speciebus accommodandam nuper repertam doctrinam Fractionum decimalium, præcipuè cum sic via fieri potuisset ad inventa difficiliora & majoris momenti. Quia verò hæc specierum doctrina eandem habet rationem ad Algebram, ac numerorum decimalium scientia ad vulgarem Arithmetica; hinc facile additionem, subtractionem, divisionem, multiplicationem, & Radicum extractionem discere quis potest, dummodo in decimali ac speciosa Arithmetica versatus sit, nec animum divertat unquam ab analogiâ, quæ est inter decimales Fractiones, & algebraicos Terminos in infinitum productos. Nam, quod numeris accidit, id est, quod eò magis eorum valor decrescit in decimali, vel subdecuplâ ratione, quò magis ad dextram accedunt, id, respectivè, locum etiam habet in speciebus, quando Termini (ut sæpius in sequentibus imperatur) juxta dimensiones Numeratoris, vel Denominatoris cujusque sunt dispositi in uniformem progressionem in infinitum prolatam. Et, ut Fractiones decimales hoc afferunt commodi, quod vulgares fractæ, & radicales Quantitates, ad Arithmetica decimalem relatæ, integrorum numerorum naturam aliquatenus induunt, & ut integræ tractari possunt; sic, utilitas, quæ speciosas infinitas Series consequitur, est, quod omnigeni complicati Termini (ut Fractiones, quarum Denominator complexus est; Radices complexarum Quantitatum, aut affectarum Equationum &c.) redigi possunt ad simplicium Quantitatum ordinem, id est, ad infinitam Fractionum Seriem, quarum Numeratores, & Denominatores sunt simplices Termini, quo pacto labor non longus superat difficultates, quæ sub aliâ formâ ferè insuperabiles visæ fuissent. Quamobrem

Primò ostendam quomodo hæ Reductiones perfici possint, aut, quomodo compositæ Quantitates reduci possint ad simplices Terminos, præcipuè cum computandi methodus obvia non est.

Deinde hanc Analysim applicabo ad solutionem Problematum.

Ratio

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 33

Ratio reducendi per Divisionem, & per Extractionem Radicum patebit fequentibus exemplis, ubi comparaveris invicem Methodos, quæ adhibentur in decimali, & speciosâ Arithmetica.

Exempla Reductionum per Divisionem.

Propofitâ Fractione $\frac{aa}{b+x}$, divide aa per $b+x$, ut videbis in fequenti fchemate.

$$\begin{array}{r}
 b+x) aa + 0 \left(\frac{aa}{b} - \frac{aax}{bb} + \frac{aaxx}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4} + \frac{aax^4}{b^5} \text{, \&c.} \right. \\
 \underline{aa + \frac{aax}{b}} \\
 0 - \frac{aax}{b} + 0 \\
 \underline{- \frac{aax}{b} - \frac{aaxx}{bb}} \\
 0 + \frac{aaxx}{bb} + 0 \\
 \underline{+ \frac{aaxx}{bb} + \frac{aax^3}{b^3}} \\
 0 - \frac{aax^3}{b^3} + 0 \\
 \underline{- \frac{aax^3}{b^3} - \frac{aax^4}{b^4}} \\
 0 + \frac{aax^4}{b^4} + 0 \text{, \&c.}
 \end{array}$$

Quotiens igitur est $\frac{aa}{b} - \frac{aax}{bb} + \frac{aaxx}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4} + \frac{aax^4}{b^5} \text{ \&c.}$ quæ

Series in infinitum prolata æquivalet $\frac{aa}{b+x}$: Si verò fumas x pro pri-

mo Divisoris Terminò (fic $x+b$) $aa+0$) Quotiens erit $\frac{aa}{x}$

$- \frac{aab}{xx} + \frac{aabb}{x^3} - \frac{aab^3}{x^4}$; &c. , quem inveniens operando ut fuprà

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

E

Pariter

METHO. FLUXIO. ET SERIE. INFIN. 35

$$aa + xx \left(a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} + \frac{7x^{10}}{256a^9} - \frac{21x^{12}}{1024a^{11}} \right.$$

aa

$$0 + xx$$

$$+ xx + \frac{x^3}{4aa}$$

$$- \frac{x^4}{4aa}$$

$$- \frac{x^4}{4aa} - \frac{x^6}{8a^4} + \frac{x^8}{64a^6}$$

$$+ \frac{x^6}{8a^4} - \frac{x^8}{64a^6}$$

$$+ \frac{x^6}{8a^4} + \frac{x^8}{16a^6} - \frac{x^{10}}{64a^8} + \frac{x^{12}}{256a^{10}}$$

$$- \frac{5x^8}{64a^6} + \frac{x^{10}}{64a^8} - \frac{x^{12}}{256a^{10}}; \&c.$$

$$- \frac{5x^8}{64a^6} - \frac{5x^{10}}{128a^8} + \frac{5x^{12}}{512a^{10}}$$

$$+ \frac{7x^{10}}{128a^8} - \frac{7x^{12}}{512a^{10}}; \&c.$$

$$+ \frac{7x^{10}}{128a^8} + \frac{7x^{12}}{256a^{10}}$$

$$- \frac{21x^{12}}{512a^{12}}; \&c.$$

Itaque Radix inventa est $a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5}; \&c.$ ubi notari potest, quòd circa finem Operationis negligo Terminos omnes, quorum Dimensiones superant Dimensionem Termini, quem ultimum esse volo; ex. gr. $\frac{x^{12}}{a^{11}}$.

Licet autem ordinem Terminorum sic invertere, $xx + aa$, ac tunc Radix inventa foret $x + \frac{aa}{2x} - \frac{a^4}{8x^3} + \frac{a^6}{16x^5} - \frac{5a^8}{128x^7}; \&c.$

E 2

Pariter

DE PRÆCULUM FI.

Pariter Radix ipsius $aa - xx$ est $a - \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5}$; &c.

Et Radix $x - xx$ est $x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}}$; &c.

Ipsius $aa + bx - xx$ est $a + \frac{bx}{2a} - \frac{xx}{2a} - \frac{bbxx}{8a^3}$; &c.

Et $\sqrt{\frac{1+axx}{1-bxx}}$ est $\frac{1+\frac{1}{2}axx-\frac{1}{8}aax^2+\frac{1}{16}a^3x^4}{1-\frac{1}{2}bxx-\frac{1}{8}bbx^2-\frac{1}{16}b^3x^4}$; &c.

quæ præterea (reipsâ dividendo) fit

$$\begin{aligned} &1 + \frac{1}{2}bxx + \frac{3}{8}bbx^2 + \frac{5}{16}b^3x^4 \\ &+ \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}ab + \frac{3}{16}abb; \text{ \&c.} \\ &- \frac{1}{8}aa - \frac{1}{16}a^2b \\ &+ \frac{1}{16}a^3 \end{aligned}$$

Sed Operationes istæ sæpius (Quantitatibus ritè præparatis) breviores fieri possunt, ut in superiori Exemplo, in quo quærebatur

$\sqrt{\frac{1+axx}{1-bxx}}$, si Numeratoris & Denominatoris Forma non fuisset eadem, cuncta duxissem in $\sqrt{1-bxx}$, unde habuissem

$\sqrt{\frac{1+axx-abx^2}{1-bxx}}$, & opus perfecissem extrahendo Radicem solius

Numeratoris, & eam dividendo per Denominatorem.

Hinc, puto, satis apparet, quo pacto quævis aliæ Radices extrahi possint, & quomodo ad infinitas simplicium Terminorum Series revocari valeant compositæ Quantitates quantumvis Radicalibus, aut Denominatoribus (ut $x^3 + \sqrt{axx + x^3}$ — $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{1-axx}}{\sqrt{x^3 + 2ax^5 - x^7}} - \frac{\sqrt{x^3 + 2ax^5 - x^7}}{\sqrt{x + x^3 - 2x - x^3}}$),

applicatæ.

De

De Reductione Affectarum Aequationum.

Jam explicare aggredior, quâ ratione Radices affectarum Aequationum in Series infinitas deduci possint; quod argumentum magis accuratè mihi persequendum est; quia, quæ hætenus tradita fuerunt à Mathematicis de numeralibus Aequationibus, valde perplexa sunt; & supervacaneis Operationibus intricata, ita ut Exemplo nobis esse non possint ad opus in speciebus perficiendum. Idcirco Primùm indicabo, quomodo breviter resolvi possint numerales Aequationes affectæ, Secundò eandem Methodum ad species transferam.

Sit Aequatio $y^3 - 2y - 5 = 0$ resolvenda, & 2 sit Numerus, (quomodocunque tandem repertus) qui minùs quàm decimâ sui Parte differat à verâ Radice. Tunc assumo $2 + p = y$; & substituo $2 + p$ pro y in assignatâ Aequatione, undè exurgit nova Aequatio $p^3 + 6pp + 10p - 1 = 0$; aut $p = 0,1$, quæ Quantitas quàmpropius Veritati accedit; quapropter eam Quotienti appono, & fingo $0,1 + q = p$, & hunc fictitium Valorem pro p repono, ut antea, quod dat $q^3 + 6,399 + 11,239 + 0,061 = 0$; & hinc conficitur $11,239 + 0,061 = 0$, quod propè verum est, aut (quod propius) $q = -0,0054$; hoc autem obtinetur dividendo 0,061 per 11,23, donec habeantur tot Figuræ, quot loca sunt inter primas hujus, & Quotientis præcipui Figuras exclusivè, ut hîc duo loca sunt inter 2 & 0,005. Scribo igitur $-0,0054$, in inferiore Quotientis parte, quia est Quantitas Negativa, & facto $-0,0054 + r = q$, substituo ut supra, & ita prosequor Operationem quousque libet, ut videtur in subiecto Diagrammate.

E x

$y^3 - 2y - 5$

$y^3 - 2y - 5 = 0$	$+ 2, 10000000$ $- 0, 00544852$ <hr/> $+ 2, 09455148; \&c. = y$
$2 + p = y \quad + y^3$ $\quad \quad - 2y$ $\quad \quad - 5$	$+ 8 + 12p + 6pp + p^3$ $- 4 - 2p$ $- 5$
Aggregatum	$- 1 + 10p + 6pp + p^3$
$0, 1 + q = p \quad + p^3$ $\quad \quad + 6pp$ $\quad \quad + 10p$ $\quad \quad - 1$	$+ 0, 001 + 0, 03q + 0, 39q + q^3$ $+ 0, 06 + 1, 2 + 6$ $+ 1 + 10,$ $- 1$
Aggregatum	$0, 061 + 11, 23q + 6, 39q + q^3$
$- 0, 0054 + r = q + q^3$ $\quad \quad + 6, 39q$ $\quad \quad + 11, 23q$ $\quad \quad + 0, 061$	$- 0, 0000001 * + 0, 000 * r **$ $+ 0, 0001837 * - 0, 068 * *$ $- 0, 060642 + 11, 23$ $+ 0, 061$
Aggregatum	$+ 0, 0005416 + 11, 162r$
$- 0, 00004852 + r = r$	

NB.

Sed opus, præsertim cum Equationes plurium Dimensionum sunt, sub finem haud parum brevius reddi potest hoc pacto. Statue quonvisque Radicis Extractionem vells extendere, & quot loca super- sunt implenda in Quotiente, tot (incipiens à primo) sume in Coef- ficiente penultimi Terminii Equationis, quæ in Diagrammatis dex- trâ parte formatur, ac rejice Decimales, qui sunt extra hæc loca. At Decimales in ultimo Termino negligendos invenies, addens su- periori locorum numero tot loca, quot decimalium numerorum plena jam sunt in Quotiente. Sed in antepenultimo Termino rejice eos,

NB. Habebatur $- 0, 000000157464 + 0, 00008748r + 0, 0000621r^2 + r^3$
 $+ 0, 000183708 - 0, 06804 + 6, 2$

Sed, cum Numeri transverso calamo notati omittendi sint, & Tabulam turbarent, eos huc rejecimus.

eos, qui sunt post tot loca, quot restant dempto locorum plenorum
 ex implendorum numero; atque ita porro progrediendo arithme-
 ticè juxta locorum intervalla: Vel, quod idem est, semper abscin-
 di debent tot Figuræ, quot in penultimo Termino, ita ut ima loca
 efficiant Progressionem arithmeticam juxta Terminorum Seriem, aut,
 (cum aliter accidit) supponi debent suppleta circulis; sic in præsentī
 Exemplo, si Opus persequi nolum ultra octavum Decimalium locum,
 postquam posui pro $q, 0,0054 + r$ (ubi quatuor loca Decimalium
 impleta sunt in Quotiente, ac totidem implenda remanent) negligere
 possum Figuras, quæ quinque loca inferiora tenent, quas idcirco trans-
 verso calamo notavi, & omittere possem etiam primum Terminum r
 quamvis illius Coefficientens esset $0,99999$, &c. Deletis igitur his Fi-
 guris, Operatio sequens dat Aggregatum; $0,0005416 + 11,162r$,
 unde, per Divisionem productam quousque Terminus præscribit,
 educitur $0,00004852 = r$, quæ Quantitas Quotientem, quò
 volebamus, perducit. Nunc, subducta negativâ Quotientis Parte ex
 affirmativâ, habebimus $2,09455148$, Radicem Æquationis propositæ.

Pariter observari potest, quòd si, in Operis initio, dubitarem
 utrum $0,1 = p$ satis Radici propinquaret, pro $10p - 1 = 0$
 finxissem $6pp + 10p - 1 = 0$, & Quotienti apposuissem primam
 hujus Radicis Figuram, tanquam nihilo propiorem; & benè hoc
 pacto reperietur secunda, aut etiam quarta Figura Quotientis, cum
 in secundariâ Æquatione, quam, tractas, Quadratum ex Coefficien-
 te penultimæ Terminæ decuplum saltè non est producti ex ultimo
 Terminò in Coefficientem antepenultimæ; Imò quidem sæpius la-
 borem imminues, præcipuè cum Æquationes ad plures Dimensio-
 nes ascendunt, quærendo Figuras omnes Quotienti addendas eadem
 methodo, scilicet extrahendo minimam Radicum ex tribus ultimis
 Terminis Æquationis secundariæ; sic enim plerumque Figuras du-
 plo plus Quotienti lucraberis.

Jam ex numeralium ad speciosarum Æquationum solutionem tran-
 seamus; sed præmittendum est.

Primò, quòd unus (quicunque tandem ille sit) ex speciosis, aut
 literalibus Coefficientibus, quando plures adfunt, à ceteris segrega-
 ndus est, aut supponendus multò major, aut multò minor quàm re-
 liqui omnes, vel proximior datæ Quantitati. Ratio est, quòd quia
 ejus

ejus Dimensiones semper crescunt in Numeratoribus, vel Denominatoribus Terminorum Quotientis, hi Termini jugiter decrescunt, & idcirco Quotiens assidue accedit ad Radicem quæsitam, ut perspicere potest ex iis, quæ superius observavimus de specie x in Exemplis Reductionum per Divisionem & Radicis Extractionem. In sequentibus autem pro his speciebus usurpabo x vel z ; & y ; p ; q ; r ; s ; &c. pro Radicalibus speciebus extrahendis.

Secundò, quòd cum Fractiones complexæ, five Quantitates surdæ occurrunt in propositis Aequationibus, aut deinde suboriuntur in processu, removendæ sunt Methodis, quas Analystæ satis norunt.

Ut si haberes $y^3 + \frac{bb}{b-x} y - x^3 = 0$, Aequationem duc in $b-x$,

& ex Producto $\frac{b}{x} y^3 + \frac{bb}{x} y - bx^3 = 0$ quære Valorem ipsius y .

Potes etiam fingere $y \times \frac{b}{b-x} = u$, & scribens $\frac{u}{b-x}$ pro y , reperies

$u^3 + bb u - b^3 x^3 + 3bbx^4 - 3bx^5 + x^6 = 0$; hinc excude Radicem u ; atque ut obtineas y , Quotientem divide per $b-x$. Item

si Aequatio $y^3 - x y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{4}{3}} = 0$ proponeretur, assumere potes

$y^{\frac{1}{2}} = u$, & $x^{\frac{1}{3}} = z$, ac substitutis uu pro y , & z^3 pro x , exsurgit

$u^6 - z^3 u + z^4 = 0$, in quâ Aequatione resolutâ restitui debent x , & y . Invenietur enim Radix $u = z + z^3 + 6z^5$, &c., & resti-

tuendo y ac x , habebitur $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{3}} + x + 6x^{\frac{5}{3}}$; &c. & quadrando,

$y = x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{4}{3}} + 13xx$; &c.

Pariter, si adessent negativæ Dimensiones x , vel y , removeri possent ducendo in x , vel y ; ut, si daretur Aequatio $x^3 + 3xxy - 2x^2 - 16y^3 = 0$; duc in x , & y^3 , unde conficietur $x^4 y^3 + 3x^3 y^3 - 2x^3 y^3 - 16x^3 = 0$; Et si Aequatio esset $x = \frac{a^2}{y} - \frac{2b^3}{y^2} + \frac{3a^4}{y^3}$

multiplica per y^3 , & habebis $xy^3 = a^2 y - 2a^3 y + 3a^4$, & sic de ceteris.

Tertiò, Aequatione sic præparatâ; Opus ineipiendum est ab inventionem primi ex Terminis Quotientis; ad hujus autem, & sequentium Terminorum investigationem conducit Regula generalis, cum indefini-

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 41

indefinitæ species (x vel y) parvæ supponuntur, ad quem casura duo reliqui possunt revocari.

Regula autem hæc est. Ex omnibus Terminis, è quibus absunt species radicales (y ; p ; q ; r ; &c.) elige illum, in quo species indefinita (x ; vel z ; &c.) minimæ Dimensionis est; Deinde elige alium Terminum, qui radicalem speciem contineat, & talis sit, ut Progressio Dimensionum uniuscujusque ex supradictis speciebus, aut quo majori potest gradu descendat, aut quo minori ascendat; Et si plures sunt Termini, quorum Dimensiones non recedant ab hac Progressione, quousque libet producta, pariter sumendi sunt. Demum ex his Terminis ita sepositis, & nihilo æquatis, excude valorem dictæ radicalis speciei, & illum Quotienti adscribe.

Sed, ut hæc Regula melius intelligatur, illi lucem afferam sequenti Diagrammate. Fac Angulum BAC, & ejus latera BA, AC, divide in æquales partes, & eductis Perpendicularibus, distibue spa-

B	x^4	x^4y	x^4yy	x^4y^3	x^4y^4	x^4y^5	x^4y^6	&c.
	x^3	x^3y	x^3yy	x^3y^3	x^3y^4	x^3y^5	x^3y^6	&c.
	xx	xy	xyy	xy^3	xy^4	xy^5	xy^6	&c.
	x	y	yy	y^3	y^4	y^5	y^6	&c.
A	I							C

tium Angulare in æqualia Quadrata vel Parallelogramma, quæ concipies denominata a Dimensionibus specierum x & y iis inscriptarum. Deinde, proposita Æquatione, aliquo Signo nota Parallelogramma respondentia omnibus ejusdem Terminis, & Regulam applica duobus, aut fortè pluribus ex Parallelogrammis ita notatis, quorum unum sit in columnâ AB ad sinistram positâ, alterum verò contingat Regulam versùs dextram, & reliqua omnia Regulam non tangentia sint supra eam. Tum sume eos Æquationis Terminos, qui Parallelogrammis à Regulâ tactis includuntur, & ex iis extrude Quantitatem in Quotiente ponendam. Sic si Radix y debeat ex-

trahi ex Æquatione $y^6 - 5xy^5 + \frac{x^3}{a}y^4 - 7aaxxyy + 6a^3x^3 + bbx^4 = 0$; noto (Fig. 1.) Parallelogramma pertinentia ad Ter- TAB. I

If. Newtoni Opuscula, Tom. I

F

minos

minos hujus Æquationis Asterico *, ut hic factum vides. Deinde Regulam DE applico ad infimum parallelogrammorum notatorum in sinistram columnam, & Regulam in gyrum dextrorsum ago ex inferioribus versus superiora; donec incipiat similiter aliud, vel fortè plura ex parallelogrammis notata distinctis contingere, & video loca sic tacta esse ea quibus includuntur termini x^3 , $xxyy$, & y^6 . Igitur ex his effingo Æquationem $y^6 - 7axy + 6a^3x^3 = 0$, (quam præterea, si placet, redigo ad $u^6 - 7uu + 6 = 0$, ponendo $y = uax$,) ac ex ea quaero Valorem ipsius y , quem invenio quadruplicem, nempe $+ \sqrt[4]{ax}$, $- \sqrt[4]{ax}$, $+ \sqrt[4]{2ax}$, & $- \sqrt[4]{2ax}$, è quibus quemlibet assumere possum pro Quotientis Terminò primo, tamen feligendus est ille qui convenit huic aut illi Radici, quam extrahere cupio.

Sic, proposita Æquatione $y^3 - byy + gbxx - x^3 = 0$, segrego Terminos $- byy + gbxx$, & hinc habeo $y = 3x$ pro Quotientis Terminò primo.

Et si daretur $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$, acciperem $y^3 + aay - 2a^3$, cujus Radix est $+ a$, quam Quotienti adscribo.

Pariter, si haberem $xy^3 - 3c^4xyy - c^5xx + c^7 = 0$, exciperem $xy^3 + c^7$, undè obtinerem $y = -\sqrt[7]{\frac{c^7}{xx}}$, quæ Quantitas esset primus Quotientis Terminus. Atque ita porro.

Sed hoc Terminò reperto, si is aliquam Potestatem negativam includit, Æquationem deprimò eadem indefinitæ speciei Potestate, tum ut necessarium non sit eam deprimere in ipsa Resolutione, tum ut concinnè adhiberi possit Regula inferiùs tradenda de suppressione Terminorum supervacaneorum. Sic, proposita Æquatione $8x^6y^3 + az^6yy - 27a^2 = 0$, cujus Radix incipit à Terminò $\frac{3a^3}{222}$; eam deprimò ipsa zz , antequàm Resolutionem aggrediar, ita ut evadat $8x^4y^3 + az^4yy - 27a^2z^{-2} = 0$.

Tum, opere progrediente, reliqui Termini, quibus Quotiens augendus est, eodem pacto excuduntur ex variis Æquationibus secundariis, sed plerumque minori conatu; nam totum negotium

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 43

tium perficitur dividendo infimum ex iis Terminis, qui & indefinitè parvis speciebus (x , xx , x^3 , &c.) sunt affecti & Radicalium specierum (p , q , r , &c.) expertes; per Quantitatem quâ afficitur Quantitas Radicalis unius Dimensionibus & libera ab indefinitâ specie, & Quotienti adscribendo quidquid indè conficitur. Sic in exemplo sequenti Termini $\frac{x}{4}$, $\frac{xx}{64a}$, $\frac{131x^3}{512aa}$, &c. gignuntur dividendo aa , $\frac{1}{16} aa$, $\frac{131}{128} x^3$, &c. per $4aa$.

Quibus præmissis, exhibenda superest praxis Resolutionis. Sit igitur Æquatio $y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$, ea cujus petitur Resolutio. Ex aliquot ejus Terminis conficio fictitiam Æquationem $y^3 + aay - 2a^3 = 0$ (juxta ea quæ tertio loco præmissimus) & hinc obtineo $y - a = 0$; quapropter scribo in Quotiente $+a$: sed quia $+a$ non est accuratè Valor ipsius y , suppono $a + p = y$, & in Terminis Æquationis margini adscriptæ pono $a + p$ pro y , & iterùm in margine scribo Terminos hinc exeuntes ($p^3 + 3app + apx$, &c.), inter quos denuò, per tertio loco præmissa, eligo Terminos $4aap + aax = 0$ tanquam fictitiam Æquationem, quæ cum det $p = -\frac{1}{4}x$, scribo in Quotiente $-\frac{1}{4}x$: Quia tamen $-\frac{1}{4}x$ non æquat justum Valorem ipsius p , facio $-\frac{1}{4}x + q = p$, & in marginalibus Terminis pro p substituo $-\frac{1}{4}x + q$, atque Terminos indè confictos ($q^3 - \frac{3}{4}qqx + 3aqq$, &c.) rursus margini adscribo, è quibus iterùm, juxta præcedentem Regulam, segrego Terminos $4aaq - \frac{1}{16}aax = 0$ pro fictâ Æquatione, quæ quia præbet $q = \frac{xx}{64a}$, hac ipsâ Quantitate Quotientem augeo.

Item quia $\frac{xx}{64a}$ non est accuratus Valor ipsius q , suppono $\frac{xx}{64a} + r = q$, & in Terminis marginalibus pro q substituo $\frac{xx}{64a} + r$, & sic pergo quousque libet, ut præ oculis ponit sequens Tabella.

F 2

$$y^3 + aay$$

$y^3 + aay - 2a^3 + axy - x^3 = 0$			$y = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^5}{16384a^3}, \&c.$		
$+ a + p = y$	$+ y^3$	$+ a^3 + 3aap + 3app + p^3$			
	$+ axy$	$+ aax + apx$			
	$+ aay$	$+ a^3 + aap$			
	$- x^3$	$- x^3$			
	$- 2a^3$	$- 2a^3$			
$-\frac{1}{4}x + q = p$	$+ p^3$	$-\frac{1}{64}x^3 + \frac{3}{16}qxx - \frac{3}{4}qqx + q^3$			
	$+ 3app$	$+ \frac{2}{16}axx - \frac{3}{2}aqx + 3aqq$			
	$+ apx$	$-\frac{1}{4}axx + aqx$			
	$+ 4aap$	$- aax + 4aaq$			
	$+ aax$	$+ aax$			
	$- x^3$	$- x^3$			
$+ \frac{xx}{64a} + r = q$	$+ q^3$	*			
	$-\frac{3}{4}qqx$	*			
	$+ 3aqq$	$+ \frac{3x^4}{4096a} * + \frac{3}{32}rxx + 3arr$			
	$+ \frac{3}{16}qxx$	$+ \frac{3x^4}{1024a} * + \frac{3}{16}rxx$			
	$-\frac{1}{2}aqx$	$-\frac{1}{128}x^3 - \frac{1}{2}arx$			
	$+ 4aaq$	$+ \frac{1}{16}axx + 4aaq$			
	$-\frac{65}{64}x^3$	$-\frac{65}{64}x^3$			
	$-\frac{1}{16}axx$	$-\frac{1}{16}axx$			
$+ 4aa - \frac{1}{2}ax + \frac{9}{32}xx + \frac{131}{128}x^3 - \frac{15x^4}{4096a} (+ \frac{131x^5}{512aa} + \frac{509x^7}{16384a^3})$					

Si Quotiens ad certam periodum tantum perducendus foret, ita ut, ex gr., in ultimo Termino x non ascenderet supra datam Dimensionem, faciens Terminorum substitutionem, eos omitto quos non usu-venturos praevidéo; quæ de re hæc habetur Regula: Primo Termino, qui suboritur ex quavis Quantitate in collateralis margine, tot subjungito versus dextram, quot sunt Unitates, quibus Index ejus Potestatis, quæ altissima debet esse in Quotiente, excedit Indicem istius suborti Termini.

Volo, ut præsentis utar exemplo, ut Quotiens (aut in Quotiente species x) altius non ascendat quam, puta, ad quartam Dimensionem. Omitto itaque Terminos omnes post x^4 , & unum pono post x^3 : Quocirca præ deletis habendi sunt omnes Termini post signum $*$. Hoc pacto opus proseguere quoad tandem pervenias ad Terminos $\frac{15x^4}{4096a} - \frac{131x^3}{128} + 4aar - \frac{1}{2}arx$, in quibus p , q , r , aut s , quæ repræsentant Radicis extrahendæ supplementa, sunt unius Dimensionis, & è quibus per Divisionem tot potes obtinere Terminos, quot desiderari vidisti ad Quotientem complendum (id est $\frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^4}{16384a}$); itaque demùm habebis $y = a - \frac{1}{4}x + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^4}{16384a}$, &c.

Rem melius explicaturus addam aliud exemplum resolvendum. Detur Aequatio $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}yy + y - x = 0$; & Quotiens inveniendus sit usque ad quintam Dimensionem tantum, & superflui Termini rejecti concipiantur post signum &c.

$\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}yy + y - z = 0$		$y = z + \frac{1}{2}xz + \frac{1}{6}z^2 + \frac{1}{24}z^3 + \frac{1}{120}z^4, \&c.$	
$z + p = y$	$+ \frac{1}{5}y^5$	$+ \frac{1}{5}z^5, \&c.$	
	$- \frac{1}{4}y^4$	$- \frac{1}{4}z^4 - pz^3, \&c.$	
	$+ \frac{1}{3}y^3$	$+ \frac{1}{3}z^3 + pzx + ppz, \&c.$	
	$- \frac{1}{2}yy$	$- \frac{1}{2}zx - pz - \frac{1}{2}pp$	
	$+ y$	$+ z + p$	
	$- z$	$- z$	
$\frac{1}{2}xz + q = p$	$+ ppz$	$+ \frac{1}{4}z^4, \&c.$	
	$- \frac{1}{2}pp$	$- \frac{1}{8}z^4 - \frac{1}{2}qzx, \&c.$	
	$- pz^3$	$- \frac{1}{2}z^3, \&c.$	
	$+ pzx$	$+ \frac{1}{2}z^4 + qzx$	
	$- pz$	$- \frac{1}{2}z^3 - qz$	
	$+ p$	$+ \frac{1}{2}xz + q$	
	$+ \frac{1}{5}z^5$	$+ \frac{1}{5}z^5$	
	$- \frac{1}{4}z^4$	$- \frac{1}{4}z^4$	
	$+ \frac{1}{3}z^3$	$+ \frac{1}{3}z^3$	
	$- \frac{1}{2}zx$	$- \frac{1}{2}zx$	
$1 - z + \frac{1}{2}xz) \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{8}z^4 + \frac{1}{20}z^5 (\frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$			

Pariter

Paritèr, si proponas Æquationem $\frac{63}{2816}y^{11} + \frac{35}{1152}y^9 + \frac{5}{112}y^7 + \frac{3}{40}y^5 + \frac{1}{6}y^3 + y - z = 0$ resolvendam solum ad novam usque Quotientis Dimensionem, rejicere potes ante ipsum Operis exordium $\frac{63}{2816}y^{11}$, & inter operandum omnes Terminos qui superant z^9 , admittere autem unum post z^7 , duos post z^5 ; observabis enim Quotientem paritèr ascensurum per duarum Unitatum intervalla, hoc pacto z, z^3, z^5, z^7 , &c. Demùm autem habebis $y = z - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 - \frac{1}{5040}z^7 + \frac{1}{362880}z^9$, &c.

Hinc detegitur artificium, quo Æquationes affectæ in infinitum, aut constantes infinito Terminorum numero, tamen resolvi possunt: Videlicet, antequàm opus aggrediaris, rejice omnes Terminos in quibus Dimensio speciei indefinitè parvæ & non affectæ à Radicali specie excedit altissimam Dimensionem in Quotiente requisitam, aut è quibus, cùm pro Radicali specie substituis primum Terminum detectum ope Parallelogrammi, ut suprà, exfurgere nequeunt nisi Terminii excedentes; eà de causà in ultimo exemplo Terminos omisi ultra y^9 , licèt ad infinitum progredierentur. Eodem pacto, ut Cubica Radix extrahatur usque ad quartam Dimensionem ipsius z ex Æquatione

$$0 = \begin{cases} -8 + zz - 4z^4 + 9z^6 - 16z^8, & \&c. \\ + y \text{ in } zz - 2z^4 + 3z^6 - 4z^8, & \&c. \\ - yy \text{ in } zz - z^4 + z^6 - z^8, & \&c. \\ + y^3 \text{ in } zz - \frac{1}{2}z^4 + \frac{1}{3}z^6 - \frac{1}{4}z^8, & \&c. \end{cases}$$

omitto Terminos in infinitum omnes superiores iis qui constantur ex $+y^3$ in $zz - \frac{1}{2}z^4 + \frac{1}{3}z^6$, & ex $-yy$ in $zz - z^4 + z^6$, atque ex $+y$ in $zz - 2z^4$, & ex 1 in $-8 + zz - 4z^4$. Quapropter hanc solam Æquationem resolvendam assumo $\frac{1}{3}z^6y^3 - \frac{1}{2}z^4y^5 + zz^8$

$z^4 y^3 + z^3 y^4 - z^6 y y + z^4 y y - z z y y - 2 z^4 y + z x y - 4 z^4 + z z - 8 = 0$: Primus enim Quotientis Terminus ($2z^{-\frac{2}{3}}$) substitutus pro y in eâ Æquationis depressæ per $z^{\frac{2}{3}}$ parte quam negleximus, dat semper plus quàm quatuor Dimensiones.

Quadratis Æquationibus accomodari possunt quæ de altioribus diximus; ut si peteretur Radix hujus Æquationis

$$0 = \begin{cases} y y \\ - y \text{ in } a + x + \frac{x x}{a} + \frac{x^3}{a a} + \frac{x^4}{a^3}, \text{ \&c.} \\ + \frac{x^4}{4 a a} \end{cases}$$

usque ad x^6 ; omitto cunctos in infinitum Terminos altiores quàm $-y$ in $a + x + \frac{x x}{a}$, & solum assumo Æquationem $y y - a y - x y - \frac{x x}{a} y + \frac{x^4}{4 a a} = 0$, quam resolvo aut more solito faciens $y = \frac{1}{2} a + \frac{1}{2} x + \frac{x x}{2 a} - \sqrt{\frac{1}{4} a a + \frac{1}{2} a x + \frac{3}{4} x x + \frac{x^3}{2 a}}$, aut brevius & facilius jam traditâ affectarum Æquationum methodo, quâ obtinebis $y = \frac{x^4}{4 a^3} - \frac{x^5}{4 a^4} *$, in quâ ultimus requisitus Terminus evanescit, aut æqualis nihilo fit.

Radices autem postquàm extractæ sunt usque ad satis magnum Terminorum numerum, ulterius quousque libet extrahi possunt, solâ Serierum Analogiâ benè observatâ. Sic in infinitum prosequi potes hanc $z + \frac{1}{2} z z + \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{24} z^4 + \frac{1}{120} z^5$, &c. (quæ est Radix Æquationis infinitæ $z = y - \frac{1}{2} y y + \frac{1}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4$ &c.) semper dividendo Terminum ultimum per hanc Numerorum seriem 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.; & hæc $z - \frac{1}{6} z^3 - \frac{1}{120} z^5 - \frac{1}{5040} z^7 + \frac{1}{362880} z^9$, &c. produci potest, continuam faciendo Divisionem

per

per Numeros 2×3 , 4×5 , 6×7 , 8×9 , &c.: Rursus hujus $a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7}$, &c., quotvis Termini reperiri possunt, jam repertos respectivè multiplicando per Fractiones $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{4}$, $-\frac{3}{6}$, $-\frac{5}{8}$, $-\frac{7}{10}$, &c., & sic de reliquis.

Sed, cùm investigatur primus Quotientis Terminus, aut aliquando etiam secundus, vel tertius, sese offerre potest difficultas superanda; nam, ejus valor, ut supra detectus, esse potest Quantitas furda, vel inextricabilis Radix altioris Æquationis affectæ; quando autem id fortè evenit, Radix ista, (dummodò non sit impossibilis,) exponi potest per aliquam Litteram, quo facto procedemus more solito, tanquam si cognita foret. Ut in exemplo $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$, si Radix Æquationis $y^3 + axy - 2a^3 = 0$ esset furda aut incognita, ponere potuissim aliquam Litteram (puta, b) pro eà, & perfecissim Solutionem, ut sequitur, posito quòd inveniendus esset Quotiens tantum usque ad tertiam Dimensionem.

$y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0. \text{ Fac } aa + 3bb = cc. \text{ Tunc}$ $y = b - \frac{abx}{cc} + \frac{a^2bxx}{c^2} + \frac{x^3}{cc} + \frac{a^3b^3x^3}{c^3} - \frac{a^2bx^3}{c^3} + \frac{a^3b^3x^3}{c^3}; \&c.$	
$b + p = y$ $+ axy$ $+ aay$ $- x^3$ $- 2a^3$	$+ y^3$ $+ b^3 + 3bbp + 3b^2pp + p^3$ $+ abx + apx$ $+ aab + aap$ $- x^3$ $- 2a^3$
$-\frac{abx}{cc} + q = p$ $+ 3b^2pp$ $+ apx$ $+ pcc$ $- x^3$ $+ abx$	$-\frac{a^3b^3x^3}{c^3}; \&c.$ $+ \frac{3aab^3xx}{c^2} - \frac{6ab^3x}{c^2} q; \&c.$ $-\frac{aabxx}{cc} + aqx$ $- abx + ccq$ $- x^3$ $+ abx$
$cc + ax - \frac{6abbx}{cc} - \frac{a^2bxx}{c^2} + x^3 + \frac{a^3b^3x^3}{c^3} - \frac{a^2bx^3}{c^3} + \frac{x^3}{cc} + \frac{a^3b^3x^3}{c^3}; \&c.$	

Hic, scripto b in Quotiente, fingo $b + p = y$, & postea illum substituo pro y , ut vides, unde oritur $p^3 + 3bpp$, &c., rejectis Terminis $b^3 + aab = 2a^3$; ut nihilo æqualibus; supposuimus enim b esse Radicem Equationis $y^3 + aay - 2a^3 = 0$. Termini verò $3bbp + aap + abx$ dant $p = -\frac{abx}{3bb + aa}$, quæ Quantitas

adjungenda est Quotienti, & pro p substituendum $-\frac{abx}{3bb + aa} + q$.

Sed, brevitatis gratiâ, scribo cc pro $3bb + aa$, quæ tamen Quantitas $3bb + aa$ restituenda est, quodocunque percipiam hoc pacto Terminos fieri breviores. Opere peracto, assumo Numerum aliquem pro a , & resolvo Equationem $y^3 + aay - 2a^3 = 0$, ut supra indicavi de numeralibus Equationibus, & pro b pono aliquam ex ejus Radicibus, si tres Radices ea habeat. Seu potius hanc Equationem libero à speciebus, (quantum fieri potest,) & præsertim ab indefinitis, eâ methodo quam supra insinuavimus; & pro reliquis, si quæ restant quæ expelli nequeant, pono Numeros: Sic $y^3 + aay - 2a^3 = 0$ liberari potest ab a , Radice per a divisâ, unde fit $y^3 + y - 2 = 0$, cujus Radicem quære, per a multiplica, & substitue pro b .

Hactenus species indefinitas parvas esse supposuimus. Si verò quàm propius accedere ponerentur datæ Quantitati, pro indefinitè parvâ differentiâ istâ speciem aliquam adhibeo, quâ substitutâ solvo Equationem ut antea: Scio, *ex. gr.*, aut suppono, quòd in Equatione $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}yy + y - x + a = 0$ est x fere æqualis alicui Quantitati, ut a . Dico igitur earum differentiam esse z , & scribendo pro x , $a + z$, vel $a - z$, conficietur $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}yy + y \pm z = 0$, quæ solvi potest Methodo jam præscriptâ.

Quòd si hæc species poneretur indefinitè magna, scriberem aliquam speciem pro ejus Reciproca, quæ idcirco esset indefinitè parva, & specie istâ substitutâ, progredior ad Resolutionem more solito. Proponatur, *ex. gr.*, $y^3 + yy + y - x^3 = 0$, & sciamus

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 51

sciamus aut fingamus, quòd x sit Quantitas permagna; tunc ponas pro ejus parvâ Reciproca $\frac{1}{x}$, & $\frac{1}{z}$ substitutâ pro x dabit $y^3 + yy + y - \frac{1}{z^3} = 0$, cujus Radix est $y = \frac{1}{z} - \frac{1}{3} - \frac{2}{9}z + \frac{7}{81}zz + \frac{5}{81}z^3$, &c., quæ, restituto, si placet, x , evadet $y = x - \frac{1}{3} - \frac{2}{9x} + \frac{7}{81xx} + \frac{5}{81x^3}$, &c.

Sin autem istarum artium nulla ex animi sententiâ succederet, ad aliam confugere potes. Ut, in Æquatione $y^4 - xxyy + xyy + 2yy - 2y + 1 = 0$, in quâ primus Radicis Terminus quæri deberet ex Hypothesi, quòd $y^4 + 2yy - 2y + 1 = 0$; sed hæc Æquatio nullam habet Radicem possibilem; quare tentabis quid possis aliquâ aliâ ratione conficere. Potes, *ex. gr.*, supponere, quòd x parum differat à $+2$, vel quòd $2 + z = x$; substituens autem $2 + z$ pro x invenies $y^4 - zxyy - 3zyy - 2y + 1 = 0$, & Quotiens incipiet ab Unitate. Potes etiam supponere quòd x est Quantitas indefinitè magna, vel quòd $\frac{1}{x} = z$, undè deduces $y^4 - \frac{yy}{z} + \frac{yy}{z} + 2yy - 2y + 1 = 0$, & z chorum Terminorum ducet in Quotiente.

Hoc pacto procedens juxta varias Hypotheses, potes variis modis Radicem extrahere & exprimere.

Si vis determinare quot modis hoc perfici potest, tibi perficiendum est quot sunt Quantitates, quæ scriptæ in Æquatione propositâ pro indefinitâ specie Æquationem illam divisibilem reddunt per $y +$ vel $-$ aliquâ Quantitate, vel per y tantum; Hoc, *ex. gr.*, accidet in Æquatione $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$, si substituas $+a$ vel $-a$, vel $-2a$, vel $-\sqrt[3]{2a^3}$ pro x . Quocirca benè potes supponere Quantitatem x parum differre ab $+a$ vel $-a$ vel $-2a$ vel $-\sqrt[3]{2a^3}$, & totidem modis extrahere Radicem Æquationis propositæ, & forsân rursûs totidem modis ponendo has differentias indefinitè magnas. Præterea, si fumas pro indefinitâ Quantitate

titate nunc hanc, nunc illam ex speciebus Radicem exprimentibus; voti compos fies fortè aliis modis; & iterum aliis substituendo pro indefinità specie quosvis fictitios valores, ut $ax + bxx$, $\frac{a}{b+x}$, $\frac{a+cx}{b+x}$; &c., & operando, ut antea, in *Æquatione* hinc proveniente.

Ut autem in apertum ponatur veritas hujus Conclusionis, nempe quòd Quotientes sic inventi, & producti ad libitum adeò propè ad *Æquationis* Radicem accedunt, ut denique ab eà differant Quantitate minori, quàm quævis assignabilis, & idcirco quòd in infinitum protracti omninò ab eà non differunt, animadvertendum est quòd Quantitates, quæ sunt in sinistrâ Columnâ dextri Lateris Diagrammatis, sunt ultimi Termini *Æquationum*, quarum Radices sunt p , q , r , s ; &c., & quòd, illis evanescentibus, evanescunt quoque Radices p , q , r , s ; &c., id est, differentiæ inter Quotientem & Radicem quæsitam; ita ut Quotiens nihil omninò tunc differat à verâ Radice. Quapropter sub ipsum Operis initium, si videas quòd Termini, qui sunt in indicatâ Columnâ, sese omnes invicem destruant, concludendum est Quotientem huc usque protractum perfectam *Æquationis* Radicem esse: Quòd si res aliter se habeat, videbis tamen quòd omnes Termini, in quibus species indefinitè parva est paucarum Dimensionum; id est, omnes maximi Termini auferuntur à Columnâ istâ, ita ut denique, aut nulli restent in eà, aut ii tantum, qui assignatâ quâlibet Quantitate minores sunt, & idcirco nihilo non majores, ubi Opus in infinitum est protractum; ergo Quotiens extractus in infinitum est demum ipsissima Radix.

Denique, licet species, quæ, perspicuitatis gratiâ, fuerunt hactenus suppositæ indefinitè parvæ, supponantur quantumvis magnæ, tamen Quotiens erit adhuc verus, quanquam non adeò celeriter ad veram Radicem convergat: Quod patet ex rerum Analogiâ. Sed hic considerandi sunt Radicum Limites, aut maximæ & minimæ Quantitates; nam, harum proprietates communes sunt finitis & infinitis *Æquationibus*: In his Radix est maxima vel minima; cum maxima aut minima est differentia, quæ intercedit inter Aggregata affirmativorum & negativorum Terminorum; limitata autem est, quando indefinita Quantitas, (quæ propterea non malè supponi potest;

test perexigua,) major fieri nequit, quin Radicis magnitudo statim evadat infinita, id est, impossibilis.

Ad huic argumento lucem affundendam sit (*Fig. 2.*) ACD semicirculus descriptus supra Diametrum AD, & sit BC ordinatim Applicata. Fac $AB = x$; $BC = y$; $AD = a$. Erit igitur $y = \sqrt{ax - xx} = \sqrt{ax} - \frac{x}{2a} \sqrt{ax} - \frac{xx}{8aa} \sqrt{ax} - \frac{x^3}{16a^3} \sqrt{ax}$; &c., ut supra. Quapropter, tunc BC vel y evadit maxima, cum \sqrt{ax} maximo intervallo superat omnes Terminos $+\frac{x}{2a} \sqrt{ax} + \frac{xx}{8aa} \sqrt{ax} + \frac{x^3}{16a^3} \sqrt{ax}$; &c., id est, cum $x = \frac{1}{2}a$; terminata autem est cum $x = a$; si enimingas x majorem quam a , Summa omnium Terminorum $-\frac{x}{2a} \sqrt{ax} - \frac{xx}{8aa} \sqrt{ax} - \frac{x^3}{16a^3} \sqrt{ax}$; &c. in infinitum excrescet; sed etiam est alter Limes, cum scilicet $x = 0$, ob impossibilitatem ipsius $\sqrt{-ax}$, quibus Terminis, sive Limitibus respondent semicirculi Limites, sive Termini.

TRANSITIO AD

METHODUM FLUXIONUM.

Hactenus de hac computandi Methodo, cujus frequens erit usus in sequentibus. Nunc restat ut ad Artis analyticæ illustrationem proferam nonnulla Problematum specimina, & præsertim eorum, quibus Curvarum natura magis in patulo poni possit. Sed antea observandum est, quòd, quidquid in iis arduum est, revocari potest ad duo sequentia Problemata, quæ proponam de Spatio descripto per localem Motum, vel acceleratum, vel retardatum.

I.

Longitudine descripti spatii semper, (id est, quovis Temporis momento,) datâ, invenire Velocitatem Motûs Tempore proposito.

II.

Velocitate Motus semper datâ, invenire Longitudinem spatii descripti Tempore proposito.

Si, *ex gr.*, in Æquatione $xx = y$ exponit y Longitudinem Spatii quodam momento Temporis percurfi, quod Tempus mensuratur & descriptum exhibetur ab alio spatio x crescente juxta uniformem Celeritatem x ; exponet $2xx$ Celeritatem, quâ Spatium y eodem Temporis momento progreditur ad ulteriorem sui descriptionem, & vice versâ. Hinc fit, ut in sequentibus considerem Quantitates tanquam genitâs continuo Incremento, ut Spatium, quod Corpus aut quælibet res mota describit.

Cum autem hic Tempus tantum considerandum veniat, tanquam expositum & mensuratum æquabili Motu locali, & præterea, cum solæ Quantitates ejusdem generis invicem comparari valeant, ut & Velocitates, quibus augentur aut minuantur: Idcirco, in iis, quæ sequuntur, Tempus *formaliter* non considero, sed suppono, quod una ex propositis Quantitatibus homogenea cum aliis crescat æquabili Fluxu, ad quam ceteræ, tanquam ad Tempus, referantur, quæ ideo per Analogiam non inconcinne dici potest *Tempus*. Quoties igitur vox *Tempus* in sequentibus invenietur, (eam autem sæpiusculè usurpavi perspicuitatis & distinctionis causâ,) hoc verbum sumendum est, non quasi Tempus intellexissem in suâ *formali* significatione, sed tanquam significans Quantitatem illam à Tempore diversam, cujus æquabili Incremento vel Fluxu Tempus exponitur & mensuratur.

Nunc in posterum *Fluentes* vocabo Quantitates has, quas considero tanquam gradatim & indefinitè crescentes, easque repræsentabo per ultimas Alphabeti litteras $u, y, x, & z$, ut discerni possint ab aliis Quantitatibus, quæ in Æquationibus considerantur tanquam cognitæ & determinatæ; & quæ idcirco per primas Alphabeti litteras a, b, c ; &c. exponuntur. At Velocitates, quibus singulæ Fluentes augentur per Motum generantem, (quas Velocitates appello *Fluxiones*, aut simpliciter *Velocitates* vel *Celeritates*,) exprimuntur

tur iisdem litteris puncto auctis, sic u , x , y , & z ; id est, pro Celeritate Quantitatis u pono u , & eodem pacto pro Celeritatibus aliarum Quantitatum x , y , & z scribam x , y , z , respectivè.

His præmissis, statim argumentum inceptum tractare pergam; & primò quidem dabo Solutionem duorum nuper propositorum Problematum.

P R O B L. I.

Data Relatione, quam invicem habent Fluentes Quantitates, determinare Relationem, qua inter earum Fluxiones intercedit.

S O L U T I O.

Æquationem, quâ data Relatio exprimitur, dispone juxta Dimensiones alicujus ex Fluentibus Quantitatibus, quas includit, (puta, x), & ejus Terminos multiplica per quancumque arithmeticam Progressionem, & deindè per $\frac{x}{x}$: Hanc Operationem seorsum perfice pro quâvis Fluenti Quantitate; Tum fac Aggregatum ex his omnibus Factis æquale nihilo, & habebis petitam Æquationem.

E X E M P L. I.

Si Relatio inter fluentes Quantitates x , & y exponitur Æquatione $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$. Primùm dispone Terminos secundùm x , deindè secundùm y , & eos multiplica, ut hinc vides factum.

$$\begin{array}{r|l} \text{Mult. } x^3 - axx + axy - y^3 & y^3 + axy \\ \hline & + x^3 \\ \text{Per: } \frac{3x}{x}; \frac{2x}{x}; \frac{x}{x}; 0. & \frac{3y}{y}; \frac{2}{y}; 0 \end{array}$$

Undè conficitur: $3xxx - 2axx + ayx - 3yyx + axy$ *

Aggre-

Aggregatum ex Productis est $3xxx - 2axx + ayx - 3yyy + axy = 0$; Quæ Æquatio monstrat quænam Relatio sit inter Fluxiones x , & y ; nam, si assumas x ad libitum, Æquatio, $x^3 + axy - axx - y^3 = 0$, dabit y , quo determinato habebis $x : y :: 3yy - ax : 3xx - 2ax + ay$.

E X E M P L. II.

Relatio Quantitatum x , y , & z , exprimatur Æquatione $2y^3 + xxy - 2cyz + 3yzz - z^3 = 0$

$\begin{array}{r} + xxy \\ \text{Mult. } 2y^3 - 2cx - z^3 \\ + 3zz \end{array}$	$\begin{array}{r} + 2y^3 \\ - 2cyz \\ + 3yzz \\ - z^3 \end{array}$	$\begin{array}{r} - z^3 + 3yzz - 2cyz \\ + 2y^3 \end{array}$
Per $\frac{2y}{y}; 0; -\frac{y}{y}$	$\frac{2x}{x}; 0$	$\frac{3z}{z}; \frac{2z}{z}; \frac{z}{z}; 0$

Habebis $4yyy * + \frac{2^2y}{y} \mid 2yxx * \mid - 3zzz + 6yzz - 2cyz *$

Quapropter Relatio, quæ est inter Fluentium Celeritates aut Fluxiones x , y , & z exponitur per $4yyy + \frac{2^2y}{y} + 2yxx - 3zzz + 6yzz - 2cyz = 0$.

Cùm autem in hoc secundo Exemplo tres sint fluentes Quantitates x , y , & z , habeatur, oportet, altera Æquatio, quâ prorsus determinari possit Relatio inter Fluents x , y , & z , earumque Fluxiones. Suppone, *ex. gr.*, quòd $x + y - z = 0$, hinc invenietur, per hanc Regulam, altera Relatio inter Fluxiones $x + y - z = 0$: Jam istam cum superiore Æquatione compara, exterminando aliquam ex tribus illis Quantitatibus & Fluxionibus; & indè exsurget Æquatio plenè determinans Relationem ceterarum.

Si quando proposita Æquatio continet Fractiones complexas, aut Quantitates surdas, pro iis litteras aliquas assumo, easque representare Quan-

Quantitates fluentes suppono, & procedo modo supra tradito: Deinde litteras assumptas supprimo & extermino, ut continuò factum videbis.

EXEMPL. III.

Relatio inter Quantitates x , & y , sit $yy - aa - x\sqrt{aa - xx}$. Pro $x\sqrt{aa - xx}$ scribo z , & hinc duas habeo Æquationes $yy - aa - z = 0$, & $aa - z = 0$, & $aa - z = 0$, quarum prima dat $2yy - \dot{z} = 0$ ut supra, pro Relatione Celeritatum y , & z ; altera verò $2aax - 4x^3\dot{x} - 2z\dot{z} = 0$, aut $\frac{aax - 2x^3\dot{x}}{z} = \dot{z}$, pro Relatione Celeritatum x , & z ; nunc expulsa z , erit $2yy - \frac{aax}{z} + \frac{2x^3\dot{x}}{z} = 0$, & restituendo $x\sqrt{aa - xx}$ pro z habebis $2yy - \frac{aax + 2xxx}{\sqrt{aa - xx}} = 0$ pro Relatione inter y , & x , quæ quærebatur.

EXEMPL. IV.

Si Æquatio $x^3 - ayy + \frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay + xx} = 0$ exponat Relationem, quæ est inter x , & y . Facio $\frac{by^3}{a+y} = z$, & $xx\sqrt{ay + xx} = u$, & obtineo tres Æquationes $x^3 - ayy + z - u = 0$; $az + yz - by^3 = 0$; & $ax^4y + x^6 - uu = 0$: Prima dat $3xxx - 2a\dot{y}y + \dot{z} - \dot{u} = 0$; secunda $az + yz + zy - 3byy\dot{y} = 0$; ac tertia $4axyx^3 + ax^4\dot{y} + 6x^5\dot{x} - 2u\dot{u} = 0$, pro Relationibus Velocitatum u , x , y , & z ; sed valores ipsarum u , & z , inventos per secundam ac tertiam Æquationem (nempe $\frac{3byyy - zy}{a+y}$ pro

pro z ; & $\frac{4ax^3y + ax^2y + 6x^2x}{2u}$ pro z ,) substitue. in Æquatione:

$$\text{primâ, \& fiet } 3xxx - 2ayy + \frac{3byy - zy}{a+y} - \frac{4ayx^3 - ax^2y - 6x^3x}{2u}$$

$$= 0 : \text{ Jam, pro } z, \& u, \text{ repone earum valores. } \frac{by^3}{a+y}, \&$$

$$xx\sqrt{ay+xx}, \& \text{ habebis. petitam Æquationem } 3xxx - 2ayy$$

$$+ \frac{3abyyy}{aa+2ay+yy} + \frac{2by^3y}{aa+2ay+yy} - \frac{4ayx^3 - 6x^3x - axx^2}{2\sqrt{ay+xx}},$$

quæ exprimet Relationem inter Velocitates x & y .

Hinc, puto, manifestum est quomodo peragi possit Operatio in aliis casibus, ut, cum Æquatio proposita implicatur surdis Denominatoribus, cubicis Radicalibus, Radicalibus intra Radicales. ut $\sqrt{ax} + \sqrt{aa - xx}$, aut quibusvis aliis complexis Terminis ejusdem generis.

Quinimò, etiam si proposita Æquatio involvat Quantitates, quæ determinari & exprimi geometricè nequeunt, quales sunt Areæ curvilineæ, aut Curvarum Longitudines, inveniri tamen potest Relatio, quæ est inter earum Fluxiones, ut sequens Exemplum demonstrabit.

PREPARATIO I N.

EXEMPLUM V.

TAB. I. Sit (Fig. 3.) BD Ordinata ad rectos Angulos ipsi AB; & ADH fit Curva, cujus natura definitur Relatione, quæ est inter AB, & BD, & Æquatione exprimitur. Vocentur AB quidem x , & Area Curvæ ABD ad Unitatem applicata z ; Jam, ad rectos Angulos educ AC æqualem Unitati; & per C age CE parallélam ad AB, & secantem BD in E. Nunc intellige ambas hæc superficies ADB, & ACEB, generari motu Rectæ BED, patet quòd earum Fluxiones, (Fluxiones nempe Quantitatum $1 \times z$, & $1 \times x$, aut Quantitatum z , &

z , & x ,) sunt inter se ut Rectæ generantes BD , & BE ; quocirca $z : x :: BD : BE$, aut 1 ; & idcirco $z = x \times BD$.

Hinc apparet, quòd z inveniri potest in Æquatione exprimente Relationem inter x & aliam fluentem Quantitatem y , & tamen Relatio Fluxionum x & y potest quomodocunque innotescere.

EXEMPL. V.

Proponatur, ex. gr., Æquatio $zx + axz - y^2 = 0$, quæ exprimat Relationem inter x , & y ; ac fit $\sqrt{ax - xx} = BD$, undè Curva determinetur, quæ idcirco erit Circulus; Æquatio $zx + axz - y^2 = 0$, dabit ex supra traditis $2zx + axz + azx - 4y'y = 0$ pro Relatione Celeritatum \dot{x} , \dot{y} , & \dot{z} : Igitur, quia $z = x \times BD$ aut $x\sqrt{ax - xx}$, pro z pone hunc valorem, & inde conficietur hæc Æquatio $2zx + axx \times \sqrt{ax - xx} + azx - 4y'y = 0$, quæ determinat Relationem Celeritatum \dot{x} , & \dot{y} .

SOLUTIONIS

DEMONSTRATIO.

Fluentium Quantitatum Momenta, (videlicet earum partes indefinitè parvæ, quarum accessione in indefinitè exiguis partibus Temporis Quantitates ipsæ jugiter augentur,) sunt ut Velocitates, quibus fluunt aut crescunt.

Quapropter, si Momentum alicujus, (puta, x) repræsentatur Facto ex ejus Celeritate \dot{x} in Quantitatem indefinitè parvam, (id est, xo ,) Momentum aliarum u , y , z repræsentandum erit per uo , yo , zo , quia uo , xo , yo , & zo , invicem habent eandem Rationem, quam u , x , y , & z .

Jam, quia Momenta, ex. gr., xo , & yo , sunt Incrementa indefinitè

definitè parvâ, quibus fluentes Quantitates x , & y , augmentur per indefinitè parvâ Temporis intervalla, ex eo sequitur has Quantitates x , & y , post indefinitè parvâ Temporis spatia evasisse $x + x o$, & $y + y o$. Æquatio verò, quæ quibuscumque Temporibus indiscriminatim exprimit Relationem fluentium Quantitatum, æquè bene exprimet Relationem, quæ intercedit inter $x + x o$, & $y + y o$, ac eam, quæ est inter x , & y , ita ut in eadem Æquatione ponere liceat $x + x o$, & $y + y o$, pro x , & y .

Quamobrem, sit Æquatio $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$, in eâ substitue $x + x o$, & $y + y o$, ipsis x , & y , obtinebis.

$$\left. \begin{array}{l} x^3 + 3xxxo + 3xxoxo + x^3o^3 \\ - axx - 2axxo - axoxo \\ + axy + ayxo + axoyo \\ + axyo \\ - y^3 - 3yyo - 3yyoyo - y^3o^3 \end{array} \right\} = 0$$

Sed, per hypothesim, est $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$, expunge igitur hos Terminos, ceterosque divide per o & restabit $3xxx - 2axx + ayx + axy - 3yyy + 3xxxo - axxo + axyo - 3yyyo + x^3oo - y^3oo = 0$: Cum autem finxerimus o Quantitatem infinite parvam, ut exponere posset Quantitatum Momenta, Termini in eam ducti pro nihilo possunt haberi cum aliis collati; eos igitur negligo, & superest $3xxx - 2axx + ayx + axy - 3yyy = 0$, ut antea inveneramus in Exemplo I.

Hic observandum venit, quod semper evanescent, cum Termini qui per o multiplicati non sunt, tum ii qui multiplicati sunt per o , duarum aut plurium Dimensionum; & quod reliqui Termini divisi per o , semper acquirunt formam, quam habere debebant secundum Regulam superiorem. Quod erat ostendendum.

His

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 61

His autem demonstratis, facillè sequentur reliqua, quæ complectitur Regula, ut, quòd Æquatio eadem complecti potest plures fluentes Quantitates, & quòd Termini duci possunt non solum in Indices fluentium Quantitatum, sed etiam in quamcunque aliam Progressionem arithmeticam, ita ut in Operatione eadem sit differentia Terminorum juxta singulas fluentes Quantitates, & Progressio disponatur secundum ordinem Dimensionum uniuscujusque Fluentis. His concessis, quæ præterea docentur in Exemplis III, IV., & V., satis per semet ipsa patebunt.

P R O B L. I I.

Datâ Æquatione, qua contineat Quantitatum Fluxiones, invenire quam Relationem habeant inter se hæ Quantitates Fluentes.

S O L U T I O P E C U L I A R I S.

Cùm hoc Problema sit superioris conversum, resolvi debet per Operationes contrarias; scilicet, Termini ducti in x disponi debent juxta Dimensiones x , & dividi per $\frac{x}{x}$, & deindè per Numeros Dimensionum eorum, aut fortasse per aliquam aliam Progressionem arithmeticam: Tum, eadè operâ repetitâ pro Terminis multiplicatis per x, y , vel z , Aggregatum sic emergens poni debet æquale nihilo, rejectis Terminis supervacuis.

E X E M P L U M.

Proponatur Æquatio $3xxx - 2axx + ayx - 3yyy + axy = 0$, Operatio fiet, ut hîc vides.

H' 3

Divide

Divide $3xxx - 2axx + ayx$ Per $\frac{x}{x}$	Divide $— 3yy * + axy$ Per $\frac{y}{y}$
Quotiens est $3x^3 - 2axx + ayx$, quem divide per 3 ; 2 ; 1	Quotiens est $— 3y^3 * + axy$, quem divide per 3 ; 2 ; 1
Quotiens est $x^3 - axx + axy$	Quotiens est $— y^3 * + axy$

Igitur Aggregatum $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$, exprimet petitam Relationem Quantitatum x , & y .

Hic animadvertendum est, quòd etiam si Terminus axy bis occurrat, illum tamen bis non adscribo Summæ $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$, sed alterum rejicio ut Terminum redundantem. Eodem pacto, si quando Terminus aliquis bis recurrit, (aut pluriès, si quando idem Terminus complectitur diversas Quantitates fluentes,) semel scribi debet in Terminorum summâ.

Alia, quæ fuissent observanda, permittam solertiæ Artificis; nam supervacaneum esset nimis diu in hoc argumento hære: siquidem hoc pacto Problema non semper solvi potest. Unum tamen addam, videlicet, quòd si, postquam Fluentium Relationem inveneris hâc Methodo, regredi potes per Probl. I. ad propositam Æquationem Fluents involventem, certò noscis Opus esse rectum, aliàs non. Sic in Exemplo proposito, si ex inventâ Æquatione $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$ quero, per primum Problema, Relationem Fluxionum x , & y , pervenio ad propositam Æquationem $3xxx - 2axx + ayx + axy - 3yy = 0$; undè constat Æquationem $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$ eam esse quam petebamus. Sed, propositâ Æquatione $xx - yx + ay = 0$, Methodus præscripta præbet $\frac{1}{2}xx - yx + ay = 0$, Æquationem, quæ exponere deberet Relationem inter x , & y ; sed quæ ad hoc inepta est, quia hinc, per Probl. I., excuditur $xx - yx - xy + ay = 0$, quæ Æquatio differt à propositâ.

His autem perfunctoriè præmissis aggredior generalem solutionem.

P R Æ-

PRÆPARATIO IN
SOLUTIONE M.

Principio animadvertendum est, quòd in proposità Æquatione symbola Fluxionum, (sunt enim Quantitates diversi generis ab iis, quarum Fluxiones sunt,) in singulis Terminis ascendere debent ad æquè altas Dimensiones: si quando autem res aliter se habet, assumenda pro Unitate est aliqua Fluxio cujuscvis fluentis Quantitatis, & per eam Termini minùs alti sunt multiplicandi totiès quotiès opus est, ut symbola Fluxionum perveniant ad eundem Dimensionum numerum in omnibus Terminis.

Sit, ex. gr., Æquatio $\dot{x} + \dot{x}\dot{y} - axx = 0$, pro Unitate accipienda est Fluxio \dot{z} tertiæ cujuslibet Quantitatis fluentis z , & per eam primus Terminus \dot{x} semèl, ultimus autem axx bis multiplicati concipiendi sunt; ut Fluxiones in iis ad tot Dimensiones ascendant, ad quot in secundo Terminò $\dot{x}\dot{y}$; non secus, ac si proposita Æquatio deducta fuisset ab hac $\dot{x}\dot{z} + \dot{x}\dot{y} - axxz = 0$, fingendo $z = 1$. Haud alitèr in Æquatione $\dot{x}\dot{y} = yy$, concipi debet \dot{x} esse Unitatem, per quam Terminus yy multiplicandus est.

Jam Æquationes, quæ solùm duas fluentes Quantitates complectuntur, & eæ pari Dimensionum numero ubique gaudent, semper ita disponi possunt, ut ad unam partem sit Ratio Fluxionum, (puta, $\frac{\dot{y}}{x}$, aut $\frac{\dot{x}}{y}$, vel $\frac{\dot{z}}{x}$, &c.), & ad aliam valor hujus Ratio-

nis expressus simplici Terminò algebraïco, ut $\frac{\dot{y}}{x} = 2 + 2x - y$.

Et, cùm peculiaris supra tradita Solutio adhiberi nequit, semper Æquationes hâc formâ donandæ sunt.

Quapropter, si quando in Rationis hujus valore aliquis Terminus

im-

implicatus est Denominatore complexo aut radicali Signo, aut si quando Ratio ipsa est Radix affectæ Æquationis, antequam Opus aggrediare, debes Reductionem facere, sive per Divisionem sive per Radicis extractionem sive per Æquationis affectæ Resolutionem, ut supra docuimus.

Proponatur, *ex. gr.*, Æquatio $\dot{a}y - xy - ax + xx - yx = 0$, primùm per Reductionem ea fit $\frac{\dot{y}}{x} = 1 + \frac{\dot{y}}{a-x}$, aut $\frac{\dot{x}}{y} = \frac{a-x}{a-x+y}$.

In prima hypothèsi, redigo Terminum $\frac{\dot{y}}{a-x}$, cujus Denominator est composita Quantitas $a-x$, ad infinitam simplicium Terminorum Seriem $\frac{\dot{y}}{a} + \frac{xy}{aa} + \frac{xyx}{a^3} + \frac{x^2y}{a^4}$; &c., (quæ Reductio fit dividendo Numeratorem y per Denominatorem $a-x$,) unde excudo $\frac{\dot{y}}{x} = 1 + \frac{\dot{y}}{a} + \frac{xy}{aa} + \frac{xyx}{a^3} + \frac{x^2y}{a^4}$; &c., cujus ope determinanda est Relatio inter x & y .

Eodem pacto, si daretur Æquatio $\dot{y}y = \dot{x}y + xx\dot{x}$, aut $\frac{\dot{y}\dot{y}}{xx} = \frac{\dot{y}}{x} + xx$, aut, per ulteriorem Reductionem, $\frac{\dot{y}}{x} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + xx}$ extraherem quadratam Radicem Terminorum $\frac{1}{4} + xx$, & obtinerem Seriem infinitam $\frac{1}{2} + xx - x^4 + 2x^6 - 5x^8 + 14x^{10}$; &c., quam si substituerem pro $\pm \sqrt{\frac{1}{4} + xx}$, haberem $\frac{\dot{y}}{x} = 1 + xx - x^4 + 2x^6 - 5x^8 + 14x^{10}$; &c., aut $\frac{\dot{y}}{x} = -xx + x^4 - 2x^6 + 5x^8 - 14x^{10}$; &c., prout $\sqrt{\frac{1}{4} + xx}$ additur ipsi $\frac{1}{2}$, vel ab eo subtrahitur.

Haud

Haud secus, proposita Æquatione $y^3 + axx \dot{y} + aax \dot{y} - x^3$
 $\dot{x}^3 - 2a^3 \dot{x}^3 = 0$, aut $\frac{\dot{y}^3}{x^3} + ax \frac{\dot{y}}{x} + aa \frac{\dot{y}}{x} - x^3 - 2a^3 = 0$;

extraho Radicem cubicæ Æquationis affectæ, undè fit $\frac{\dot{y}}{x} = a - \frac{x}{4}$

+ $\frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^4}{16384a^3}$; &c., ut jam inveneramus.

Hic autem observandum est, quòd in compositorum censum refero solùm Terminos illos, qui compositi sunt respectu fluentium Quantitatum. Simples enim reputo Quantitates, quæ compositæ sunt tantùm quoad Quantitates datas; quia reduci possunt ad Quantitates simplices, ponendo eas æquales alicui datæ Quantitati. Quapropter Quantitates $\frac{ax+bx}{c}$; $\frac{x}{a+b}$; $\frac{bcc}{ax+bx}$;

$\frac{b^4}{axx+bx}$; $\sqrt{ax+bx}$; &c., mihi simplices sunt, quia omnes reducere possum ad Quantitates simplices $\frac{ex}{c}$; $\frac{x}{e}$; $\frac{bcc}{ex}$; $\frac{b^4}{exx}$; \sqrt{ex} ;

(vel $e^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}$), supponendo $a+b=e$.

Præterea, quòd facilius una ex fluentibus Quantitatibus ab aliâ distingui possit, Fluxionem eam, quæ in Rationis Numeratore est, non improprie vocari potest *Relata Quantitas*; ea verò, quæ est in Denominatore & cui prior comparatur, *Correlata*: Quin etiam Quantitates ipsæ fluentes iisdem respective Nominibus insigniri possunt. Et, ut sequentia melius intelligantur, concipere licet *Correlatam* Quantitatem esse Tempus, aut quamlibet aliam Quantitatem æquabiliter fluentem, per quam Tempus exponitur & mensuratur: Aliam verò, *Relatam* scilicet Quantitatem, esse spatium Tempore illo descriptum à re, vel Puncto gaudente Motu sive accelerato sive retardato; ac Problematis sensum esse, quòd Velocitate Motûs datâ ad quodcumque Temporis momentum, spatium descriptum per totum Tempus est determinandum.

Æquationes autem, quæ ad hoc Problema pertinent, ad tres Ordines revocari possunt.

If. Newtoni Opuscula, Tom. I

I

Primus

Primus continet eas, in quibus inveniuntur duæ Quantitatum Fluxiones, & altera solùm ex earum Fluentibus.

Secundus illas quæ duas involvunt fluentes Quantitates, simul cum earum Fluxionibus.

Tertius denique eas in quibus sunt Fluxiones plurium quàm duarum Quantitatum.

Quibus præmissis, transeo ad solutionem trium horum Problematis casuum.

S O L U T I O C A S U S I.

Statue fluentem Quantitatem, quæ unica est in Æquatione, esse *Correlatam*, & Æquatione huic hypothefi aptatâ, (ponendo scilicet hinc solam Rationem, quam habet Fluxio alterius Quantitatis ad hujus Fluxionem, & inde valorem hujus Rationis in simplicibus Terminis,) multiplica valorem Rationis, quæ inter Fluxiones intercedit, per *Correlatam* Quantitatem; deindè divide singulos hujus valoris Terminos per numerum Dimensionum, ad quas elevata est Quantitas ipsa *Correlata*, & id, quod sic assequeris, æquivalet alteri fluenti Quantitati.

Sic, propositâ Æquatione $yy = xy + xxxx$, suppono quòd x sit *Correlata* Quantitas, & factâ Æquationis Reductione accommodatâ.

huic hypothefi, reperio $\frac{y}{x} = 1 + xx - x^4 + 2x^6$; &c. Jam mul-

tiplico valorem $\frac{y}{x}$ per x , undè assequor $x + x^3 - x^5 + 2x^7$; &c.,

quos Terminos singulos divido per numerum Dimensionum, quibus afficiuntur, & inde conficitur $x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{7}x^7$; &c., quam Quantitatem pono $= y$, & hac Æquatione definietur Relatio inter x , & y . Quod petebatur.

Paritèr, sit Æquatio $\frac{y}{x} = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512aa}$; &c., hinc

habebis:

habebis $y = ax - \frac{xx}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048aa}$; &c. , Æquationem, quæ determinat Relationem ipsarum x , & y .

Item , Æquatio $\frac{y}{x} = \frac{1}{x^3} - \frac{1}{xx} + \frac{a}{x^{\frac{1}{2}}} - x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}$;
 dat $y = -\frac{1}{2xx} + \frac{1}{x} + 2ax^{\frac{1}{2}} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$; nam, duc
 valorem $\frac{y}{x}$ in x , fiet $+\frac{1}{xx} - \frac{1}{x} + ax^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{5}{2}}$, aut x^{-1}
 $-x^{-1} + ax^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{5}{2}}$; quibus Terminis divisus per nume-
 rum Dimensionum, orietur valor y , ille idem, quem supra inveni-
 mus.

Haud secus, ex Æquatione $\frac{x}{y} = \frac{2bbc}{\sqrt{ay^3}} + \frac{3yy}{a+b} + \sqrt{by^3+cy^3}$, af-
 fequor $x = -\frac{4bbc}{\sqrt{ay}} + \frac{y^3}{a+b} + \frac{2}{3}\sqrt{by^3+cy^3}$; quia valor
 ipsius $\frac{x}{y}$ multiplicatus per y , gignit $\frac{2bbc}{\sqrt{ay}} + \frac{3y^3}{a+b} + \sqrt{by^3+cy^3}$;
 aut $2bbca^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + \frac{3}{a+b}y^3 + \sqrt{b+c} \times y^{\frac{3}{2}}$; undè conficitur va-
 lor x , dividendo per numerum Dimensionum cujusque Termini.

Eodem pacto $\frac{y}{z} = x^{\frac{2}{3}}$ dat $y = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}$; & $\frac{y}{x} = \frac{ab}{cx^{\frac{2}{3}}}$ præ-
 bet $y = \frac{3abx^{\frac{2}{3}}}{2c}$. Sed Æquatio $\frac{y}{x} = \frac{a}{x}$ dat $y = \frac{a}{0}$; nam, si $\frac{a}{x}$
 multiplicetur per x conficitur a , & si a dividatur per numerum Di-
 mensionum x , videlicet per 0 , habetur $\frac{a}{0}$, quæ Quantitas infinita
 debet esse valor y .

Quapropter, si quando Terminus huic similis occurrit in valore
 1 2
 ipfius

ipfius $\frac{y}{x}$, id est, Fractio, cujus Denominator involvit *Correlatam*

Quantitatem unius Dimensionis, ipsi *Correlata* Quantitati substitue aggregatum ex eâ & quâcumque datâ ad libitum assumendâ, vel earum differentiam: Hoc enim pacto servabitur in Æquatione sic effectâ Relatio, quæ erat in Æquatione primò propositâ, & infinita *Relata* Quantitas minuetur infinitâ suimet parte, & finita fiet, expressa tamen Terminis numero infinitis.

Quocirca, propositâ Æquatione $\frac{y}{x} = \frac{a}{x}$; si pro x scribis $b+x$,

Quantitate b ad libitum assumptâ, reperies $\frac{y}{x} = \frac{a}{b+x}$, & per

Divisionem $\frac{y}{x} = \frac{a}{b} - \frac{ax}{bb} + \frac{axx}{bb^2} - \frac{ax^3}{bb^3}$; &c. Nunc autem Re-

gula nuper tradita dat $y = \frac{ax}{b} - \frac{axx}{2bb} + \frac{ax^3}{3b^3} - \frac{ax^5}{4b^4}$; &c., ad exponendam Relationem, quæ est inter x , & y .

Itidem, si habeas Æquationem $\frac{y}{x} = \frac{2}{x} + 3 - xx$, si, (quia

adest Terminus $\frac{2}{x}$,) scribas $1+x$ pro x , orietur $\frac{y}{x} = \frac{2}{1+x} + 2$

$- 2x - xx$. Jam, reducendo $\frac{2}{1+x}$ in infinitam Seriem $2 - 2x$

$+ 2xx - 2x^3 + 2x^5$; &c., consequeris $\frac{y}{x} = 4 - 4x + xx$

$- 2x^3 + 2x^5$; &c.; & juxta Regulam, $y = 4x - 2xx + \frac{x^3}{3}$

$x^5 - \frac{1}{2}x^7 + \frac{2}{5}x^9$; &c., pro Relatione x , & y .

Eadem ratione, propositâ Æquatione $\frac{y}{x} = x^{-\frac{1}{2}} + x^{-1} - x^{\frac{3}{2}}$,

quia

quia in eâ video Terminum x^{-1} , (vel $\frac{1}{x}$), transmuto x ponendo

$$1 - x \text{ pro eo, unde fit } \frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt{1-x}} + \frac{1}{1-x} - \sqrt{1-x}.$$

Jam verò Terminus $\frac{1}{1-x}$ producit $1 + x + xx + x^3$; &c., ac

Terminus $\sqrt{1-x}$ æquivalet $1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}xx - \frac{1}{16}x^3$; &c.,

& idcirco $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$, aut $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}xx - \frac{1}{16}x^3}$, idem

est ac $1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}xx + \frac{5}{8}x^3$; &c. : His ergo valoribus sub-

stitutis, obtinebis $\frac{y}{x} = 1 + 2x + \frac{3}{2}xx + \frac{27}{16}x^3$; &c., ac, per

Regulam, $y = x + xx + \frac{1}{2}x^3 + \frac{27}{64}x^4$; &c.; atque ita porro.

Quin etiam in aliis casibus, aliquando concinniori formâ donantur Æquationes, simili fluentis Quantitatis transmutatione; ut, si propo-

neretur Æquatio $\frac{y}{x} = \frac{ccx}{c^3 - 3ccx + 3cx^2 - x^3}$, pro x scribo

$c - x$, & assequor $\frac{y}{x} = \frac{c^3 - ccx}{x^3}$, aut $\frac{c^3}{x^3} - \frac{cc}{xx}$, & hinc, per

Regulam, $y = -\frac{c^3}{2xx} + \frac{cc}{x}$; sed harum transmutationum usus magis patebit ex sequentibus.

SOLUTIO CASUS II.

PRÆPARATIO.

Hactenus de Æquationibus, quæ unam involvunt Fluentem: Sed quando ambæ apparent in Æquatione, Æquatio illa primum reducenda est ad præscriptam formam, ponendo hinc Fluxionum Ra-

I. 3.

tionem.

tionem, inde Aggregatum ex simplicibus Terminis, cui Fluxionum Ratio æqualis est.

Et, præterea, si quis Æquationis ita reductæ Terminus est Fractio denominata à Quantitate fluente, hic liberari debet à tali Denominatore per supra memoratam fluentis Quantitatis transmutationem.

Hoc pacto, proposità Æquatione $axy - xyx - axx = 0$, vel

$\frac{y}{x} = \frac{y}{a} + \frac{a}{x}$, ob Terminum $\frac{a}{x}$ assumo b ad libitum, & pro x scribo $b + x$ sive $b - x$, aut $x - b$: si scriberem $b + x$, fieret $\frac{y}{x} = \frac{y}{a} + \frac{a}{b+x}$. Tunc autem Terminum $\frac{a}{b+x}$ in Seriem infinitam

per Divisionem diducto, assequeretur $\frac{y}{x} = \frac{y}{a} + \frac{a}{b} - \frac{ax}{b^2} + \frac{axx}{b^3} - \frac{ax^2}{b^4}$; &c.

Haud aliter, Æquatione $\frac{y}{x} = 3y - 2x + \frac{x}{y} - \frac{2y}{xx}$ proposità, si propter Terminos $\frac{x}{y}$ & $\frac{2y}{xx}$ scriberem $1 - y$ pro y , & $1 - x$ pro

x , oriretur $\frac{y}{x} = 1 - 3y + 2x + \frac{1-x}{1-y} + \frac{2y-2}{1-2x+xx}$. At-

qui Terminus $\frac{1-x}{1-y}$, per Divisionem in infinitum, dat $1 - x$

$+ y - xy + yy - xyy + y^2 - xy^2$; &c., ac Terminus $\frac{2y-2}{1-2x+xx}$,

per similem Divisionem, præbet $2y - 2 + 4xy - 4x + 6xxy -$

$6xx + 8x^2y - 8x^2 + 10x^2y - 10x^2$; &c.: Igitur $\frac{y}{x} = -3x$

$+ 3xy + yy - xyy + y^2 - xy^2$; &c., $+ 6xxy - 6xx + 8x^2y$

$- 8x^2 + 10x^2y - 10x^2$; &c.

REGU-

Æquatione sic præparatâ , (quatenus opus est ,) dispone Terminos juxta Dimensiones fluentium Quantitatum , primò ponens eos , qui *Relatâ* Quantitate non sunt affecti , deindè eos , qui minimâ ejus Dimensione sunt implicati , & sic deinceps. Eodem pacto in singulos ordines distribue Terminos juxta Dimensiones *Correlatæ* Quantitatis , eosque , qui primum ordinem constituunt , (qui nempe sunt immunes à *Relatâ* Quantitate ,) scribe , ita ut faciant lateralem Seriem à sinistrâ dextram versùs , & reliquos , ita ut componant Seriem descendentem in sinistrâ Columnâ , ut indicant subjectæ Tabellæ. Quibus ita præparatis , multiplica primum aut infimum Terminum prioris ordinis per *Correlatam* Quantitatem , & divide Productum per numerum suarum Dimensionum , & quod hinc fit pone in Quotiente ; erit enim primus Terminus valoris *Relatæ* Quantitatis : Tunc illum substitue in Terminis Æquationis , quæ jam posita fuerat in sinistrâ Columnâ pro *Relatâ* Quantitate , & ex Termino , qui tunc infimus erit , obtinebis secundum Quotientis Terminum eâdem ratione , quâ priorem assecutus fueras. Et hâc Operatione repetitâ Quotientem produces quòusque volueris. Sed hoc magis perspicuum fiet uno aut altero Exemplo.

E X E M P L. I.

Sit Æquatio $\frac{y}{x} = 1 - 3x + y + xx + xy$, cujus Terminos

$1 - 3x + xx$ non affectos *Relatâ* Quantitate dispositos vides in lateralem Seriem primo loco , & reliquos y & xy in sinistrâ Columnâ.

	$+ 1 - 3x + xx$
$+ y$	$* + x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 ; \&c.$
$+ xy$	$* x + xx - x^3 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{6}x^5 + \frac{1}{30}x^6 ; \&c.$
Aggreg.	$+ 1 - 2x + xx - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^4 - \frac{4}{30}x^5 ; \&c.$
$y =$	$+ x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{45}x^6 ; \&c.$

Nunc

Nunc prius multiplico primum Terminum 1 in *Correlatam* Quantitatem x , undè conficitur x , quam Quantitatem divisam per Dimensionum numerum 1 colloco in Quotiente inferius scripto. Deinde, substituendo hunc Terminum pro y in Terminis margini appositis $+y$, & $+xy$, reperiò $+x$, & $+xx$, quos scribo è conspectu ipsorum $+y$, & $+xy$, dextram versùs. Jam è reliquis segrego Terminos infimos $-3x$, & $+x$ quorum summa $-2x$ ducta in x evadit $-2xx$, & divisa per Dimensionum numerum 2 fit $-xx$, & hic Terminus secundus est valoris y Quotienti adscribendus. Postea sumo pariter hunc Terminum ad perficiendum valorem marginalium Terminorum $+y$, & $+xy$, undè assequor $-xx$, & $-x^3$, Terminos addendos ipsis $+x$, & $+xx$ jam adscriptis. Quo facto, rursus excerpo Terminos, qui nunc sunt infimi $+xx$, $-xx$, & $+xx$, quos in unum $+xx$ colligo, & inde educo $+\frac{1}{3}x^3$, (agendo ut antea,) tertium Terminum addendum valori ipsius y . Iterùm, posito hoc Termino $+\frac{1}{3}x^3$ in Terminorum marginalium valore, ex Terminis jam infimis $+\frac{1}{3}x^3$ & $-x^3$ simul additis obtineo $-\frac{1}{6}x^4$ pro quarto Termino valoris y . Et sic in infinitum.

E X E M P L. II.

Eodem pacto, si determinanda foret Relatio x , & y , ex Æquatione $\frac{y}{x} = 1 + \frac{y}{a} + \frac{xy}{aa} + \frac{xy^2}{a^3} + \frac{x^2y}{a^4}$; &c., quæ Series supponitur progredi in infinitum, pono 1 in altissimo loco, & Terminos reliquos in sinistrâ Columnâ, & persequor Opus ut videtur in apposito Diagrammate.

+ 1

	+ I.
$+ \frac{y}{a}$	$* + \frac{x}{a} + \frac{xx}{2aa} + \frac{x^3}{2a^3} + \frac{x^4}{2a^4} + \frac{x^5}{2a^5}; \&c.$
$+ \frac{xy}{aa}$	$* \quad * + \frac{xx}{aa} + \frac{x^3}{2a^3} + \frac{x^4}{2a^4} + \frac{x^5}{2a^5}; \&c.$
$+ \frac{xyy}{a^3}$	$* \quad * \quad * + \frac{x^3}{a^3} + \frac{x^4}{2a^4} + \frac{x^5}{2a^5}; \&c.$
$+ \frac{x^3y}{a^4}$	$* \quad * \quad * \quad * + \frac{x^4}{a^4} + \frac{x^5}{2a^5}; \&c.$
$+ \frac{x^4y}{a^5}$	$* \quad * \quad * \quad * \quad * + \frac{x^5}{a^5}; \&c.$
&c.	
Aggregat.	$1 + \frac{x}{a} + \frac{3xx}{2aa} + \frac{2x^3}{a^3} + \frac{5x^4}{2a^4} + \frac{3x^5}{a^5}; \&c.$
$y =$	$x + \frac{xx}{2a} + \frac{x^3}{2aa} + \frac{x^4}{2a^3} + \frac{x^5}{2a^4} + \frac{x^6}{2a^5}; \&c.$

Propositum, puta, mihi fuerat extrahere valorem ipsius y tantum usque ad sextam Dimensionem x ; eâ de causâ inter operandum omitto omnes eos Terminos, quos ad rem non facturos prævideo, ut indicatur signo &c., quod subjunxi Seriebus intercisis.

EXEMPL. III.

Haud aliter, si proponeretur Æquatio $\frac{y}{x} = 3x + 3xy + y^2$

$- xyy + y^3 - xy^2 + y^4 - xy^3; \&c. + 6xx + 8x^3y - 8x^3 + 10x^4y - 10x^4; \&c.$, & si producenda esset extractio valoris ipsius y , donec x ad septimam Dimensionem ascenderet, Terminos ordine disponerem, ut factum est in subjectâ Tabellâ, & Opus instituerem more solito, nisi quod, quia in sinistrâ Columnâ y invenitur non solum unius sed duarum Dimensionum vel trium (vel etiam plusquam trium, si quis producere vellet valorem y ultra septimam Dimensionem ipsius x ,) subdo secundam & ter-

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

K

tiam

tiam Potestatem y gradatim protractas, quòusque opus est, ut ex postquam positæ fuerint gradatim dexteram versùs pro marginalium valore, saltem dent Terminos tot Dimensionum, quot ad Operationem sequentem requiri perspicio.

	$-3x - 6xx - 8x^3 - 10x^4 - 12x^5 - 14x^6; \&c.$
$+ 3xy$	$* * - \frac{9}{2}x^3 - 6x^4 - \frac{75}{8}x^5 - \frac{273}{20}x^6; \&c.$
$+ 6xx^2$	$* * * - 9x^4 - 12x^5 - \frac{75}{4}x^6; \&c.$
$+ 8x^3y$	$* * * * - 12x^5 - 16x^6; \&c.$
$+ 10x^4y$ &c.	$* * * * * - 15x^6; \&c.$
$+ yy$	$* * * + \frac{9}{4}x^4 + 6x^5 + \frac{107}{8}x^6; \&c.$
$- xyy$ &c.	$* * * * - \frac{9}{4}x^5 - 6x^6; \&c.$
$+ y^3$	$* * * * * - \frac{27}{8}x^6; \&c.$
Aggregat.	$-3x - 6xx - \frac{25}{2}x^3 - \frac{91}{4}x^4 - \frac{333}{8}x^5 - \frac{367}{5}x^6; \&c.$
$x =$	$-\frac{3}{2}xx - 2x^3 - \frac{25}{8}x^4 - \frac{91}{20}x^5 - \frac{111}{16}x^6 - \frac{367}{35}x^7; \&c.$
$yy =$	$+\frac{9}{4}x^4 + 6x^5 + \frac{107}{8}x^6; \&c.$
$y^3 =$	$-\frac{27}{8}x^6; \&c.$

Et hac Methodo reperio. demum $y = -\frac{3}{2}xx -$; &c. quæ est
 Equatio petita: Sed, quia valor hic negativus est, apparet, quòd
 una

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 75

una ex Quantitatibus x , & y , decrefcit cùm altera crefcit. Idem dicendum eft, quando una ex Fluxionibus affirmativa eft, altera verò negativa.

EXEMPL. IV.

Eadem ratione poteft Æquatio refolvi, etiamfi Relata Quantitas affecta fit Dimensionibus fractis: Ut, fi proponeretur indagandus valor x ex Æquatione $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}y - 4yy + 2yx^{\frac{1}{2}} - \frac{4}{5}xx + 7y^{\frac{5}{2}} + 2y^3$, in quâ eft Terminus $2yx^{\frac{1}{2}}$, (aut $2y\sqrt{x}$.) affectus fractâ Dimensione $\frac{1}{2}$.

	$+\frac{1}{2}y * - 4yy + 7y^{\frac{5}{2}} + 2y^3$
$+ 2yx^{\frac{1}{2}}$	$* * + yy * - 2y^3 + 4y^{\frac{7}{2}} - 2y^4; \&c.$
$-\frac{4}{5}xx$	$* * * * * - \frac{1}{20}y^4; \&c.$
Aggreg.	$+\frac{1}{2}y * - 3yy + 7y^{\frac{5}{2}} * + 4y^{\frac{7}{2}} - \frac{41}{20}y^4; \&c.$
$x = +\frac{1}{4}yy - y^3 + 2y^{\frac{7}{2}} * + \frac{8}{9}y^{\frac{9}{2}} + \frac{41}{100}y^5; \&c.$	
$x^{\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}y - yy + 2y^{\frac{5}{2}} - y^3; \&c.$	
$xx = +\frac{1}{16}y^4; \&c.$	

Ex valore ipfius x gradatim deduco valorem $x^{\frac{1}{2}}$, (quod fit extrahendo Radicem quadratam,) ut videre potes in inferiore Diagrammatis parte, qui valor gradatim transferri & inferi poteft in valore marginalis Termini $2yx^{\frac{1}{2}}$. Et hoc pacto tandem habebø Æquationem $x = \frac{1}{4}yy - y^3 + 2y^{\frac{7}{2}} + \frac{8}{9}y^{\frac{9}{2}} - \frac{41}{100}y^5; \&c.$, quâ x relativè ad y indefinitely exprimitur. Et fic rem peragere potes in ceteris cafibus quibuflibet.

K 2

Suprà

Suprà afferui, quòd hæ Solutiones perfici possunt infinitis modis. Hoc facies assumendo ad libitum non solum primam Quantitatem prioris Seriei, sed quamcumque aliam Quantitatem pro primo Quotientis Terminò, & deindè procedendo ut antea. Sic, si in priori ex præcedentibus Exemplis, accipis 1 tanquam primum Terminum valoris y , & substituis 1 pro y in marginalibus Terminis $+y$, & $+xy$, ac prosequeris Operationem ut priùs, (cujus rei tentamen hìc attuli,) orietur alter valor y , nem-

	$+ 1 - 3x + xx$
$+ y$	$+ 1 + 2x \quad * + x^2 + \frac{1}{4}x^4; \&c.$
$+ xy$	$* + x + 2xx \quad * + x^3; \&c.$
Aggreg.	$+ 2 \quad * + 3xx + x^3 + \frac{5}{4}x^4; \&c.$
$y = 1 + 2x \quad * + x^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}x^6; \&c.$	

pe $1 + 2x + x^2 + \frac{1}{4}x^4; \&c.$ Item alter & alter orietur ex hypothesi, quòd 2, vel 3, aut quivis alius Numerus fit primus Quotientis Terminus: Vel, si aliquod symbolum, (puta, a ,) adhibes ad representandum indeterminatè primum Terminum, eadem Operatione, (quam hìc apposui,) invenies $y = a + x + ax - xx + axx + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}ax^2; \&c.$, in quà pro a pone 1, 2, 0, $\frac{1}{2}$, aut quemcumque Numerum, affecuturus infinitis modis Relationem inter x , & y .

	$+ 1 - 3x + xx$
$+ y$	$+ a + x - xx + \frac{1}{3} x^3; \&c.$ $+ ax + axx + \frac{2}{3} ax^2; \&c.$
$+ xy$	$* + ax + xx - x^3; \&c.$ $+ axx + ax^3; \&c.$
Aggreg.	$+ 1 - 2x + xx - \frac{2}{3} x^3; \&c.$ $+ a + 2ax + 2axx + \frac{5}{3} ax^2; \&c.$
	$y = a + x - xx + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{6} x^4; \&c.$ $+ ax + axx + \frac{2}{3} ax^2 + \frac{5}{12} ax^3; \&c.$

Observandum est, quòd, quando Quantitas extrahenda afficitur fracta Dimensione, (ut in quarto ex superioribus Exemplis,) benè sumetur Unitas, vel quivis alius commodus Numerus pro primo Termino; Et hoc quidem necessariò faciendum est, quando ad obtinendum valorem hujus fractæ Dimensionis, Radix aliter extrahi nequit ob negativum signum; & etiam, quando nulli sunt Termini, qui disponi possint in primâ vel capitali Serie, unde primus hic Terminus deducitur.

Sic demum ad finem perduxi hoc valde intricatum & omnium aliorum difficillimum Problema, quando duæ solùm sunt fluentes Quantitates unâ cum Fluxionibus suis in propositâ Æquatione. Sed, præter generalem hanc Methodum, quæ se extendit ad omnes difficultates, aliæ sunt plerumque breviores, quibus Opus facilius sæpè reddi potest, & Lectori rem non injucundam faciam, siquod earum specimen hic ex abundanti referam.

I.

Cum Quantitas resolvenda habet alicubi negativas Dimensiones; omnino necessarium non est prius Aequationem aliâ formâ donare. Proponatur, *ex. gr.*, $y = \frac{1}{y} - xx$, Aequatio in quâ y habet negativam Dimensionem; eam quidem convertere possum in aliam formam, *ex. gr.*, scribendo $1+y$ pro y ; Sed citius expeditur Resolutio Methodo, quam in suppositâ Tabellâ habes.

	* * — xx
$\frac{1}{y}$	$1 - x + \frac{3}{2} xx; \&c.$
Aggregat.	$1 - x + \frac{1}{2} xx; \&c.$
$y = 1 + x - \frac{1}{2} xx + \frac{1}{6} x^3; \&c.$	
$\frac{1}{y} = 1 - x + \frac{3}{2} xx; \&c.$	

Hic assumpsi Unitatem pro primo Terminò valoris y , reliquos Terminos excudi ut antea; & interim hinc eduxi per partes (dividendo) valorem ipsius $\frac{1}{y}$, quem posui in valore Terminì marginalis.

II.

Necessariò pariter non requiritur, ut Dimensiones alterius stentis Quantitatis semper affirmativæ sint. Nam, ex Aequatione $y = 3 + 2y - \frac{y^2}{x}$, sine præscriptâ Terminì $\frac{y^2}{x}$ Reductione obtineri potest $y = 3x - \frac{3}{2} xx + 2x^3; \&c.$ Et ex Aequatione $y = -y + \frac{1}{x} - \frac{1}{xxx}$, haberi potest $y = \frac{1}{x}$ pro valore ipsius y , si Operatio dirigatur juxta sequens specimen.

	$-\frac{1}{xx} + \frac{1}{x}$
$-y$	$* -\frac{1}{x}$
Aggregat.	$-\frac{1}{xx} \quad 0$
$y = \frac{1}{x}$	

Hic obiter animadvertendum est, quod inter infinitas Solutiones, quibus Aequatio potest enodari, saepe saepius aliqua est, quae perducit ad finitum Quantitatis quæsitæ valorem, ut in superiori Exemplo. Hæ autem Solutiones non difficulter reperiuntur, sumpto aliquo symbolo pro primo Terminò; nam, Solutione peractâ dari potest huic symbolo valor aliquis, qui totam Seriem finitam reddat.

I I I.

Rursus, si valor ipsius y deducendus foret ab Aequatione $\frac{y}{2x} + 1 - 2x + \frac{1}{2}xx = y$, illum assequi potes, & quidem satis concinnè, Terminò $\frac{y}{2x}$ non reducto; modò supponas, (ut Analystæ faciunt,) datum id quod petitur. Sic, primum Terminum valoris y fingo $2ex$, & pono $2e$ esse numeralè Coefficientem, qui adhuc ignotus est; & scribendo $2ex$ pro y in marginali Terminò, obtineo e , quam Quantitatem pono dextram versùs, & Aggregatum $1 + e$ dabit $x + ex$ pro illo ipso primo Terminò, quem antea representaveram symbolo $2ex$. Quapropter facio $2ex = x + ex$, & hinc deduco $e = 1$; est igitur $2x$ primus valoris y Terminus $2ex$. Eodem pacto, fictitiùm Terminum $2fxx$ usurpo ad representandum

secundum

secundum Terminum valoris y , unde conficitur $-\frac{2}{3}$ pro valore ipsius f , & propterea secundus Terminus est $-\frac{4}{3}xx$: Haud aliter fictitius Coefficientens g in Termino tertio dabit $\frac{1}{10}$; & h in quarto præbebit e . Quocirca, cum nullus alius Terminus superfit, perspicio peractum esse Opus, & valorem ipsius y esse accuratè $2x - \frac{4}{3}xx + \frac{1}{5}x^3$. Diagramma suppositum totam Operationem tibi sistit.

	$1 - 2x + \frac{1}{2}xx$
$\frac{y}{2x}$	$e + fx + gxx + bx^3$
Aggregatum	$+ 1 - 2x + \frac{1}{2}xx$ $+ e + fx + gxx + bx^3$
Per hypothesim	
$y = 2ex + 2fxx + 2gx^3 + 2bx^4$	
Per consequens	
$y = +x - xx + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{4}bx^4$ $+ ex + \frac{1}{2}fxx + \frac{1}{3}gx^3$	
Re ipsa $y = 2x - \frac{4}{3}xx + \frac{1}{5}x^3$	

Eodem pacto, si haberes $y = \frac{3y}{4x}$, pone $y = ex^s$, ubi e denotat Coefficientem incognitum & s numerum Dimensionum itidem incognitum. Substituendo ex^s pro y fiet $y = \frac{3ex^{s-1}}{4}$, & hinc rursus $y = \frac{3ex^s}{4}$. Confer hos duos valores ipsius y , & invenies $\frac{3e}{4s} = e$; quocirca

quocirca $s = \frac{3}{4}$, & e est indefinita; igitur, assumptà e ad li-
bitum, habebis $y = ex^{\frac{3}{4}}$.

I V.

Potes aliquando etiam Operationem incipere ab altiore Quantita-
tis æquabilis Dimensione, & gradatim descendere ad Potestates in-
feriores. Ut, si daretur Æquatio $y = \frac{2}{xx} + \frac{1}{xx} + 3 + 2x -$
 $\frac{4}{x}$, velles autem incipere ab altissimo Termino $2x$, disponens Se-
riem capitalem ordine contrario illi, quem hactenus servavimus;
hinc demum excuderet $y = xx + 4x - \frac{1}{x}$; &c., juxta modum
procedendi hic appositum.

	$+ 2x + 3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{xx}$
$+ \frac{2}{xx}$	$* + 1 + \frac{4}{x} \quad * - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x^4}; \&c.$
Aggreg.	$+ 2x + 4 \quad * + \frac{1}{xx} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x^4}; \&c.$
$y = xx + 4x \quad * - \frac{1}{xx} + \frac{1}{2xx} - \frac{1}{6x^3}; \&c.$	

Obiter observa, quòd in Operationis progressu, poteram inferuif-
se quamcumque datam Quantitatem inter Terminos $4x$, & $-\frac{1}{x}$,
pro intermedio Termino qui deest; & ita valor ipsius y potuisset
exhiberi modis infinitis.

Si præterea Quantitas *Relata* habet aliquem Dimensionum suarum fractum Indicem, revocari potest ad Integros, ponendo, quod Quantitas Indice fracto affecta æqualis est alicui tertiæ Fluenti, & substituendo pro *Relatâ* Quantitate & ejus Fluxionibus Quantitatem eductam ex Æquatione fictitiâ, ejusque Fluxiones.

Proposita sit, *ex. gr.*, Æquatio $y = 3xy^{\frac{2}{3}} + y$, in quâ fracto Indice $\frac{2}{3}$ afficitur Quantitas *Relata*; sumptâ ad libitum Fluente aliquâ z , suppone $y^{\frac{1}{3}} = z$, vel $y = z^3$; Relatio Fluxionum, per Probl. I., erit $y = 3zxx$: Quapropter scribe $3zxx$ pro y , & z^3 pro y , & xx pro $y^{\frac{2}{3}}$, hinc habiturus $3zxx = 3xz^2 + z^3$ aut $z = x + \frac{1}{3}z$, ubi z fungitur officio *Relatæ* Quantitatis. Jam, extracto valore ipsius z , puta, $z = \frac{1}{2}xx + \frac{x^3}{18} + \frac{x^4}{216} + \frac{x^5}{3240}$; &c., restitue $y^{\frac{1}{3}}$ pro z , & obtinebis petitam Relationem inter x , & y , videlicet $y^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}xx + \frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{216}x^4$; &c., vel, omnia elevando ad tertiam Potestatem, $y = \frac{1}{8}x^6 + \frac{1}{24}x^7 + \frac{1}{288}x^8$; &c.

Item, si daretur Æquatio $y = \sqrt{4y} + \sqrt{xy}$, vel $y = 2y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$, facio $z = y^{\frac{1}{2}}$, sive $zz = y$, & hinc, per Probl. I., duco $2zx = y$; quapropter $2zx = 2z + zx^{\frac{1}{2}}$, aut $z = 1 + \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$; ergo, per priorem hujus Problematis Casum, est $z = x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$, sive $y^{\frac{1}{2}} = x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$, & quadrando, $y = xx + \frac{2}{3}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{9}x^3$. Sed, si vis valorem y expressum infinitis modis diversis, pone $z = e + x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$,

+ $\frac{1}{3} x^{\frac{3}{2}}$, assumendo quemvis primum Terminum c , & habebis
 xx (id est y) $= ax + 2cx + \frac{2}{3} cx^{\frac{3}{2}} + xx + \frac{2}{3} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{9} x^3$. Sed
 fortasse hæc persequens, quæ rarò usu-venient, nimis minuta scruta-
 tatus videbor.

SOLUTIO CASUS III.

Statim nos extricabimus à Problemate solvendo, quando *Æqua-*
tio continet tres vel etiam plures Quantitatum Fluxiones. Nam,
 ad id sufficit quamlibet Relationem inter binas supponere, cum hæc
 Relatio à statu quæstionis non determinatur, & hinc deduci potest
 Relatio, quæ est inter earum Fluxiones, ita ut exterminari possit al-
 terutra cum Fluxione suâ. Quamobrem, si trium Quantitatum
 Fluxiones adsunt, una *Æquatio* assumenda est; duæ *Æquationes*,
 si quatuor insunt Fluxiones; atque ita porro; ita ut *Æquatio* propo-
 sita tandem in aliam transformetur, in quâ sint duæ Fluxiones tan-
 tummodo. Tunc autem *Æquatio* hæc resolvenda est ut supra, &
 sic detegentur Relationes aliarum Quantitatum.

Sit proposita *Æquatio* $2\dot{x} - \dot{z} + \dot{xy} = 0$: Ut obtineam Re-
 lationem Quantitatum x , y , & z , quarum Fluxiones \dot{x} , \dot{y} , & \dot{z} sunt
 in *Æquatione* hac, fingo Relationem quamlibet inter duas ex ipsis,
 puta, inter x , & y , supponendo quòd $x = y$, aut $2y = z + x$,
 sive $x = yy$; &c.: Sumamus $x = yy$, &, (quod hinc confici-
 tur,) $\dot{x} = 2y\dot{y}$. Igitur *Æquatio* proposita, ponendo $2y\dot{y}$ pro \dot{x} ,
 & $y\dot{y}$ pro \dot{z} , mutatur in hanc $4y\dot{y} - \dot{z} + y\dot{y} = 0$; & hinc edu-
 citur Relatio inter y , & z , id est, $2y\dot{y} - \dot{z} + \frac{1}{3}y^3 = 0$: Re-
 titue x pro yy , & $x^{\frac{3}{2}}$ pro y^3 , & invenies $2x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$. Ergo,
 ex infinitis modis, quibus x , y , & z , altera ad alteram, possunt
 referri, unus inventus fuit, qui exponitur per has *Æquationes* $x = yy$,
 $2y\dot{y} + \frac{1}{3}y^3 = z$; & $2x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$.

L 2

DE

DEMONSTRATIO.

Hoc pacto solutum est Problema, sed latet Demonstratio. Cum autem tot & tam varia contineat hoc Problema, ut Demonstratio syntheticè sine maximis ambagibus deduci nequeat ex genuinis ejus fundamentis, sufficiet eam breviter indicare analyticè. Proposità igitur Æquatione, & Opere peracto, tenta num ex Æquatione repectà regredi liceat ad propositam, per Probl. I. Quod ubi accidit, constat Relationem, quæ est inter Quantitates in Æquatione repectà, requirere Relationem, quæ est inter Fluxiones in proposità; & vice versà. *Q. E. D.*

Sic, Æquatione proposità $y = x$, ex eà deduceretur Æquatio $y = \frac{1}{2}xx$, & ex hac, vice versà, per Probl. I., $y = xx$, aut $y = x$, quia x sumitur pro Unitate. Eodem pacto, ex $y = 1 - 3x + y + xx + xy$ conficitur $y = x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{45}x^6$; &c., & rursus hinc, per Probl. I., $y = 1 - 2x + xx - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^4 - \frac{2}{15}x^5$; &c., qui duo valores conveniunt, ut patet substituendo $x = xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5$; &c., pro y in primo valore.

Sed in Æquationum Reductione adhibeo Operationem, cujus rationem afferendam censeo; ea consistit in alicujus fluentis Quantitatis transmutatione per ejus connexionem cum datà Quantitate. Sint TAB. I. (*Fig. 4.*) AE , atque ae , duæ Rectæ utrimque in infinitum protensæ; per quas ferantur duæ res mobiles, aut duo Puncta, quæ eodem Tempore pervenisse concipiantur in loca A , & a ; B & b ; C & c ; D & d ; &c., & Mobilis, quod fertur per AE , distantia à puncto B illius Motum ita metiatur, ut $-BA$, $+BC$, $+BD$, $+BE$ successivè, & quando Mobile est in locis A , C , D , E , sint fluentes Quantitates. Pariter, sit b simile Punctum in alterà Lineà:

Tunc

Tunc igitur — BA, & — ba, erunt duæ contemporaneæ Fluentes, ut etiam + BC, & + bc; + BD, & + bd; + BE, & + be; &c. Jam, si Punctis B, & b, substituantur Puncta A, & c, ad quæ, velut quiescentia, referantur Motus; tunc o, & — ca; + AB, & — cb; + AC, & o, + AD, & + cd; + AE, & + ce, erunt contemporaneæ fluentes Quantitates. Quocirca, mutata quidem sunt fluentes Quantitates Additione & Subductione datarum Quantitatum AB, & ac; sed in iis mutata non fuerant neque Motuum Celeritates, neque mutua Fluxionum Relatio. Partes enim eodem Tempore genitæ AB, & ab; BC, & bc; CD, & cd; DE, & de, sunt ejusdem longitudinis in utrâque hypothesi. Eodem pacto in Æquationibus has Quantitates exponentibus contemporaneæ Quantitatum partes non ideo mutantur, quia absoluta earum magnitudo aliquâ datâ Quantitate augetur vel minuitur. Hinc patet propositum; etenim eò tantum tendit Problema, ut determinentur contemporaneæ partes aut differentia absolute Quantitatum u, x, y , aut z , descriptæ datâ Fluendi Ratione. Nihil autem interest cujusnam absolute magnitudinis sint hæ Quantitates, dummodò earum contemporaneæ vel correspondentes differentia convenient cum propositâ Fluxionum Relatione.

Hujus rei ratio tradi etiam sic algebraicè potest. Proposita sit Æquatio $y = yxx$; & suppone $x = r + z$; igitur, per Probl. I., $x = z$; Quapropter pro $y = yxx$ scribere licet $y = yx + yxz$.

Nunc, quia $x = z$, liquet, quòd tamen Quantitates x , & z , non sint ejusdem longitudinis, attamen æqualiter fluunt, respectivè ad y , & habent æquales unâ genitas partes. Quidni igitur repræsentem eodem symbolo Quantitates, quarum Ratio fluendi eadem est, & ad determinandas earum contemporaneas differentias quidni scribam

$$y = yx + yxx, \text{ pro } y = yxx.$$

Demum manifestò apparet, quomodo inveniri possint partes contemporaneæ ex Æquatione Fluente involvente.

Sic adfit Æquatio $y = \frac{1}{x} + x$, & cum $x = z$, sit $y = 2 \frac{1}{2z}$

L. 3.

at.

at, cùm $x = 3$, tunc $y = 3\frac{1}{3}$. Igitur, dum x fluit ex 2 in 3, y fluit ex $2\frac{1}{2}$ in $3\frac{1}{3}$, quapropter partes eodem Tempore descriptæ sunt $3 - 2 = 1$, & $3\frac{1}{3} - 2\frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

His, tanquam dicendorum fundamentis substratis, ad magis peculiariora Problemata descendam.

P R O B L. I I I.

Quantitatem Maxima & Minima determinare.

Cùm Quantitas est omnium possibilium *Maxima*, vel *Minima*, ea, hoc ipso Temporis momento, nec retroversum fluit, nec antrosum: Nam, si antrosum fluere, id est, crescere posset, ante Fluxionem certè minor erat, quàm post; & post major quàm antea. Et, vice versâ, si retroversum fluere vel decresceret. Igitur quære ejus Fluxionem, per Probl. I., & eam nihilo æqualem pone.

E X E M P L. I.

Quærendus sit maximus Valor ipsius x in Æquatione $x^3 - axx + xy - y^3 = 0$; quære Relationem Fluxionum x , & y , & invenies $3xxx - 2axx + ayx + axy - 3yyy = 0$: Fac $x = 0$; restabit $axy - 3yyy = 0$ vel $3yy = ax$. Hujus ope exterminabis alterutram ex Fluentibus x , & y è primariâ Æquatione, & aliam determinabis ex Æquatione hinc proveniente; & deinde ambas per $-yy + ax = 0$.

Hoc facere non aliud est, quàm multiplicare Terminos Æquationis propositæ per Dimensiones alterius fluentis Quantitatis y . Hinc deduci potest notissima Regula H U D D E N I I, quâ jubetur, ut ad inveniendam maximam vel minimam Quantitatem *Relatam*; Æquatio disponatur juxta Dimensiones Quantitatis *Correlata*, & Termini multiplicentur per aliquam arithmeticam Progressionem. Sed quia neque hæc Regula, nec ulla alia ex iis, quas vulgatas scio, se extendit

tendit ad Aequationes affectas surdis Quantitatibus, absque præviâ Reductione; idcirco sequens dabo Exemplum ad hunc Casum spectans.

E X E M P L. II.

Determinanda sit maxima Quantitas y in Aequatione $x^3 - ayy + \frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay+xx} = 0$. Quare Fluxiones x , & y , quod dabit

$$\text{Aequationem } 3xxx - 2ayy + \frac{3abyyy + 2by^3y}{aa + 2ay + yy} - \frac{4ayxx + 6x^3x + axxy}{2\sqrt{ay+xx}}$$

$= 0$. Jam, quia, per hypothesim, $y = 0$, omitte Terminos ductos in y , (quos ad laborem minuendum omisisse potuisses inter operandum,) & quos superstites invenies divide per xx ; demum habiturus

$$3x - \frac{2ay + 3xx}{\sqrt{ay+xx}} = 0 : \text{Hinc, Reductione factâ, assequeris}$$

$4ay + 3xx = 0$, cujus opo poteris exterminare alterutram ex Quantitatibus x , & y , ex propositâ Aequatione; & illa, quæ hinc exsurget; (erit autem cubica) dabit alterius valorem.

Ex hoc Problemate deduci potest Solutio sequentium.

I

Dato Triangulo, aut Segmento cujusvis datæ Curvæ, inscribere maximum Rectangulum.

I I.

Ducere maximam aut minimam rectam Lineam, qua jacere possit inter datum Punctum & Curvam positione datam. Aut, ex dato Puncto ducere Rectam, qua ad rectos Angulos occurrat Curvæ.

I I I.

Ducere rectam Lineam maximam aut minimam earum, qua transeunt per datum Punctum, & jacent inter duas alias Lineas sive Rectas, sive Curvas.

IV. Ex

I V.

Ex Puncto dato in Parabolâ Rectam excitare , quæ Parabolam secet sub Angulo omnium maximè obliquo. Idemque facere in aliis Curvis.

V.

Determinare Curvarum Vertices , earum maximas aut minimas latitudines , Puncta , in quibus partes gyranter sese mutuo secant ; &c.

V I.

Invenire Puncta Curvarum , in quibus ea maximè vel minimè curva sunt.

V I I.

In datâ Ellipsi reperire minimum Angulorum , quo Ordinata earum Diametrum secant.

V I I I.

Ex omnibus Ellipsis , quæ transire possunt per data quatuor Puncta , determinare maximam , vel eam quæ ad Circulum quàm proximè accedit.

I X.

Determinare partem sphericæ Superficiæ in remotiori Hemisphærio ; quam illuminare potest Lux progrediens à magno intervallo , & refracta ab Hemisphærio proximiori.

Plura alia Problemata hujuscemodi facilius proponi possunt , quàm resolvere ob Calculi laborem.

PROBL.

PROBL. I V.

Ducere Tangentes ad Curvas.

PRIMUS MODUS.

Tangentes modis fanè variis duci possunt pro variis Relationibus; quæ inter rectas Lineas & Curvas intercedunt. Et primò quidem sit (*Fig. 5.*) BD recta Linea, vel Ordinata, faciens Angulum quemvis datum cum aliâ Rectâ AB, (quæ Basis est vel Abscissâ,) & terminata ad Curvam ED. Moveatur Ordinata per spatium indefinite parvum usque ad locum *bd*, ita ut ea augeatur Momento *cd*, cùm AB augetur Momento *Bb*, cui *Dc* æqualis est & parallela. Producat *Dd* donec ipsi AB occurrat in T; & hæc Linea Curvam tanget in D vel *d*, & similia erunt Triangula *dcd*, DBT, quapropter TB: BD:: Dc (vel *Bb*): *cd*.

TAB. I.

Cùm autem Relatio BD ad AB exprimatæ Æquatione, quâ definitur Curvæ natura; hinc erue Fluxionum Relationem, per Probl. I. Deinde cape TB ad BD in eâdem Ratione, in quâ Fluxio ipsius AB est ad Fluxionem BD; & acta TD Curvam tanget in Puncto D.

EXEMP. I.

Si dicantur $AB = x$, & $BD = y$, earumque Relatio exponatur per $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$; erit Fluxionum Relatio $3xxx - 2axx + axy + ayx - 3yyy = 0$; igitur $y:x:: 3xx - 2ax + ay: 3yy - ax:: BD(y): BT$. Quapropter $BT = \frac{3y^3 - axy}{3xx - 2ax + ay}$. Datur autem Punctum D; quare etiam DB, & BA, vel *y*, & *x*; ergo BT magnitudine datur, & hinc Tangens TD determinatur.

Hoc autem pacto concinnior reddi potest operandi Methodus. Propositæ Æquationis Terminos pone æquales nihilo; eos multiplica per numerum Dimensionum Ordinatæ; &, quod hinc conficitur, pone in Numeratore; deinde multiplica Terminos ejusdem Æquationis per numerum Dimensionum Abscissæ, & Productum di-

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

M

visum

divisum per Abscissam pone in Denominatore valoris BT; tunc accipe BT versùs A, si ejus valor est affirmativus, & ad contrarias partes, si negativus.

$$\text{Sic } \overset{0}{x^3} - \overset{0}{axx} + \overset{1}{axy} - \overset{3}{y^3} = 0, \text{ multiplicata per}$$

superiores Numeros dat, $axy - 3y^3$ pro Numeratore, & multiplicata per inferiores Numeros ac divisa per x præbet $3xx - 2ax + ay$ pro Denominatore valoris BT.

Pariter, Æquatio $y^3 - byy - cdy + bcd + dxy = 0$, (quæ exprimit naturam Parabolæ secundi generis, cujus ope CARTESIUS construxit Æquationes sex Dimensionum; Vide ejus Geometriam p. 42. *Amstel. Ed. An. 1659*,) ipso intuitu dat $\frac{3y^3 - 2byy - cdy + dxy}{dy}$,

$$\text{five } \frac{3yy}{d} - \frac{2by}{d} - c + x = \text{BT.}$$

Eadem quoque ratione $ax - \frac{r}{q}xx - yy = 0$, (quæ pertinet ad Ellipsim, cujus centrum est A.) præbet $\frac{-2yy}{\frac{2r}{q}x}$, aut $\frac{qyy}{rx} = \text{BT.}$

& sic de ceteris.

Notare potes, quòd nihil interest quanam sit Angulus, quem Ordinata faciunt cum Abscissa.

Sed Regula hæc se non extendit, neque ad Æquationes affectas Quantitatibus furdis, neque ad Curvas mechanicas; tunc autem confugiendum est ad Methodum, quâ hæc, tanquam fundamento, innititur.

EXEMPLUM II.

Sit Æquatio $x^3 - ayy + \frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay+xx} = 0$, exponens Relationem, quæ est inter AB, & BD, eritque, per Probl. I., Relatio Fluxionum $3xxx - 2ayy + \frac{3abyyy + 2by^3y}{aa + 2ay + yy} - \frac{4ayxx - 6x^3x - axxy}{2\sqrt{ay+xx}} = 0$,
quam

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 91

quamobrem erit $3xx - \frac{4ayx - 6x^3}{2\sqrt{ay + xx}} : 2ay - \frac{3abyy - 2by^3}{aa + 2ay + yy}$
 $+ \frac{axx}{2\sqrt{ay + xx}} :: (\dot{y} : \dot{x} ::) BD : DT.$

EXEMPL. III.

Sit (Fig. 6.) ED Conchois *Nicomedae*, cujus Polus G, Asymptotus TAB. I.
 AT, Intervallum LD; & sit $AG = b$, $LD = c$, $AB = x$, &
 $BD = y$. Similia Triangula DBL, & DMG dant LB: BD:: DM:
 MG, id est, $\sqrt{cc - yy} : y :: x : b + y$, & idcirco $\frac{b+y}{y} \times \sqrt{cc - yy}$
 $= xy$: Hæc Æquatione repertâ, suppono $\sqrt{cc - yy} = z$, unde
 consequor duas Æquationes $bz + yz = xy$, & $cc - yy = zz$, qua-
 rum ope invenio Fluxiones Quantitatum x , y , & z , per Probl. I.
 Prima dat $b\dot{z} + y\dot{z} + z\dot{y} = y\dot{x} + x\dot{y}$; & Secunda — $2y\dot{y} = 2z\dot{z}$,
 aut $z\dot{z} + y\dot{y} = 0$. Ex his autem amove \dot{z} , inventurus — $\frac{by\dot{y}}{z}$
 — $\frac{yy\dot{y}}{z} + z\dot{y} = y\dot{x} + x\dot{y}$; hæc autem Æquatio resoluta dat $y : x$
 — $\frac{yy}{z} - \frac{by}{z} - x :: (\dot{y} : \dot{x} ::) BD : BT$; atqui BD est ipsa y ,
 ergo $BT = z - x - \frac{yy - by}{z}$, scilicet — $BT = AL + \frac{BD \times GM}{BL}$,
 ubi signum — præfixum ipsi BT denotat, quòd Punctum T su-
 mendum est ad partes contrarias Puncto A.

SCHOLIUM

Hinc patet quomodo reperiri valeat in Conchoide Punctum, quod
 separat partem convexam à concavâ. Illud enim erit, cum AT est
 omnium minima. Dic igitur $AT = u$; &, quia $BT = -z + x$
 $+ \frac{by + yy}{z}$, erit $u = -z + 2x + \frac{by + yy}{z}$. Opus brevius red-
 diturus pro x pone $\frac{bz + yz}{y}$, qui valor manat è supra-dictis, &

M 2 habebis

habebis $\frac{2bz}{y} + z + \frac{by+yy}{z} = u$: Unde erui possunt, per Probl. I.,

Fluxiones \dot{u} , \dot{y} , & \dot{z} ; ac, supponendo $\dot{u} = 0$, per Probl. III.,

invenies $\frac{2bz}{y} - \frac{2bzy}{yy} + \dot{z} + \frac{by+2yy}{z} - \frac{byz+zyy}{zz}$

$= \dot{u} = 0$. Denique, substituendo in hac Æquatione $-\frac{yy}{z}$

pro \dot{z} , & $cc - yy$ pro zz , (quos valores jam inveneramus); ac factâ Reductione legitimâ, obtinebis $y^3 + 3byy - 2bcc = 0$, cujus Æquationis Constructio determinabit y vel AM; & MD parallela AB acta per punctum M. cadet in Punctum D Flexûs contrarii.

Quod si Curvæ, ad quas Tangentes ducendæ sunt, forent mechanicæ; Quantitatum Fluxiones inveniri deberent, ut in Exempl. V. Probl. I. & cetera fieri ut supra.

EXEMPL. IV.

TAB. II. Sint (Fig. 7.) AC, & AD duæ Curvæ, quæ secant in Punctis C & D Rectam BCD applicatam Abscissæ AB in dato Angulo. Sint AB = x , BD = y , & $\frac{\text{Area ACB}}{1} = z$; eritque (per Probl. I.

Præpar. ad Exemp. V.) $z = x \times BC$.

Jam, sit AC Circulus vel aliqua ex notis Curvis, & ad determinandam Curvam AD data sit Æquatio involvens x , puta, $2x + axx = y^4$. Ergo, per Probl. I., $2xz + axz + axx = 4y^3\dot{y}$; &, scribendo $x \times BC$ pro z , erit $2xx \times BC + axx \times BC + axx = 4y^3\dot{y}$; quapropter $2x \times BC + ax \times BC + az : 4y^3 :: (\dot{y} : \dot{x} ::) BD : BT$. Igitur, datâ naturâ Curvæ AC, Ordinâtâ BC, & Arâ ACB vel z ; dabitur etiam Punctum T, per quod transit Tangens DT.

Eodem pacto, si $3z = 2y$ est Æquatio pertinens ad Curvam AD, erit $(3x) 3x \times BC = 2\dot{y}$, & ideo $3BC : 2 :: (\dot{y} : \dot{x} ::) BD : BT$; & sic de ceteris.

EXEMPL.

EXEMPL. V.

Sit $AB = x$, $BD = y$, ut prius, & longitudo Curvæ $AC = z$; & actâ Tangente quâvis, ut Ct , erit $Bt : Ct :: x : z$, aut $z = \frac{x \times Ct}{Bt}$.

Nunc altera Curva AD , ad quam Tangens est ducenda, definia-
tur aliquâ datâ Æquatione involvente z ; *ex. gr.*, $z = y$, quocirca
 $z = y$, ergo $Ct : tB :: (y : x ::) DB : BT$. Invento autem Punc-
to T , duci potest Tangens DT .

Pariter, supponendo $xz = yy$, fiet $xz + zx = 2yy$, unde, scri-
bendo $\frac{x \times Ct}{Bt}$ pro z , conficietur $\frac{xx \times Ct}{Bt} + zx = 2yy$, & hinc
 $z + \frac{x \times Ct}{Bt} : 2y :: BD : DT$.

EXEMPL. VI.

Sit (*Fig. 8.*) AC Circulus, aut quæcumque alia Curva cogni- **TAB. II**
ta, cujus Tangens est Ct ; & sit AD alia Curva, cujus Tangens
agi debet, & quæ definitur assumendo AB æqualem Arcui AC ;
Sintque CE , BE Ordinatæ ad AB sub quovis dato Angulo; &
Relatio, quæ est inter BD , & CE vel EA , exprimatur Æqua-
tione aliquâ.

Nunc dic AB vel $AC = x$, $BD = y$, $AE = z$, & $CE = u$.
Liquet, quod u , x , & z , Fluxiones ipsarum CE , AC , & AE , eandem inter
se Rationem habent ac CE , Ct , & Et ; quapropter $\frac{x \times CE}{Ct} = u$,
& $\frac{x \times Et}{Ct} = z$.

Jam, detur Æquatio quævis definiens Curvam AD , puta, $y = z$.
Igitur $y = z$; ergo $Et : tC :: (y : x ::) DB : BT$.

M 3

Aut

Aut data Æquatio sit $y = z + u - x$, unde assequemur $\dot{y} = (\dot{z} + \dot{u} - \dot{x}) \times \frac{CE + Et - tC}{Cs}$, & idcirco $CE + Et - tC : Cs :: (\dot{y} : \dot{x} ::) DB : BT$.

Aut denique detur Æquatio $xy = u^2$, quæ progignet $2xy = (3ux ::) 3ux \times \frac{CE}{Cs}$: Hinc autem conficitur $3ux \times CE : 2xy \times Cs :: DB : BT$.

E X E M P L. VII.

TAB. II. Sit (Fig. 9.) FC Circulus, quem CS tangit in C, & sit FD Curva, quæ definitur assumpta aliquâ Relatione inter Ordinatum DB & Arcum FC terminatum ab AD ductâ per Centrum. Tunc, demissa CE ordinatim ad Circulum, dic AC vel AF = 1, AB = x, BD = y, AE = z, EC = u, & CF = t; hinc habebis $xt = (t \times \frac{EC}{SC} =) \dot{u}$, & $-\dot{u} = (t \times -\frac{ES}{CS} =) \dot{z}$; ubi pono \dot{z} Quantitatem negativam, quia AE decrefcit, crescente EC. Præterea, AE : EC :: AB : BD, ergo $xy = ux$, quocirca, per Probl. I., $zy + yz = ux + xu$; unde exterminatis z , u , & x , provenit $xy - yyt - xxt = yx$.

Definiatur nunc Curva DF aliquâ Æquatione, unde excudi possit valor ipsius t in Æquatione nuper inventâ ponendus. Suppone, ex. gr., $t = y$, (Æquatio ad primam Quadratricem); ergo, per Probl. I., $t = y$, & $xy - yyy - xxy = yx$; quamobrem $y : -x + yy + xx :: (y : -x ::) BD (y) : BT$: Est igitur $BT = xx + yy - x$, & $AT = xx + yy = \frac{ADg}{AT}$.

Haud aliter, si foret $tt = by$, haberemus $2tt = by$, & propterea $AT = \frac{b}{2t} \times \frac{ADg}{AF}$, atque ita porro.

E X E M P L.

E X E M P L. VIII.

Sit (Fig. 10.) nunc AD Recta æqualis Arcui FC, & Curva TAB. H. ADH Spiralis *Archimædææ*, stantibus nominibus, quæ supra Lineis imposuimus. Ob rectum Angulum ABD, est $xx + yy = tt$; & idcirco (per Probl. I.) $xx + yy = tt$. Atqui AD: AC::DB:CE, ergo $tu = y$, & eâ de causâ (per Probl. I.) $tu + ut = j$. Denique, Fluxio Arcus FC est ad Fluxionem rectæ Lineæ CE, ut CA ad AE, vel ut AD ad AB, videlicet $t:u::t:x$; & propterea $xt = tu$: Confer Æquationes nuper inventas, & perspicies esse $ut + xt = j$; quocirca etiam erit $xx + yy = (tt =) \frac{tj}{u+x}$: Ergo, si, completo Parallelogrammo ABDQ, facias DQ:QP:: (DB:BT::j:—x::) $x:y = \frac{t}{u+x}$; id est, si abscindas AP $= \frac{t}{u+x}$, erit PD Perpendicularis Spirali.

Hinc, opinor, satis patet quâ viâ duci possint Tængentes ad omni-
nigenas Curvas. Attamen extra rem non puto ostendere quomodo
Problema solvi possit, quando Curvæ referuntur ad Rectas quocum-
que alio modo: Eo enim pacto, præ manibus habens plures me-
thodos diversas, semper usurpare poteris faciliorem simul, ac sim-
pliciore.

S E C U N D U S M O D U S.

Sit (Fig. 11.) D Punctum in Curvâ, ex quo ad dâtum Punctum TAB. III.
G ducta sit subtensâ DG, & sit DB ordinatim applicata ad Ab-
scissam AB sub dato Angulo quocumque. Jam fluat Punctum D
per infinitè parvum Curvæ spatium Dd, & ex GD, abscindatur
Gk æqualis ipsi Gd, ac compleatur Parallelogrammum dcBb. Tunc
Dk, & Dc erunt eodem tempore genita Momenta ipsarum GD,
DB, quibus nempe utraque mulcatur, dum D transfertur in d.
Jam.

Jam, recta Linea Dd producat, donec fecet ipsam AB in T , & ex Puncto T ad subtenfam GD demittatur ad rectos Angulos TF ; unde formabuntur similia Trapezia $Dcdk$, & $DBTF$; & ideo $BD : DF :: cD : Dk$.

Cum igitur *Æquatio* Curvam determinans exhibeat Relationem, quæ est inter BD & DG , quære Fluxionum Relationem; & abscinde DF quartam post DB , Fluxionem GD , & Fluxionem BD . Dehinc ex F excita Perpendicularem FT , & juncta DT Curvam tanget in D . Erit DF capienda versus G , si ea est affirmativa; & ad contrarias partes, si negativa.

EXEMPLUM I.

Dic $GD = x$ & $DB = y$; ac Relatio earum exponatur per $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$: Relatio Fluxionum erit $3xx\dot{x} - 2ax\dot{x} + ay\dot{x} + ax\dot{y} - 3yy\dot{y} = 0$: Quæ de causâ $3xx - 2ax$

$+ ay : 3yy - ax :: (\dot{y} : \dot{x} ::) DB(y) : DF$; Ergo $DF = \frac{3y^3 - axy}{3xx - 2ax + ay}$.

Jam, cum detur in Curvâ Punctum D , & idcirco BD , & DG , vel y , & x , dabitur etiam Punctum F ; ex quo si educatur Perpendicularis FT , hæc Abscissæ AB occurrens in T , aperiet viam ad ducendam Tangentem TD .

Hinc, ut patet, manat ipsa eadem Regula, quam pro primo casu inveneramus. Nam, dispone omnes datæ *Æquationis* Terminos in unâ eadêmque parte, eos multiplica per Ordinatæ y Dimensiones, &, quod hinc provenit, pone in Fractionis Numeratorem: Deinde singulos hos Terminos duc in Subtenfæ x Dimensiones, Factum divide per Subtenfam x , & Quotientem adscribe Denominatori valoris DF : Illam verò Lineam DF sumes versus G , si affirmativus est ejus valor; sin minus, ad contrarias partes. Hic animadvertere potes, quòd in toto hoc negotio nulla habetur ratio distantiae Puncti G ab Abscissâ AB , (licet nulla esset hæc distantia,) nec Anguli ABD , quem Ordinata BD facit cum Abscissâ BA .

Sit

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 39

Sic Aequatio superior $x^3 - axx + axy - y^3 = 0$ statim dat $axy - 3y^3$ pro Numeratore, & $3xx - 2ax + ay$ pro Denominatore valoris DF.

Sic pariter $x + \frac{b}{a}x - y = 0$ (Aequatio spectans ad conicas Sectiones) praebet $-y$ pro Numeratore, & $\frac{b}{a}$ pro Denominatore valoris DF, ideo futurae $= -\frac{ay}{b}$.

Haec aliter (Fig. 6.) in Conchoide, (in qua Problema solvi TAB. E. potest expeditius quam supra,) ponendo $GA = b$, $LD = c$, $DG = x$, & $BD = y$; erit $BD (y) : DL (c) :: AG (b) : GL (x - c)$; quare $xy - cy = bc$ aut $xy - cy - bc = 0$. Haec Aequatio, juxta Regulam, dat $\frac{xy - cy}{y}$, videlicet $x - c = DF$. Produc igitur GD in F, ita ut sit $DF = LG$; ad F erige Perpendicularem FT, quae occurrat Asymptoto AB in T; acta TD Conchoidem tanget.

Si quando autem compositae aut fardae Quantitates sunt in Aequatione, confugiendum est ad generalem Methodum, nisi malis Aequationem reducere.

EXEMPL. II.

Si (Fig. 11.) Aequatio $b + y \times \sqrt{cc - yy} = xy$ daretur ad exprimendam Relationem, quae inter GD, & DB intercedit; quare Fluxionum Relationes, per Probl. I., ex. gr., suppone $\sqrt{cc - yy} = z$, unde conficiuntur Aequationes $bz + yz = xy$, & $cc - yy = zz$; Hinc inveniuntur Fluxionum Relationes $bz + yz + xz = xy + yx$, & $-2yy = 2zx$. Nunc, exterminatis z & x , habebis $y \sqrt{cc - yy} - \frac{byy + yy}{\sqrt{cc - yy}} - xy = yx$; igitur $y \sqrt{cc - yy} - \frac{byy + yy}{\sqrt{cc - yy}} - x :: (y : x ::) BD (y) : DF$.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

N

TER.

TAB. II. Quinimo (Fig. 12.) si Curva referretur ad duas subtensas AD & DB, quæ ductæ à duobus datis Punctis A, & B, convenirent ad Curvam. Concipe Punctum D fluere in Curvâ per infinitè parvum spatium Dd, & ex AD, ac DB, abscinde Aδ quidem æqualem Ad, & Bc parem Bd; tunc kD & Dc, erunt simul genita Momenta Linearum AD, DB. Quapropter summe FD, quæ ad DB habeat eandem Rationem ac Momentum kD ad Momentum Dc, (id est Fluxio Rectæ AD ad Fluxionem ipsius DB); & age BT, TF Perpendiculares ipsis DB, AD, & sibi mutuò occurrentes in T: similia erunt Trapezia DFTB ac Dkdc, quamobrem Diagonalis DT Curvam tanget.

Igitur ex Æquatione definiente Relationem, quæ est inter AD & DB excude, per Probl. I., Relationem, quæ inter Fluxiones intercedit, & abscinde DF habentem ad DB eandem Rationem.

E X E M P L. I.

Supponamus $AD = x$, & $DB = y$, & earum Relatio sit $a + \frac{ex}{d} - y = 0$. Hæc autem Æquatio spectat ad Ellipses secundi Ordinis, quarum Proprietates pertinentes ad Lucis Refractionem demonstratæ fuerunt à CARTESIO in secundo suæ *Geometria* Libro.

Jam Fluxionum Relatio erit $\frac{ex}{d} - \dot{y} = 0$, quapropter $e : d ::$

($y : x ::$) $BD : DF$.

Eadem ratione, si foret $a - \frac{ex}{d} - y = 0$, haberemus $e : -d :: BD : DF$. In primâ hypothesi sumi deberet DF versùs A, & ad contrarias partes in secundâ.

C O R O L L. I.

Ergo si $d = e$, (tunc autem Curva evaderet Sectio conica,) esset

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 99

effet $FD = DB$; & propterea Triangula DFT , & DBT , equalia essent, & Angulus FDB bisectus à Tangente.

COROLL. II

Hinc etiam sponte fluunt ea, quæ satis operosè demonstravit **CARTESIUS** de Lucis per has Curvas Refractione. Nam, si DT sumatur pro Radio, sunt DF , & DB , (qui sunt in datâ Ratione d ad e ,) sinus Angulorum DTF , & DTB , quos nempe faciunt Radius AD Incidens in superficiem Curvæ, & ejus Reflexus aut Refractus DB . Et similiter est ratiocinandum de Refractione Sectionum conicarum, cum alterutrum ex Punctis A vel B concipitur ad infinitum intervallum.

Facile modificari posset hæc Regula, (ut de superiore facinus, & plura harum modificationum exempla asserre: Quinimo, si quævis aliâ ratione Curvæ referantur ad Rectas, nec facillè ad superiores Relationum modos revocari possint, facile erit, pro re natâ, novas Methodos invenire in allatarum imitationem.

QUARTUS MODUS.

Gyret, (Fig. 14.) ex. gr., recta Linea BCD circa datum Punctum B , & unum ex Punctis ejus D describat Curvam quandam, dum alteram C semper est in communi Sectione Rectæ BCD & alterius Rectæ AC positione datæ. Exprimatur insuper Aequatio aliquâ Relatio, quæ est inter CB , & BD : Age BF Parallelam ipsi AC , eamque produc, donec in F occurrat ipsi FD Perpendiculari ad B : Rursus erige FT ad rectos Angulos ipsi DF ; & inveni FT , quæ ad BC eandem habeat Rationem ac Fluxio DB ad Fluxionem BC . Tanget enim Curvam acta DT .

TAB. III.

QUINTUS MODUS.

Sed si, dato Puncto A , Aequatio exprimeret Relationem inter AC , & BD , agere deberes CG Parallelam ipsi DF , & quærere FT , ita ut ea foret ad BG , ut Fluxio BD est ad Fluxionem AC .

N 2

SEX.

SEXTUS MODUS.

Rurfus, si Aequatio exponeret Relationem inter AC, & CD, conveniant Rectæ AC & FT in H, & sume HT, quæ ad BG eandem habeat Rationem ac Fluxio DC ad Fluxionem CA. Et sic de ceteris.

SEPTIMUS MODUS.

Pro Spiralibus.

Neque aliter perficitur Problema, cum Curvæ referuntur, non ad rectas Lineas, sed ad alias Curvas; quod usu-venit in mechanis Curvis. Sit (Fig. 15.) BG Peripheria Circuli, cujus semidiameter est AG, quæ dum gyrat circa Centrum A, concipiatur Punctum D moveri quovis pacto, dummodo Spiralem aliquam ADE describat; Suppone D esse infinitè exiguam partem Curvæ, per quam fluat D, ac sume $CA = Aa$; eruntque dD & Gg , eodem tempore nata Momenta Rectæ AD & Peripheriæ BG: Quapropter age Aa Parallelam cd , quæ est, ad rectos Angulos ipsi AD, eamque secet in T Tangens TD; tum erit $Dc :: da :: DA : AT$. Rursum sit Gg Parallela Tangenti DT, & habebis $cd :: Gg :: (Ad vel AD :: AG ::) AT : Aa$. Quodcirco, proposita Equatione exprimente Relationem, quæ intercedit inter ipsas BG & AD, quære Relationem, quæ est inter earum Fluxiones, per Probl. I & fac in eadem Ratione Aa ad AG; Juncta Gg erit Tangenti parallela.

EXEMPLUM.

Dictis $BG = x$, & $AD = y$, sit earum Relatio $x^3 = axx + axy - y^3 = 0$: Erit, per Probl. I, $3xx = 2ax + ay : 3yy = ax :: (y : x ::) DA : Aa$: Puncto autem sic invento, age, & G & ipsi parallelam DT, quæ Curvam tangeat.

EXEMPLUM.

E X E M P L. I I.

Si haberetur $\frac{ax}{b} = y$, (quæ est Æquatio ad Spiralem *Archimedeam*,) esset $\frac{ax}{b} = y$, & idcirco $a : b :: (y : x ::)$ DA: At. Unde, obiter, si producat AT in P, ita ut sit PA: AB:: a: b, juncta PD erit Perpendicularis ad Curvam.

E X E M P L. I I I.

Si esset $xx = by$, foret $2xx = by$, & $2x : b ::$ DA: At. Et hoc pacto Tangentes facile duci possunt ad quascumque Spirales.

O C T A V U S. M O D U S.

Pro Quadratricibus.

Si verò Curva esset ejusmodi naturæ, ut quævis Recta AGD (Fig. 16.) acta per Centrum A secaret Arcum Circuli in G & Curvam in D, ac Relatio, quæ est inter Arcum BG, & rectam Lineam DH ordinatim applicatam Basi aut Abscissæ AH sub dato Angulo, definiretur Æquatione quâlibet: Concipe Punctum D moveri in Curvâ per infinitè parvum spatiolum Dd, & complè Parallelogrammum dbHk; dehinc produc Ad ad c, ut cA = AD; eruntque Gg ac Dk, simul generata Momenta Arcûs BG & Ordinatæ DH. Jam, produc Dd rectâ in T, ubi occurret ipsi AB, & hinc educ TF perpendicularem ad DcF: Erunt igitur similia Trapezia Dkdc & DHTF, quocirca kD: Dc:: DH: DF. Quod si præterea ducatur Gf ad rectos Angulos ipsi AG & secans AF in f, erit, (ob Parallelas DF & Gf,) Dc: Gg:: DF: Gf; ergo, ex aqno, Dk: Gg:: DH: Gf, id est, ut Momenta Fluxionum Linearum DH, & BG.

Quære igitur ex Æquatione exponente Relationem BG ad DH Relationem Fluxionum (per Probl. I.); & in eadem Ratione fac

N. 2. Gf.

T A B. III.

Gf, Tangentem scilicet Circuli BG, ad DH; age DF Parallelam *Gf*, quæ secet *Af* productam in F, ad F erige Perpendicularem FT occurrentem ipsi AB in T, & juncta DT tanget Quadraticam.

E X E M P L. L

Faciendo $BG = x$, & $DH = y$, sit $xx = by$, ergo (per Probl. I.) $2xx = by$; quapropter $2x : b :: (y : x ::) DH : Gf$; & Puncto *f* determinato, cetera perficientur ut supra.

Sed hæc Regula potest aliquando sic fortasse elegantior fieri: Fac $x : y :: BA : AL$: Deinde, $AL : AD :: AD : AT$; ac juncta DT Curvam tanget. Nam, æqualia Triangula AFD, ATD dant $AD \times DF = AT \times DH$, &, propterea, $AT : AD :: (DF \text{ vel } \frac{AD}{AG}$

$\times Gf : DH \text{ aut } \frac{y}{x} Gf ::) AD : (\frac{y}{x} AG \text{ five}) AL$.

E X E M P L. II.

Sit $x = y$ (quæ Aequatio ad Veterum Quadraticam pertinet), erit quoque $x = y$: Quocirca $AB : AD :: AD : AT$.

E X E M P L. III.

Sit $xxx = y^3$, ergo $2xxx = 3yyy$: Fac itaque $3yy : 2xx :: (x : y ::) AB : AL$; deinde $AL : AD :: AD : AT$, & sic expedite determinare licet Tangentes ad quascumque alias Quadraticas quantumlibet compositas.

NONUS MODUS.

Denique sit ABF data quævis Curva, quam tangit Recta Bz; & BD pars Rectæ BC, (quæ ordinatim applicata est sub dato quolibet Angulo Abscissæ AC,) intercepta inter hanc datam & aliam Curvam

Curvam DE, ad partem Curvæ AB habeat Relationem aliquam expressam Æquatione quâcumque; ad secundam hanc Curvam duces Tangentem DT, sumendo (in prioris Curvæ Tangente) TB, quæ ad BD habeat eandem Rationem ac Fluxio Curvæ AB ad Fluxionem Rectæ BD.

E X E M P L. I.

Vocatis $AB = x$, & $BD = y$, fit $ax = yy$, & ideo $ax = 2yy$:
Erit $a : 2y :: (y : x ::) BD : BT$.

E X E M P L. II.

Sit $\frac{a}{b} x = y$, (Æquatio ad Trochoïdem si ABF est Circulus,) ergo $\frac{a}{b} \dot{x} = \dot{y}$, & $a : b :: BD : BT$.

Nec difficilius ducentur Tangentes, cum Relatio, quæ est inter BD & AC aut CB, expressa est per Æquationem aliquam, vel quando Curvæ referuntur ad rectas Lineas, sive ad alias quasvis Curvas, quomodocumque demum id fiat.

Aliorum quoque Problematum Solutio deduci potest ex iisdem Principiis. Hujus generis sunt sequentia.

I.

Invenire in Curvâ Punctum, in quo Tangens parallela sit Abscissa, vel cuius alteri Linea recta positione data, aut ad eam perpendicularis, vel obliqua sub Angulo dato.

II.

Invenire Punctum, ubi Tangens est omnium maximè, vel minimè inclinata ad Abscissam, vel ad aliam rectam Lineam positione datam. Videlicet.

Invenire confinia Flexuum contrariorum. Hujus Problematis specimen jam dedimus in Conchoïde.

III. Ex

III

Ex Puncto dato extra Curva Perimetrum ducere Rectam, qua cum Perimetro faciat Angulum Contactus, vel rectum vel quemcumque datum. Scilicet, Ex dato Puncto ducere ad Curvas Tangentem, vel Perpendicularem, vel Rectam quomodocumque inclinam.

IV

Ex Puncto dato intra Parabolam ducere Lineam rectam, facientem cum Perimetro omnium maximum vel minimum Angulum. Et idem facere in Curvis quibuscumque.

V

Rectam ducere, qua tangat duas Curvas positione datas, aut unam eandemque in duobus Punctis; ubi id fieri potest.

VI

Curvam sub Legibus datis describere, qua aliam Curvam positione datam tangat in dato Puncto.

VII

Determinare Refractionem Lucis Radii, qui cadit in quamcumque Curvam Superficiem.

Resolutio horum & similium Problematum adeo difficilis non est (præter Computationis molestiam), ut hic in iis moremur, & bene me Geometris consuluisse puto eorum mentionem solum faciendo.

PROBL. V.

Determinare Quantitatem Curvatura, quam habet data quavis Curva in dato Puncto.

Pauci

Pauca sunt Problemata Curvas spectantia hoc elegantiora, & quæ penitiùs earum naturam detegant. Ad hujus Resolutionem præmitto sequentia generalia.

I

Idem Circulus ubique eandem habet Curvaturam, & in diversis Circulis ea est in reciproca Diametrorum Ratione. Si Diameter unius Circuli subdupla est Diametri Circuli aliùs, Curvatura primi erit dupla Curvaturæ secundi. Si primi Diameter est subtripla Diametri secundi, Curvatura primi erit tripla Curvaturæ secundi, &c.

II

Si Circulus tangat Curvam in ejus parte concavâ ad datam Punctum, & ejusmodi magnitudinis sit, ut nullus alius Circulus tangens, possit describi intra Angulum hujus Contactûs, Circulus ille eandem habebit Curvaturam ac Curva in Contactûs Puncto. Nam, Circulus, qui descriptus esset inter Curvam & alium Circulum per Punctum Contactûs, minùs differret à Curvâ quàm alter Circulus, & magis quàm ille, accederet ad Curvæ illius Curvaturam. Ergo ejus Curvaturæ proximus omnium est Circulus ille, inter quem & Curvam nullus alius Circulus describi potest.

III

Quapropter Centrum Curvaturæ, quam habet Curva in quolibet Puncto, est Centrum Circuli æquè curvi; & ideo Radius vel semidiameter Curvaturæ, est Rectæ perpendicularis ad Curvam pars intercepta inter Curvam & Centrum hoc.

IV

Et Ratio Curvaturæ in diversis Punctis noscetur ex Ratione Curvaturæ Circulorum æquè curvorum ac Curva in Punctis illis, aut ex reciproca Ratione Radii Curvaturæ.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I

O

Igitur

Igitur Problema versatur in hoc, ut reperiatur Radius aut Centrum Curvaturæ.

TAB. III. Quamobrem concipe, quòd (*Fig. 18.*) ad tria Curvæ Puncta d , D , & d actæ sunt Perpendiculares, quarum quæ sunt ad d , & D , conveniunt in H , quæ verò ad D , & d , in h ; ac Punctum D sit inter Puncta d & d : Si Curvatura major est versùs Dd quàm versùs Dd , erit DH minor quàm dh . Sed, quo magis Perpendiculares dH , & dh , accedunt mediæ Perpendiculari DH , eo minus distant Puncta H , & h ; & denique, cum hæ Perpendiculares coeunt, coïncidunt etiam hæc Puncta: Coïncidant igitur in C ; erit illud Curvaturæ Centrum ad Curvæ Punctum D , in quo Perpendiculares consistunt. Quod per se patet.

Sed Punctum illud C plura habet Symptomata vel Proprietates, quæ non inutiles erunt ad illud determinandum.

I.

Ibi conveniunt Perpendiculares, quæ hinc inde sunt ab ipsa DC , & ab illa infinitè parum distant.

I. I.

Illud separat ac distinguit Interfectiones Perpendicularium, quæ utrimque sunt ad finitum & exiguum Intervallum, ita ut eæ, quæ sunt ad partem magis curvam Dd , conveniant supra illud in H , & quæ ad minùs curvam Dd , infra illud in h .

I. I. I.

Si DC moveri intelligatur, & semper tamen sit Perpendicularis ad Curvam, ejus Punctum C , (excepto motu, quo accedit vel recedit à Puncto Insistentiæ C ,) omnium minimè movetur, quin est quasi Centrum Motûs.

IV. Si

I V.

Si Centro C & Radio CD Circulus describatur, nullus alius Circulus agi potest per Punctum Contactus inter hunc & Curvam.

V.

Denique, si Centrum H aut *h* alterius Circuli tangentis, gradatim accedat ad illius Centrum C, donec tandem cum eo coeat, tunc quodcumque Punctum, in quo hic Circulus Curvam fecat, coincidet cum D Puncto Contactus.

Hæ Proprietates singulæ aperire possunt viam ad Problema pluribus modis solvendum: Nos autem ex his primam eligemus, velut simpliciores.

Ad quodcumque (Fig. 19.) Curvæ Punctum D agantur DT TAB. III.
Tangens, & DC Perpendicularis; & Sit C Centrum Curvaturæ, ut antea. Præterea, sit AB Abscissa, cui BD applicatur ad rectos Angulos, & quam DC fecat in P. Age DG parallelam AB, & GC ei perpendicularem, ex quâ abscinde Cg cujufvis datæ magnitudinis, & ad eam age perpendicularem $g\delta$, quæ fecet ipsam CD in δ . Tunc erit $Cg : g\delta :: (BT : BD ::)$ Fluxio Abscissæ ad Fluxionem Ordinatæ. Pariter, intellige Punctum D infinitè parum progredi in Curvâ usque ad δ ; & actâ de ad rectos Angulos ipsi DG, ac C δ perpendiculari ad Curvam, C δ fecet DG in F, & $g\delta$ in f . Erunt D e Momentum Abscissæ, de Momentum Ordinatæ, & δf eodem tempore subortum Momentum Rectæ $g\delta$. Quapropter $DF = D\epsilon + \frac{de \times de}{D\epsilon}$. Cum igitur habeas Rationes horum Momentorum, aut, (quod idem est,) Fluxionum Momenta hæc generantium, habebis Rationem ipsius CG ad datam Lineam Cg, (quæ eadem est ac Ratio ipsius DF ad δf), & hinc determinabitur Punctum C.

Sit igitur $AB = x$, $BD = y$, $Cg = 1$, & $g\delta = z$; erit $1 : z :: x : y$, aut $z = \frac{y}{x}$. Jam δf Momentum ipsius z sit $o \times z$, (id

est Factum ex Velocitate in infinitè exiguam Quantitatem o ,) erunt
 ideo Momenta $De = o \times \dot{x}$, $d'e = o \times \dot{y}$, & idcirco $DF = o\ddot{x}$
 $+ \frac{o\ddot{y}}{x}$: Quà de causà est $Cg(1)$: $CG :: (df:DF)::o\dot{x}: o\ddot{x}$
 $+ \frac{o\ddot{y}}{x}$; id est, $CG = \frac{\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y}}{x\dot{x}}$.

Et quia licet ex arbitrio tribuere quamcumque Velocitatem Flu-
 xioni Abscissæ \dot{x} , (ad quam, tanquam ad æquabilem Fluxionem,
 ceteræ possunt referri) fac $\dot{x} = 1$, & idcirco $\dot{y} = z$, & CG
 $= \frac{1 + z^2}{z}$, ergo $GD = \frac{z + z^3}{z}$, & $DC = \frac{1 + z^2 \times \sqrt{1 + z^2}}{z}$.

Proposità igitur Æquatione, quæ contineat Relationem inter DB
 & BA , ad Curvam definiendam, primò quære Relationem, quæ
 est inter \dot{x} , & \dot{y} , per Probl. I., & eodem tempore pone 1 pro \dot{x} ,
 & z pro \dot{y} . Deinde ex Æquatione hinc proveniente, per idem
 Probl. I.; excude Relationem inter \dot{x} , \dot{y} , & z , & simul substitue 1
 pro \dot{x} , & z pro \dot{y} , ut antea. Hòc pacto prima Operatio dabit va-
 lorem ipsius z , & secunda \ddot{z} ; quibus inventis, produc BD in H ,
 concavam Curvæ partem versùs, ita ut $DH = \frac{1 + z^2}{z}$; & age
 HC parallelam AB , quæ secet Perpendicularem CD in C ; erit C Cen-
 trum Curvaturæ, quâ Curva gaudet in D . Vel, quia est $1 + z^2$
 $= \frac{PT}{BT}$, sume $DH = \frac{PT}{z \times BT}$, aut $DC = \frac{DP^2}{z \times DB^2}$.

E X E M P L. I.

Sic Æquatione $ax + bxx - yy = 0$ proposità, (quæ est ad
 Hyperbolam, cujus Latus rectum est a , transversum autem $\frac{a}{b}$,),
 habebi-

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 109

Habebimus (per Probl. I.) $a + 2bx - 2zy = 0$, (ponendo scilicet 1 pro x , & z pro y in Aequatione proveniente, quæ ceteroquin esset $ax + 2bx^2 - 2yy = 0$), & hinc iterum exsurgit $2b - 2xz - 2yz = 0$, (rursus 1 & z scriptis pro x & y), Ex primâ reperiens $z = \frac{a + 2bx}{2y}$, & ex alterâ $z = \frac{b - zz}{y}$. Quapropter, aliquo Puncto D in Curvâ dato, & propterea datis x & y , hinc dabuntur z & z ; quibus cognitis, abscinde CG vel DH $= \frac{1 + zz}{z}$, & age HC.

Si in Numeris ponas $a = 3$, & $b = 1$ ita ut $3x + xx = yy$, exprimat naturam Hyperbolæ. Et si assumas $x = 1$, erit $y = 2$, $z = \frac{5}{4}$, $z = -\frac{9}{32}$, & DH $= -9\frac{1}{9}$. Jam, reperto Puncto H, educ Perpendicularem HC, quæ secet Perpendicularem CD, antea ductam, aut (quod idem est) fac DH : HC :: (1 : z ::) 1 : $\frac{5}{4}$, eritque juncta CD Radius Curvaturæ.

Cùm arbitraris Computationem non nimis perplexam futuram, substituere potes indefinitos valores ipsarum x , & z , in $\frac{1 + zz}{z}$, quæ exponit valorem ipsius CG. Hoc pacto in præsentî Exemplo habebis per debitam Reductionem DH $= y + \frac{4y^3 + 4by^3}{aa}$. Tamen valor ipsius DH à computatione præbetur negativus, ut videre potes in Exemplo Numerali. Quod negotium solum indicat ipsam DH capiendam esse B versus; Si enim valor ipse foret affirmativus, Recta illa sumenda esset contrarias partes versus.

C O R O L L. I.

Hinc; Si signum præfixum symbolo $+$ b mutetur, ut fiat $ax - bxx - yy = 0$, (Æquatio ad Ellipsim,) hinc assequeremur:

$$DH = \frac{4y^3 - 4by^3}{aa} + y.$$

C O R O L L.

COROLL. II.

Sed si $b = 0$, quo pacto Æquatio evaderet $ax - yy = 0$, (quæ spectat ad Parabolam,) tunc DH esset $= y + \frac{4y^3}{ax}$, & hinc DG $= \frac{1}{2}x + 2x$.

COROLL. III.

Ex his expressionibus facilè confici potest, quòd Radius Curvature pro quâlibet Sectione conicâ semper est $\frac{4DP^3}{aa}$.

EXEMPL. II.

Si daretur $x^3 = ayy - xyy$, (quæ Æquatio pertinet ad Cissoïdem DIOCLESIS;) per Probl. I., esset primò $3xx = 2azy - 2xzy - yy$, & deinde $6x = 2ayx + 2axx - 2zy - 2xyz - 2xxz - 2xy$, ergo $z = \frac{3xx + yy}{2ay - 2xy}$, & $\dot{z} = \frac{3x - azz + xzz + 2zy}{ay - xy}$.

Quocirca, dato aliquo Puncto in Cissoïde, & propterea datis x & y , dabuntur quoque z & \dot{z} ; quibus cognitis, abscinde $CG = \frac{x + zz}{2}$.

EXEMPL. III.

Si $\overline{b+y} \times \sqrt{cc-yy} = xy$, (quam Æquationem spectare ad Conchoïdem jam invenimus, pag. 91. hujus,) fac $\sqrt{cc-yy} = u$, unde orietur $bu + uy = xy$. Nunc harum Æquationum prima, (videlicet $cc - yy = uu$,) dat (per Probl. I.) $-2yy = 2uu = -2yz$, (scribendo z pro y), altera verò præbet $bu + yu + zu = y + xz$. Hæ Æquationes rectè dispositæ determinabunt u & z :
Ut

Ut autem inveniatur etiam z , extrema ex ultimâ Æquatione Fluxionem u , substituendo $-\frac{yz}{u}$, unde fiet $-\frac{byz}{u} - \frac{yyz}{u} + uz = y + xz$, Æquatio, quæ solas complectitur Quantitates fluentes absque Fluxionibus, ut requirit Solutio primi Problematis. Quapropter hinc, per Probl. I., habebis $-\frac{bzz}{u} - \frac{byz}{u} + \frac{byzu}{uu} - \frac{2yzz}{u}$

$-\frac{yyz}{u} + \frac{yyzu}{uu} + uz + zu = 2z + xz$. Hæc autem Æquatio re-

ducta & in ordinem disposita dabit z : Datis autem x & z ; sume

$$GC = \frac{1 + zz}{z}$$

Si hanc Æquationem ultimam divisisses solum per z , tunc, per Probl. I., habuisses $-\frac{bz}{u} + \frac{byu}{uu} - \frac{2yz}{u} + \frac{yyu}{uu} + u = z - \frac{yz}{zz}$, quæ Æquatio definiens z , simplicior fuisset illa quam inveneramus.

Hoc Exemplum tradidi; ut videre posses quomodo perficienda est Operatio, cum dantur Æquationes implicatæ Quantitatibus surdis: Alioquin Curvatura Conchoïdis inveniri posset breviori ratione, sic: Partes Æquationis $b + y \times \sqrt{cc - yy} = xy$ quadratæ & divi-

sæ per yy , præbent $\frac{bcc}{yy} + \frac{2bcc + cc}{y} - bb - 2by - yy = xx$; ergo,

per Probl. I., $-\frac{2bbccz}{y^3} - \frac{2bccz}{yy} - 2bz - 2yz = 2x$, vel

$-\frac{bbcc}{y^3} - \frac{bcc}{yy} - b - y = \frac{x}{z}$; & hinc, rursus per Probl. I.,

$\frac{3bbccz}{y^4} + \frac{2bccz}{y^3} - x = \frac{1}{z} - \frac{xz}{zz}$. Per quarum primam determi-

natur z ; & x per secundam.

Exemplum.

EXEMPLUM IV.

TAB. IV. Sit (Fig. 20.) ADF Trochois, (vel Cyclois,) pertinens ad Circulum ALE, cujus Diameter est AE; & posito quòd Ordinata BD Circulo occurrat in L, dic AE = a , AB = x , BL = u , BD = y , & Arcum AL = s , ac Fluxionem ejusdem Arcus = \dot{s} . Et primò, (ductà femidiametro PL,) erit Fluxio Baseos aut Abscissæ AB ad Fluxionem Arcus AL, ut BL ad LP, id est, \dot{x} vel $1 : \dot{s} :: u : \frac{1}{2}a$; igitur $\frac{a}{2u} = \dot{s}$. Jam, ex Circuli naturâ, est $ax - xx = uu$, & idcirco, per Probl. I., $a - 2x = 2u\dot{u}$, vel $\frac{a - 2x}{2u} = \dot{u}$.

Præterea, ob Trochoïdis naturam, est LD æqualis Arcui LA, id est, $u + s = y$: Unde (per Probl. I.) $\dot{u} + \dot{s} = \dot{y}$: Denique, pro Fluxionibus \dot{s} & \dot{u} scribe earum valores, & obtinebis $\frac{a - x}{u} = \dot{y}$: Et hinc (per Probl. I.) erues $-\frac{a\dot{u}}{uu} + \frac{x\dot{u}}{uu} - \frac{1}{u} = \dot{y}$. Quibus inventis abscinde $-DH = \frac{1 + 2z}{2}$, & age Perpendicularem HC.

COROLL. I.

Hinc sequitur, quòd DH = 2BL, & HC = 2BE, aut, quòd EF bifecat CD Radium Curvaturæ in N. Quod patebit substituendo valores ipsarum x & z , nuper inventos in Æquatione $\frac{1 + 2z}{2} = DH$, & aptè reducendo quod hinc conficitur.

COROLL. II.

Quamobrem, Curva FCK indefinite descripta à Centro Curvaturæ

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 113

turæ ipsius ADF est altera Trochoïdis huic æqualis, cujus Vertices ad I & F tangunt hujus Cuspides. Sit enim Circulus Fλ æqualis Circulo ALE & similiter positus; & Cβ parallela ipsi EF ducatur occurrens Circulo in λ, erit Arcus Fλ æqualis (Arcui EL, qui æquat Rectam FN, quæ est æqualis.) Cλ

C O R O L L. III.

Recta eadem CD, quæ ad rectos Angulos insitit Trochoïdi IAT, tangit Trochoïdem IKF in Puncto C.

C O R O L L. IV.

Hinc, si (in inyeris Trochoïdibus) Cuspidi K superioris Trochoïdis appendatur pondus filo ad intervallum KA vel 2EA, & filum supponatur semet, (dum pondus oscillat,) applicare partibus Trochoïdis FK, & KI, quæ hinc inde prohibent ne filum extendatur in recta Linea, sed illud compellunt, (simul ac à Perpendiculari discessit,) ad se gradatim inflectendum sursum & ad mutuandam Trochoïdis figuram, dum ejus inferior pars CD infra ultimum Punctum Contactus semper manet in Linea recta, pondus hoc movebitur in Perimetro Trochoïdis inferioris; est enim filum ei semper ad rectos Angulos.

C O R O L L. V.

Ergo tota Longitudo fili KA æqualis est Perimetro Trochoïdis KCF, ejusque pars CD æqualis ipsi CF parti hujus Perimetri.

C O R O L L. VI.

Quia filum oscillans movetur circa Punctum mobile C, tanquam circa Centrum; superficies, quam tota Linea CD indefinenter percurrit, est ad superficiem, quam pars CN supra Rectam IF peragrat per idem Tempus, ut CD ad CN, sicut CN ad 3. Est ergo Area

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

P

Area

Area CFN subquadrupla Area CFD, & Area KCNE subquadrupla Area AKCD.

C O R O L L A R I U M VII.

Item, quia Subtensa EL æqualis est & parallela ipsi CN, & convertitur circa immobile Centrum E, ad amissim, ut CN convertitur circa mobile Centrum C, Superficies, quas eodem Tempore ambæ describunt, æquales erunt, id est, Area CFN æquabit Circuli segmentum EL. Quocirca Area NFD æquabit ter segmentum illud, & tota Area EADF erit tripla semicirculi.

C O R O L L A R I U M VIII.

Cum pondus D pervenit ad Punctum F, totum filum circumvolutum fuit Trochoidis Perimetro KCF, & Radius Curvaturæ in nihilum evanuit. Quapropter Trochois IAF ad Cuspidem F magis curva est, quam Circulus quilibet, & cum Tangente FB producta, facit Angulum Contactus infinitè majorem illo quem Circulus quivis facere potest cum recta Linea.

Sed dantur Anguli Contactus qui sunt infinitè majores, quam quilibet ex iis, quos facit Trochois, & alii rursus his infinitè majores, & sic in infinitum; attamen eorum maximus infinitè minor est Angulis Rectilineis. Sic $xx = ay$, $x^2 = byy$, $x^4 = cy^2$, $x^5 = dy^4$, &c., expriment Seriem Curvarum, quarum singulæ successivè faciunt cum Abscissa Angulos Contactus infinitè majores omnibus iis, quos Curvæ præcedentes facere possunt cum eadem Abscissa. Anguli autem Contactus, quos prima Curva exposita per Equationem $xx = ay$ facit, sunt ejusdem generis ac Circulares; & quos secunda $x^2 = byy$ sunt ejusdem generis ac Trochoïdales. Ac, tametsi Anguli Curvarum posteriorum semper infinitè excedant Angulos præcedentium, tamen nunquam pervenire possunt ad magnitudinem Anguli rectilinei.

Eodem pacto Equationes $x = ay$, $x^2 = byy$, $x^3 = cy^3$, &c. denotant Seriem Linearum, quarum subsequentes sequuntur.

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN.

clunt ad vertices cum Abscissis Angulos infinite minores, iis quos faciunt precedentes. Et quidem possunt inter Angulos Contactus, quos faciunt duo ex his Curvarum generibus, fieri alii Anguli Contactus ad infinitum, quorum alii aliis infinite maiores sint.

Jam patet, quod Anguli Contactus unius generis sunt infinite majores, quam Anguli cujusvis alterius generis; quoniam Curva unius generis, quantumvis magna ea sit, transire nequit per Punctum Contactus inter Tangentem & Curvam alterius generis quantumvis exigua ea sit. Aut Angulus Contactus unius generis necessario nequit continere Angulum Contactus alterius generis, ut totum partem continet. Sic, Angulus Contactus Curvæ $x^2 = cy^3$, aut Angulus, quem ea facit cum Abscissa, necessario includit Angulum Contactus Curvæ $x^3 = byy$, & nunquam in illo contineri potest: Nam Anguli, qui sese mutuò possunt excedere, sunt ejusdem generis; ut accidit supra dictis Angulis Trochoïdis, & Curvæ, cujus natura exponitur per Equationem $x^3 = byy$.

Et hinc apparet, quod Curvæ possunt in aliquibus Punctis esse infinite magis rectæ, vel infinite magis curvæ, quam Circulus quilibet, tametsi non ideo amittant formam Curvarum. Sed hæc tantum obiter.

EXEMPL. V.

Sit (Fig. 21.) ED Quadratrix Circuli descripti Centro A; & TAB. III. demissa DB perpendiculari ad AE; pone $AB = x$, $BD = y$, & $AE = 1$. Tunc erit $xy - yyy - xx^2 = yx$, ut antea. Jam scribe, 1 pro x , & z pro y , & Aequatio evadet $xx - yyy - xxz = y$; & hinc, per Probl. I; habebis $zx + xx - yyy - 2xyy - xxx - 2zxx = y$. Hinc autem, reducendo & rursus ponendo 1 pro x , & z pro y , erues $z = \frac{22z + 22x}{x - xx - yy}$. Et, cum jam inveneris z , & x , fac $\frac{1 + 2z}{2} = DH$, & age HC, ut supra.

Si quæris Problematis Constructionem, eam valdè expeditam invenies. Age D P ad rectos Angulos ipsi D T, & quæ secet in P ipsam A T, & fac $2 A P : A E :: P T : C H$. Est enim $z = \left(\frac{y}{x - x x - y y} \right) =$

$$\frac{B D}{B T} \text{, \& } z y = \frac{B D q}{B T} = \frac{1}{2} B P, \text{ ac } z y + x = \frac{1}{2} A P,$$

$$\text{atque } \frac{2 z}{x - x x - y y} \text{ in } z y + x = \frac{2 B D}{A E \times B T q} \text{ in } \frac{1}{2} A P = z.$$

$$\text{Præterea, est } 1 + z z = \frac{P T}{B T}, \text{ (est enim } 1 + \frac{B D q}{B T q} = \frac{D T q}{B T q} \text{),}$$

$$\text{\& propterea } \frac{1 + z z}{2} = \frac{B T \times A E \times B T}{2 B D \times A P} = D H. \text{ Denique est } B T :$$

$$B D :: D H : H C = \frac{P T \times A E}{2 A P}. \text{ Ubi negativus valor tantùm ostendit, quòd } C H \text{ sumi debet ex } D H \text{ ad easdem partes ac } A B.$$

Eadem ratione determinari potest brevissimâ Computatione, Curvatura Spiralium, & aliarum Curvarum quarumcumque.

Quinimò hæc Methodus, (ut jam supra fecimus pro Tangentibus ducendis,) accomodari potest ad determinandam sine præviâ Reductione Curvaturam, quando Curvæ referuntur ad Rectas quovis alio pacto. Sed, quia omnes Curvæ, tùm geometricæ tùm etiam mechanicæ, (præcipuè cùm leges definientes expressæ sunt per Æquationes infinitas, ut infra monstrabimus,) referri possunt ad Ordinatas perpendiculares, ideò me satis de hâc re dixisse puto.

Quæ præterea desiderari possent, faciliè quisque proprio ingenio supplere potest; præsertim, postquam ad melius hoc argumentum illustrandum, addidero Methodum pro spiralibus.

TAB. IV. Sit (Fig. 22.) B K Circulus, A ejus Centrum, & B Punctum datum in Peripheriâ. Sit A D d' Spiralis quælibet, D C ei ad rectos Angulos, & C Centrum Curvaturæ in Puncto D : Actâ Rectâ A D K, duc C G ei parallelam & æqualem, & insuper Perpendicularem G F, quæ secet ipsam C D in F. Dic A B vel A K = 1 = C G, B K = x, A D = y, & G F = z. Jam concipe Punctum D progredi in Spirale per infinitè exiguum Spatium D d; deinde per d age Semidiametrum A k, ac per C Rectam C g Semidiametro A k parallelam & æqualem, ac g f ipsi g C ad rectos Angulos. Juncta autem

antem Cd fecet gf in f & GF in P ; produc GF in ϕ , ita ut sit $G\phi = gf$, & age de perpendicularem ad AK , quam produces donec secet CD in I . Jam eodem tempore genita Momenta ipsarum BK , AD , & $G\phi$ erunt Kk , De , & $F\phi$; quæ idcirco vocanda sunt ox , oy , & oz .

Nunc est $AK : Ae (AD) :: Kk : de = oy$, ubi assumo $x = 1$, ut antea. Pariter $CG : GF :: de : eD = oyz$, & idcirco $yz = y$. Præterea, $CG : CF :: de : dD = oy \times CF :: Dd : dI = oy \times CF q$. Infuper, quia Angulus $PC\phi$, (æqualis Angulo GCg ,) æquat Angulum DAd ; & Angulus $CP\phi$, (par Angulo CDI , æquali Angulis edD & Recto simul,) æquat Angulum ADd ; Triangula $CP\phi$ & ADd similia sunt, ergo $AD : Dd :: CP : (CF) : P\phi = o \times CF q$. Hinc aufer $F\phi$, & restabit $FP = o \times CF q - o \times z$. Denique, demissa CH perpendiculari ad AD ,

est $FP : dI :: CG : eH$ vel $HD = \frac{y \times CF q}{CF q - z}$, aut, substituendo

$1 + zz$ pro $CF q$, inuenies $DH = \frac{y + yzz}{1 + zz - z}$. Ubi observandum est, quòd, in hoc Computationis genere, pro æqualibus summo Quantitates, quarum, (velut hinc ipsarum AD & Ae ,) Ratio infinitè parum differt ab Æqualitatis Ratione.

Hinc autem manat sequens Regula. Cum habes Æquatione expressam Relationem ipsarum x & y , quære Relationem Fluxionum \dot{x} & \dot{y} (per Probl. I.), & pone 1 pro \dot{x} & $y z$ pro \dot{y} : Deinde ex Æquatione sic inventa rursus (per Probl. I.) erue Relationem inter \dot{x} , \dot{y} , & z , atque iterum scribe \dot{x} pro x : Quod primò conficitur,

per debitam Reductionem dabit \dot{y} & z ; &, quod secundo fit, dabit z ; quibus cognitis, sume $DH = \frac{y + yzz}{1 + zz - z}$; & educ Per-

pendicularem HC , quæ occurrit in C ipsi DC Perpendiculari ad Spiralem antea ductæ, eritque C Centrum Curvaturæ. Vel, (quod eodem recidit,) fac $CH : HD :: z : 1$, & age CD .

EXEMPLUM I.

Sit Aequatio $ax = y$, (quæ pertinet ad Spiralem *Archimedeam*),
erit (per Probl. I.) $ax = y$, aut, (scriptis x pro x , & yz pro y),
 $a = yz$. Et hinc rursus (per Probl. I.) $0 = z^2 + yz$: Quapropter
dato in Spirali quovis Puncto D, & ideo Rectâ AD vel y datâ
magnitudine, dabuntur etiam $z = \frac{a}{y}$, & $z = \left(-\frac{zy}{y} \right)$ aut
 $-\frac{a^2}{y}$: Quibus cognitis, fac $1 + zz = z : 1 + zz :: AD(y) :$
DH; & $1 : z :: DH : HC$.

Hinc sponte finit Constructio hæc. Produc AB in Q, ita ut sit
AB ad Arcum BK, ut Arcus BK ad BQ, & fac AB + AQ:
AQ :: AD : DH :: a : HC.

EXEMPLUM II.

Si $axx = y^3$ esset Aequatio determinans Relationem, quæ est
inter BK & AD, haberes (per Probl. I.) $2axx = 3yyy$, aut $2ax$,
 $= 3y^2z$, & hinc rursus $2ax = 3y^2z + 9xyyy$; est igitur $z =$
 $\frac{2ax}{3y^2}$, & $z = \frac{2a - 9zzy^3}{3y^2}$: His autem cognitis, fac $1 + zz$
 $= z : 1 + zz :: AD : DH$. Sive, opere ad optimam formam
reducto, fac $9xx + 10 : 9xx + 4 :: AD : DH$.

EXEMPLUM III.

Eodem pacto, si Relatio ipsarum BK, AD definiretur Aequatione
 $axx - bxy = y^3$, invenires $\frac{2ax - by}{bxy + 3y^3} = z$, & $\frac{2a - 2bzy - b^2xy - 9zy^3}{bxy + 3y^3}$
 $= z$. Unde DH, & deinde Punctum C determinabuntur, ut
suprà.

Et hæc ratione facile determinabitur Curvatura quarumlibet alia-
rum

tum Spiralium; aut inveniuntur Regulæ pro quibuscumque aliis Curvarum generibus, ad imitationem Regularum quas hætenus tradidimus.

Jamque perfecimus Problema hoc; sed, cum usi simus Methodo satis diversâ à vulgaribus Methodis, & cum Problema ipsum sit ex iis, quæ rariusculè apud Geometras occurrunt, me rem supervacaneam facturum non existimo, si ad illustrandam & confirmandam Solutionem allatam, tradam Specimen alterius; quæ magis obvia est, & minùs differt à vulgari Tangentium ducendarum Methodo.

Concipiatur etgo Circulus descriptus quovis Centro; & quovis Radio, ita ut ille Curvam secet in pluribus Punctis; Circulus ille, si contrahi aut dilatari intelligatur, donec duo ex his intersectionis Punctis coïncidant, ibi tanget Curvam. Et præterea, si ejus Centrum supponatur accedere ad Punctum Contactûs, aut ab eo recedere ut tertium intersectionis Punctum coeat cum primo in ipso Contactûs Puncto; Circulus ille erit æquè curvus ac Curva in eodem Contactûs Puncto, ut innui in ultimâ ex quinque Centri Curvaturæ Proprietatibus supra allatis, & quarum quamlibet asserui viam aperire ad diversimodè Problema solvendum.

Quapropter (Fig. 23.) Centro E , Radio CD , describatur Circulus secans Curvam in Punctis d , D , & δ ; & demissis Perpendicularibus db , DB , $\delta\beta$, ac CF ad Abscissam AB . Dic $AB = x$, $BD = y$, $AF = u$, $FC = t$, & $CD = s$. Tunc erunt $BF = u - x$, & $BD + FC = y + t$. Summa Quadratorum ex his æquat Quadratum ex DC , id est, $uu - 2ux + xx + yy + 2ty + tt = ss$; quam expressionem breviorè si reddere velis, pone $uu + tt = qq$ (symbolo ad arbitrium sumpto), & Aequatio superior fiet $xx - 2ux + yy + 2ty + qq = 0$. Nunc, postquam determinaveris t , u , & qq , habebis $s = \sqrt{uu + tt - qq}$.

Jam proponatur Aequatio quæcumque ad definiendam Curvam, ejus Curvatura petitur. Hujus Aequationis opè/potè ad arbitrium exterminare alterutram ex Quantitatibus x & y , & hinc prodibit Aequatio, cujus Radices, (db , DB , $\delta\beta$; si extermines x ; & Ab , AB , $A\beta$; si extermines y ;) sunt, ad intersectionis Puncta d , D , δ , &c. Harum tres cum æquales evadunt, Circulus Curvam tangit, & præterea eundem habet Curvaturæ gradum ac Curva in Con-

TAB. IV.

Contactus Puncto. Tres autem Radices æquales fient, si conferas hanc Æquationem cum alterâ fictitiâ eundem Dimensionum numerum & tres Radices æquales habente, ut jam CARTESIUS monstravit. Aut expeditius, si bis multiplices ejus Terminos per aliquam arithmeticam Progressionem.

E X E M P L U M.

Sit Æquatio $ax = yy$, (quæ est ad Parabolam). Exterminato x (id est, posito in superiore Æquatione pro x ejus valore $\frac{yy}{a}$), consequeris aliam hinc infra positam, cujus Radices tres y restant æquales reddendæ. Ad quod perficiendum multiplico bis ejus Terminos, per Progressionem aliquam arithmeticam, ut hinc factum vides.

$$\frac{y^4}{aa} * - \frac{2u}{a} yy + 2yy + yy = 0$$

$$\begin{array}{rccccccc} 4 & * & 2 & & 1 & & 0 \\ 3 & * & 1 & & 0 & - & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Hinc assequor } \frac{12y^4}{aa} - \frac{4u}{a} yy + 2yy = 0$$

$$\text{aut } u = \frac{3yy}{a} + \frac{1}{2} a, \text{ unde facile infertur, quod } BF = 2x + \frac{1}{2} a, \text{ ut antea.}$$

Dato igitur Puncto aliquo D in Parabolâ, age DP perpendicularem ad Curvam, & sume in Axe $PF = 2AB$, erige FC ad rectos Angulos ipsi AF, quæ occurrat DP in C; erit C petatum Curvaturæ Centrum.

Idem perfici potest in Ellipsi & Hyperbolâ, sed computatio erit satis perphæra, & in genere, pro aliis Curvis valde molesta.

De

De Quaestionibus qua habent affinitatem quamdam cum Superiore Problemate.

Ex Resolutione superioris Problematis nonnulla alia possunt enodari, talia sunt.

I.

Invenire punctum, in quo Curva datum habet Curvatura gradum.

Quærat, ex. gr., in Parabolâ $ax = yy$ punctum, in quo Radius Curvaturæ sit datæ longitudinis f : Invento, ut supra, Centro Curvaturæ, determinabis Radium, quem invenies $= \frac{a + 4x}{2a} \times \sqrt{aa + 4ax}$; debet autem esse $= f$, ergo per Reductionem erit $x = -\frac{1}{4}a + \sqrt[3]{\frac{1}{16}aff}$.

II.

Invenire punctum Rectitudinis.

Punctum *Rectitudinis* voco illud, in quo Radius Curvaturæ est infinitus, aut ejus Centrum ad infinitum intervallum. Hoc accidit ad Verticem Parabolæ $a^3x = y^4$. Illud idem punctum plerumque est Limes Flexûs contrarii, cujus determinationem supra tradidimus; sed alia determinatio nec inelegans deduci potest ex hoc Problemate; scilicet: Quo major fit Radius Curvaturæ, eo minor (Fig. 19.) evadit Angulus DCd , & simul Momentum δf ; ita ut Fluxio Quantitatis z minuatur cum illo, & cum Radius est infinitus, omnino evanescat. Quapropter quære Fluxionem z , & eam pone æqualem nihilo.

P. A. B. III.

Ut, si velles determinare Limitem Flexûs contrarii in Parabolâ secundi generis, cujus ope CARTESIUS construit Æquationes sex
J. Newtoni Opuscula, Tom. I. Q Dimen-

Dimensionum. Aequatio autem ad hanc Curvam est $x^3 - 6xx - cdx + bcd + dxy = 0$. Hinc (per Probl. I.) oritur $3xxx - 2bxx - cdx + dxy + dxy = 0$, quæ Aequatio, (scribendo 1 pro x , & z pro y ,) evadit $3xx - 2bx - cd + dy + dxz = 0$; unde rursus (per Probl. I.) $6xx - 2bx + dy + dzx + dxz = 0$; hic iterum pone 1 pro x & z pro y & e pro z , & habebis $6x - 2b + 2dx = 0$: Scribe in Aequatione $3xx - 2bx - cd + dy + dxz = 0$ pro dx ejus valorem $3x - b$, reperiens $-bx - cd + dy = 0$, aut $y = c + \frac{bx}{d}$; qui valor, positus pro y in Aequatione ad Curvam, præbebit $x^3 + bcd = 0$, unde Limes Flexus contrarii, definietur.

Eodem pacto determinari possunt puncta Rectitudinis, quando non sunt inter partes contrariè flexas. Exprimat Aequatio $x^4 - 4ax^3 + 6aaxx - b^3y = 0$ naturam Curvæ. Hinc habebis (per Probl. I.) $4x^3 - 12axx + 12aax - b^3z = 0$; & hinc rursus

$12xx - 24ax + 12aa - b^3z = 0$. Jam suppono $z = 0$, &

TAB. IV. per Reductionem assequor $x = a$. Abscindo igitur (Fig. 24.) $AB = a$, & erigo Perpendicularem BD , quæ Curvæ occurret in D , Puncto Rectitudinis, ut petebatur.

I. I. I.

Invenire Punctum Curvaturæ infinitæ.

Quare Radium Curvaturæ, eumque pone æqualem nihilo. Sic, in Parabolâ secundi generis, cujus Aequatio est $x^3 = ayy$, Radius est $CD = \frac{4a + 9x}{6a} \times \sqrt{4ax + 9xx}$, qui in nihilum evanescit, quando $x = 0$.

I.V. De.

I V.

Determinare Punctum maxima, vel minima Curvaturæ.

In hisce Punctis Radius evadit omnium maximus, vel minimus; quapropter Centrum Curvaturæ in illo temporis momento, neque ad punctum Contactus accedit, neque ab eo recedit: sed planè stat immobile. Igitur, (Fig. 25.,) inventa Fluxione Radii CD, TAB. IV. ve, brevius, alterutrius BH vel AK, tam ponè æqualem nihilo.

Si Quæstio, ex. gr., proponeretur de Parabola secundi generis $x^3 = aay$: Priùs determina Centrum Curvaturæ. Invenies autem $DH = \frac{aa + 9xy}{6x}$, & idcirco $BH = \frac{aa + 15xy}{6x}$; Pone $BH = u$, ergo $\frac{aa}{6x} + \frac{5}{2}y = u$; itaque (per Probl. I.) $\frac{aa}{6xx} + \frac{5}{2}y = u$.

Nunc suppone u vel Fluxionem ipsius BH æqualem nihilo, & præterea, (quia per hypothesim $x^3 = aay$, id est, per Probl. I. $3xxx = aay = 3xx$, ponendo $x = 1$,) ipsi y substitue $\frac{3xx}{aa}$,

& reperiens $45x^4 = a^4$. Itaque abscinde $AB = a\sqrt[4]{\frac{1}{45}} = a \times 45^{-\frac{1}{4}}$,

& ex Beducta Perpendicularis BD occurret Curvæ in Puncto maximæ Curvaturæ. Sive, quod idem est, fac $AB:BD::3\sqrt[4]{5}:1$.

Eadem ratione (Fig. 26.) Hyperbola secundi generis, repræsentata Equatione $xyy = a^3$, maximè inflexa erit ad Puncta D & d, quæ determinabis capièdo Abscissam $AQ = 1$, erigendo hinc Perpendicularem $QP = \sqrt[4]{5}$, & inde Qp ei æqualem, & demum jungendo AP , Ap , quæ Rectæ secabunt Curvam in quæsitis Punctis D & d. TAB. IV.

V.

Determinare locum Centri Curvaturæ, aut describere Curvam, in quâ semper est hoc Centrum.

Supra demonstravimus, quòd Centrum Curvaturæ Trochoïdis
Q. 2. semper

semper invenitur in alterâ Trochoïde. Haud aliter Centrum Curvaturæ Parabolæ est in alterâ Parabolâ, sed secundi generis, quæ exprimitur Æquatione $axx = y^2$, ut facillè computatio tibi monstrabit.

V I.

Si Lux incidat in Curvam quamcumque, reperire Curvæ Focos, aut concursum Radiorum, qui ab omnibus ejus Punctis Refringuntur.

Quære Curvaturam, quam habet Curva in hoc Puncto, ac Centro & Radio Curvaturæ describe Circulum: Deinde quære concursum Radiorum refractorum à Circulo circa hoc Punctum. Idem enim erit concursus Radiorum refractorum à propositâ Curvâ.

Hic locus est addendi peculiarem Methodum determinandæ Curvaturæ ad Curvarum Vertices, quando eæ secant Abscissas ad rectos Angulos. Nam, Punctum, in quo Perpendicularis ad Curvam secans Abscissam, eam postremo secat est Centrum ipsum hujus Curvaturæ. Quare, cùm detur Relatio inter Abscissam x , & y Ordinatum, ad rectos Angulos connexas, atque ideo etiam (per Probl. I.) Relatio inter Fluxiones \dot{x} & \dot{y} ; valor ipsius $y\dot{y}$, postquam in eo posueris 1 pro \dot{x} , & 0 pro \dot{y} dabit Radium Curvaturæ.

Sic in Ellipfi $ax - \frac{a}{b}xx = yy$, est $\frac{ax}{2} - \frac{a}{b}xx = y\dot{y}$; qui valor $y\dot{y}$, (si supponas $y = 0$, & eâ de causâ $x = b$,) scribendo 1 pro \dot{x} , dat $\frac{1}{2}a$ æqualem Radio Curvaturæ. Eodem pacto ad Hyperbolæ & Parabolæ Vertices semper invenies Radium Curvaturæ æqualem semissi Lateris recti.

Eadem ratione in Conchoïde definitâ per Æquationem $\frac{bbcc}{xx} + \frac{2bcc}{x} + cc - bb - 2bx - xx = yy$, valor $y\dot{y}$ (inventus per

Probl.

Probl. I.) erit $\frac{bbcc}{x^3} - \frac{bcc}{xx} - b - x$: Nunc, supponen-

do $y = 0$, & idcirco $x = +c$ vel $-c$, habebis $\frac{bb}{c} + 2b - c$

aut $\frac{bb}{c} - 2b + c$ pro Radio Curvaturæ. Fac (Fig. 6.) igitur TAB. I.

AE: EG:: EG: EC, & Ae: eG:: eG: ee, ac Puncta C & e, erunt Centra Curvaturæ ad Vertices E & e Conchoïdum conjugatarum.

P R O B L. VI.

Determinare Qualitatem Curvaturæ ad datum Punctum cujuscunque Curvæ.

Per *Qualitatem* Curvaturæ intelligo ejus formam, ejus, scilicet, majorem vel minorem inæqualitatem, aut majorem vel minorem diversitatem in Curvæ partibus diversis. Sic, si quæras: Quænam est Qualitas Curvaturæ in Circulo? Respondeo quòd ea est uniformis vel invariabilis. Pariter, si quærat quænam est Qualitas Curvaturæ in Spirali, quæ (Fig. 23.) describitur motu Puncti D progredientis in AD ex A Motu accelerato, dum Recta AK fertur uniformi rotatione circa Centrum A, & cujus Puncti D Velocitas ita acceleretur, ut Recta AD habeat ad Arcum BK descriptum ex dato puncto B eandem Rationem ac Numerus ad suum Logarithmum; si, inquam, peteretur quænam est Qualitas Curvaturæ hujus Spiralis, respondendum esset eam esse uniformiter variam vel æquabiliter inæqualem. Et sic aliæ Curvæ in diversis Punctis dici possunt inæquabiliter inæquales juxta diversitatem earum Curvaturæ. TAB. III.

Quæritur ergo Inæquabilitas aut Varietas Curvaturæ in singulis Curvæ Punctis: Ad quod observo.

I

Quòd Curvæ, ubi similes sunt, habent in Punctis similiter positis similem Curvaturæ Inæquabilitatem aut Diversitatem.

Q 3

II

I I.

Quòd Momenta Radiorum Curvaturæ in his Punctis, sunt proportionalia eodem tempore natis Momentis Curvarum, & Fluxiones Fluxionibus.

I I I.

Quòd idcirco, ubi hæ Fluxiones non sunt proportionales, similis non est Inæquabilitas Curvaturæ.

Major enim est Inæquabilitas, quando major est Ratio quam Fluxio Radii Curvaturæ habet ad Curvæ Fluxionem; Quapropter hæc Fluxionum Ratio non ineptè dici potest *Index* Inæquabilitatis aut Varietatis Curvaturæ.

TAB. III. Ad Puncta (*Fig. 19.*) D & d infinitè proxima in Curvâ ADd , agantur Radii Curvaturæ DC & dc , &, si Dd sit Momentum Curvæ, erit Cc eodem tempore genitum Momentum Radii Curvaturæ, & $\frac{Cc}{Dd}$ Index Inæquabilitatis Curvaturæ: Nam, eo major dici potest hæc Inæquabilitas, quo major est Quantitas Rationis $\frac{Cc}{Dd}$; vel eo dissimilior ab uniformi Curvaturâ Circuli dici potest Curvatura hæc.

Jam, demissis DB & db ordinatim ad rectos Angulos Applicatis alicui Rectæ AB secanti DC in P , pone $AB = x$; $BD = y$; $DP = z$; $DC = u$, & ideo $Bb = ox$, eritque $Cc = ou$; & BD :

$$DP :: Bb : Dd = \frac{zox}{y}; \text{ ac } \frac{Cc}{Dd} = \frac{yu}{zx} = \frac{yu}{z}, \text{ ponendo } x = 1,$$

Cùm autem Relatio inter x & y exhibeatur per Æquationem aliquam, & hinc (juxta Probl. IV. & V.) inveniri possit Perpendicularis DP vel z , & Radius Curvaturæ u , ipsiusque Radii Fluxio u (per Probl. I;) datur ergo etiam $\frac{yu}{z}$, Index Inæquabilitatis Curvaturæ.

EXEMPL.

40

41

77

E X E M P L. I

Sit Aequatio ad Parabolam $2ax = yy$. Tunc (per Probl. IV.)
 $BP = a$, ergo $DP = \sqrt{aa + yy} = t$. Item (per Probl. V.)
 $BK = a + 2x$; & $BP : PD :: BK : DC = \frac{at + 2tx}{a} = u$. Jam,
 Aequationes $2ax = yy$; $aa + yy = tt$; & $\frac{at + 2tx}{a} = u$, dant
 $2ax = 2yy$; $2yy = 2tt$; & $\frac{at + 2xt + 2tx}{a} = u$. Has reduc, &
 pro x scribe 1, atque invenies $y = \frac{a}{2}$; $t = (\frac{2y}{t}) = \frac{a}{2}$; &
 $u = \frac{at + 2xt + 2tx}{a}$. Sic autem determinatis y , t , & u , habebis.

$\frac{2u}{t}$ Indicem Inæquabilitatis Curvaturæ.

Si, in Numeris, determinares quòd $a = 1$, aut $2x = yy$, &
 quòd $x = \frac{1}{2}$; tunc $y = (\sqrt{2x} =) 1$; $y = (\frac{a}{y} =) 1$; $t =$
 $(\sqrt{aa + yy} =) \sqrt{2}$; $t = (\frac{a}{t} =) \sqrt{\frac{1}{2}}$; & $u = (\frac{at + 2xt + 2tx}{a}$
 $=) 3\sqrt{2}$. Igitur $\frac{2u}{t} = 3$, qui Numerus est Index Inæquabilitatis.

Si verò statuisse quòd $x = 2$, tunc $y = 2$; $y = \frac{1}{2}$; $t = \sqrt{5}$;
 $t = \sqrt{\frac{1}{5}}$; & $u = 3\sqrt{5}$. Quamobrem $(\frac{2u}{t} =) 6$ efficit Index
 Inæquabilitatis.

Igitur Inæqualitas Curvaturæ, quæ prædita est Parabola in Puncto
 illo, ex quo demissa ad rectos Angulos super Axem Ordinata, æqua-
 lis est recto Lateri, illius est duplex Inæqualitatis, quam habet ea-
 dem Curva ad Punctum, undè acta, ut supra, Ordinata æqualis est
 semissi Lateris recti, id est, Curvatura ad primum Punctum duplo
 magis differt à Circuli Curvatura, quàm Curvatura ad secundum
 Punctum.

E X E M P L.

E X E M P L. I I.

Sit Æquatio $2ax - bxx = yy$, & (per Probl. IV.) est $a - bx = BP$; ergo $tt = aa - 2abx + b^2xx + yy = aa - byy + yy$: Pariter (per Probl. V.) est $DH = y + \frac{y^3 - by^3}{aa}$; ubi, si pro $yy - byy$ ponas $tt - aa$, habebis $DH = \frac{t^3}{a}$; Sed est $BD:DP::DH:DC = \frac{t^3}{aa} = u$; Ac (per Probl. I.) Æquationes $2ax - bxx = yy$; $aa - byy + yy = tt$; & $\frac{t^3}{aa} = u$; dant $a - bx = yy$; & $yy - byy = ti$; ac $\frac{3t^2}{aa} = u$. Datur igitur u ; ergo etiam

$\frac{y''}{t}$ Index Inæquabilitatis Curvaturæ.

Sic in Ellipfi $2x - 3xx = yy$; in quâ est $a = 1$; & $b = 3$; si ponas $x = \frac{1}{2}$, erit etiam $y = \frac{1}{2}$; sed $y = 1$; $t = \sqrt{\frac{1}{2}}$; $i = \sqrt{2}$; & $u = 3\sqrt{\frac{1}{2}}$; quocirca $\frac{y''}{t} = \frac{3}{2}$, quæ Fractio exponit Curvaturæ Inæquabilitatem. Hinc patet, quòd Inæquabilitas Curvaturæ, quam habet Ellipsis ad Punctum D hîc assignatum, est bis minùs inæquabilis, (vel bis similior Curvaturæ Circuli,) quàm Curvatura Parabolæ ad ejus Punctum, ex quo demissa Ordinata ad Axem æquat semissem Lateris recti.

Si animus fert comparare Conclusiones, quas invenimus in his Exemplis, perspicias, quòd in Parabolâ $2ax = yy$ est Index Inæquabilitatis $(\frac{y''}{t} =) \frac{3y}{a}$, sed in Ellipfi $2ax - bxx = yy$ habes $(\frac{y''}{t} =) \frac{3y - 3by}{aa} \times BP$; unde in Hyperbolâ $2ax + bxx = yy$, servatâ Analogiâ, erit Index $(\frac{y''}{t} =) \frac{3y + 3by}{aa} \times BP$. Unde liquet, quòd ad diversa Puncta singularum Sectionum conicarum

24

rum seorsum consideratarum, Inæquabilitas Curvaturæ est ut rectan-
gulum $BD \times BP$, & quòd ad varia Parabolæ Puncta est ut Ordi-
nata BD .

Cùm autem Parabola sit simplicissima Figurarum, quæ inæquali-
ter flectuntur, & cùm Inæqualitas Curvaturæ in illâ facillè determi-
netur, (est enim ejus Index $\propto \frac{\text{Ordinatum}}{\text{Latere Recto}}$), ideo Curvatura
aliarum Curvarum non inconcinne comparabitur cum hujus Cur-
vaturâ.

Sic, si quæretur quænam est Curvatura Ellipseos $2x - 3xx$
 $= yy$ ad illud Perimetri Punctum, quod determinatur assumptâ $x =$
 $\frac{1}{2}$: Quia hujus Curvaturæ Index est $\frac{3}{2}$, ut jam invenimus, ref-
ponderi potest Curvaturam hanc similem esse ei, quæ habet Para-
bola $xx = yy$ ad Punctum illud, inter quod & Axem, Ordinata
ad rectos Angulos par est $\frac{3}{2}$.

Haud secus, (Fig. 15.) cùm Fluxio Spiralis ADE sit ad Flux-
ionem Subtensæ AD in aliquâ datâ Ratione, puta, ut d est ad e ; TAB. III.
ejus Concavitatem versùs age $AP = \frac{e}{\sqrt{dd - ee}} \times AD$ & Per-
pendicularem ipsi AD ; atque erit P Centrum Curvaturæ, & $\frac{AP}{AD}$
aut $\frac{e}{\sqrt{dd - ee}}$ Index Inæquabilitatis: Quapropter hæc Spiralis
habet ubique Curvaturam similiter inæquabilem, ut Parabola xx
 $= yy$ tam habet in Puncto, ex quo ducta ad rectos Angulos Or-
dinata ad Axem æqualis est Quantitati $\frac{e}{\sqrt{dd - ee}}$.

Eadem ratione (Fig. 20.) Index Inæquabilitatis ad Trochoidis TAB. IV.
Punctum D invenietur $\frac{AB}{BL}$. Igitur ejus Curvatura ad idem Punc-
tum D eodem pacto inæquabilis est, aut eodem pacto differt à Cir-
culo ac Curvatura cujusvis Parabolæ $xx = yy$ ad Punctum, ubi Or-
dinata est $= \frac{1}{6} \propto \frac{AB}{BL}$.

J. Newtoni Opuscula, Tom. I.

R

Hæ

His, opinor, sensus Problematis satis explanatus est; eo autem benè perspecto, quilibet, qui observet Series rerum supra traditarum, poterit sibimet ipse plura suppeditare Exempla, & invenire plures operandi Methodos ab hisce diversas, prout occasio postulabit. Ita ut ei non admodum difficilis, sive potius omnino facilis sit futura, (dummodo fastidium illi non faciant computationis tædium & ambages,) Solutio Problematum ejusdem naturæ, puta

I.

Invenire in quavis Curvâ Punctum, ubi Inæqualitas Curvature est aut nulla, aut infinita, aut omnium maxima, vel minima.

Sic Inæqualitas nulla est ad Sectionum conicarum Vertices, infinita ad Trochoidis Cuspides, maxima ad ea Ellipseos Puncta, ad quæ Rectangulum $BD \times BP$ est omnium maximum, id est, ad quæ Ellipsis secatur à Diagonalibus Parallelogrammi ita circumscripti, ut Lætera tægant præcipuos Curvæ Vertices.

II.

Determinare Curvam certæ alicujus Speciei, puta, Sectionem conicam, cujus Curvatura ad datum Punctum sit æqualis & similis Curvature alterius cujusvis Curvæ ad datum Punctum.

III.

Determinare conicam Sectionem, ad cujus quodcumque Punctum Curvatura & positio Tangentis, (respectivè ad Axem,) similes sint Curvature & Tangentis positioni alterius cujusque Curvæ ad datum Punctum.

Utilitas hujus Problematis in eo versatur, quod sic pro Ellipsis secundæ generis, quarum proprietates ad Lucis Refractionem pertinentes explicatæ fuerunt à CARTESIO in *Geometria* sua, usurpari possunt Sectiones conicæ, quæ idem ferè prorsus efficient. Quod intelligendum est de ceteris Curvis.

PROBL.

His, opinor, sensus Problematis satis explanatus est; eo autem benè perspecto, quilibet, qui observet Series rerum supra traditarum, poterit sibi ipse plura suppeditare Exempla, & invenire plures operandi Methodos ab hisce diversas, prout occasio postulabit. Ita ut ei non admodum difficilis, sive potius omnino facilis sit futura, (dummodo fastidium illi non faciant computationis tædium & ambages,) Solutio Problematum ejusdem naturæ, puta

I.

Invenire in quavis Curvâ Punctum, ubi Inæqualitas Curvature est aut nulla, aut infinita, aut omnium maxima vel minima.

Sic Inæqualitas nulla est ad Sectionum conicarum Vertices, infinita ad Trochoidis Cuspides, maxima ad ea Ellipseos Puncta, ad quæ Rectangulum $BD \times BP$ est omnium maximum, id est, ad quæ Ellipsis secatur à Diagonalibus Parallelogrammi ita circumscripti, ut Latera tangant præcipuos Curvæ Vertices.

II.

Determinare Curvam certæ alicujus Speciei, puta, Sectionem conicam, cujus Curvatura ad datum Punctum sit æqualis & similis Curvature alterius cujusvis Curvæ ad datum Punctum.

III.

Determinare conicam Sectionem, ad cujus quodcumque Punctum Curvatura & positio Tangentis, (respectu ad Axem,) similes sint Curvature & Tangentis positioni alterius cujusque Curvæ ad datum Punctum.

Utilitas hujus Problematis in eo versatur, quod sic pro Ellipsis secundi generis, quarum proprietates ad Lucis Refractionem pertinentes explicatæ fuerunt à CARTESIO in *Geometria* sua, usurpari possunt Sectiones conicæ, quæ idem ferè prorsus efficient. Quod intelligendum est de ceteris Curvis.

PROBL.

Reperire quolibet Curvas, quarum Area possint exhiberi finita Equatione.

Sit (Fig. 27.) AB Abscissa Curvæ, è cuius Vertice A demittatur Perpendicularis AC = 1, deinde agatur CE Parallela AB, Præterea, sit BD ordinatim Applicata ad rectos Angulos, quæ occurrat Rectæ CE in E & Curvæ AD in D. Intellige Areas ACEB & ADB generari motu Rectarum EB & BD decurrentium Rectam AB: Tunc harum Arcuum Incrementa vel Fluxiones erunt semper ut Lineæ describentes EB & BD. Fac igitur Parallelogrammum ACEB, aut $AB \times 1 = x$, & Area Curvæ ADB dicatur $= z$, & Fluxiones x ac z erunt ut BE & BD, ita ut, si ponas $x = 1 = EB$, sit $z = BD$.

TAB. V.

Assumptâ nunc Equatione arbitrariâ, quâ determinetur Relatio ipsarum x & z , ex eâ (per Probl. I.) eruetur z ; igitur habebuntur duæ Equationes, quarum una determinabit Curvam, alterâ verò Arcum.

EXEMPLA.

Sume $xx = z$, unde (per Probl. I.) $2xx = z$, aut, (quis $x = 1$,) $2x = z$.

Pone $\frac{x^3}{3} = z$, hinc oritur $\frac{3xx}{3} = z$, Equation ad Parabolam.

Sit $ax^3 = zx$, aut $\frac{1}{2} x^2 = z$, unde conficietur $\frac{3}{2} \frac{1}{2} x^2 = z$, aut $\frac{3}{4} ax = zx$, Equation pariter ad Parabolam.

Assume $a^2 x^{-1} = zx$, aut $a^2 x^{-1} = z$, & habebis — $a^2 x^{-1} = z$, aut $a^2 + xxx = 0$. Ubi valor negativus ipsius

R 2

z tan-

x tantum indicat quod BD sumi debet ad partes contrarias, relative ad BE.

Item, si capias $axc + ccxx = xx$, assequeris $2ccx = 2xz$,

unde, eliminato symbolo x , erues $\frac{cx}{\sqrt{aa+xx}} = z$.

Vel, si ponas $\frac{aa+xx}{b} \times \sqrt{aa+xx} = z$, fac $\sqrt{aa+xx} = u$,

eritque $\frac{u^3}{b} = z$, atque hinc (per Probl. I.) $\frac{3uu}{b} = z$. Atqui

Æquatio $aa+xx = uu$ dat $2x = 2u$; cujus ope si extermines u , invenies $\frac{3ux}{b} = z = \frac{3x}{b} \sqrt{aa+xx}$.

Si demum assumas $3 - 3xz + \frac{2}{5} z = xz$, obtinebis $-3x$

$-3xz + \frac{2}{5} z = xz$, quapropter, ex assumptâ Æquatione

primò quærenda est Area x , & deinde Ordinata z , ex Æquatione quæ suboritur.

Et sic ex Arcis ad libitum fictis semper determinare licet Ordinate, ad quas pertinent.

PROBL. VIII.

Invenire quolibet Curvas quarum Area ad Arcem cujuscunque data Curva habeant Relationem expositam finitâ Æquatione.

Curva data (Fig. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.) sit FDH, & GEI Curva petita. Concipe earum Ordinate BD, & EC moveri ad rectos Angulos per earum Abscissas vel Bases AB, & AC. Tunc, Incrementa vel Fluxiones Arcarum hæc modo descriptarum, erunt ut hæ Ordinate ductæ in Velocitates quibus feruntur, videlicet in respectivarum Abscissarum Fluxiones. Pone igitur AB $= x$, BD $= u$, AC $= z$, atque CE $= y$; Arcam verò AFDB $= s$, & Arcam AGEI $= t$; Harumque Arcarum Fluxiones sint \dot{s} , &

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 133

x ; atque erit $xx:yz::s:t$; quamobrem, si ponas $x=1$, & $s=s$ ut antea, restabit $yz=t$, & $\frac{t}{s}=y$.

(Idcirco affumantur duæ Equationes, quarum una exprimat Relationem Arcuum s , & t , & altera Relationem Abscissarum ad eas pertinentium x , & z : Ex his Equationibus erue (per Probl. I.)

Fluxiones \dot{s} & \dot{z} , & deinde fac $\frac{\dot{t}}{\dot{s}}=y$.

EXEMPL. I.

Data Curva FDH sit Circulus expressus Equatione $ax-xx=aa$, & quærantur aliæ Curvæ quarum Areae sint æquales Areae Circuli. Est ergo, per hypothesein, $s=t$, & propterea $\dot{s}=\dot{t}$.

ac $y=\frac{\dot{t}}{\dot{s}}=\frac{u}{z}$. Superest z , quæ determinanda est assumpta aliqua Relatione inter Abscissas x , & z .

Suppone, ex. gr., quod $ax=zx$, tunc (per Probl. I.) $z=2zs$; Igitur, (ipso z substituendo $\frac{a}{2z}$), $y=\frac{u}{z}$ fiet $\frac{u}{z}=\frac{2azs}{z}$.

Sed $u=(\sqrt{ax-xx})^2=\frac{a^2}{2z}$, ergo $\frac{2azs}{z}=\frac{a^2}{2z}$, $\sqrt{ax-xx}=z$ est Equatio ad Curvam, cujus Area æquat Arcum Circuli.

Pariter posito quod $xx=zs$, hinc oritur $2s=zs$, & ideo $z=(\frac{u}{z})^2=\frac{u^2}{z}$ unde, eliminatis s & x , excides $y=\frac{u}{z}$.

$\sqrt{ax-xx}=z$ Sed

Quod si cepisses $ss = t$, & $x = zx$ invenisses $2ss = t$, & $u = 2zx$, & propterea $y = \frac{t}{z} = 4ss$; & scribendo pro s & x , $\sqrt{ax - xx}$ ac xx , conficitur $y = 4zx \times \sqrt{a - 2z}$ Equatio ad Curvam mechanicam.

EXEMPL. III.

Eadem ratione possunt inveniri Figuræ, quæ habeant assumptam Relationem ad aliquam aliam datam Figuram. Detur Hyperbola $cx + xx = au$; si assumes $s = n$, & $xx = cu$, habebis $s = s$, & $2x = cu$, igitur $y = \frac{t}{z} = \frac{cs}{2u}$; Jam, substitue $\sqrt{cc + xx}$ pro s , & $c^2 x^2$ pro xx , erit $y = \frac{c^2}{2u} \sqrt{c^2 + x^2}$.

Haud aliter, si ponas $xx = s$, & $xx = cu$, repeties $s + cu = s$, & $2x = cu$; sed $s = s$, ergo $cu = s$. Quapropter $y = \frac{cs}{2u}$. Atque Equatio $cx + xx = au$, datur $x = uu$ (per Probl. I.), est igitur $y = \frac{cx}{2u}$; quæ Equatio, ponendo $\sqrt{cc + xx}$ pro u , & $c^2 x^2$ pro x , evadit $y = \frac{cz}{2\sqrt{c^2 + 2z}}$.

EXEMPL. IV.

Quinimo, si Cissois $\frac{xx}{\sqrt{ax - xx}} = u$ esset data Figura; cui comparanda Figura peteretur; & si, ad hoc perficiendum assumes $\frac{x}{3} \sqrt{ax - xx} + \frac{2}{3} s = t$, suppone $\frac{x}{3} \sqrt{ax - xx} = h$, & hujus Fluxionem pone \dot{h} ; erit igitur $\dot{h} + \frac{2}{3} \dot{s} = \dot{t}$. Sed Equatio

atio $\frac{ax^3 - x^4}{9} = bh$, dat $\frac{3axx - 4x^3}{9} = 2bh$, & propterea, (ex-
terminando b ,) $\frac{3ax - 4xx}{6\sqrt{ax - xx}} = \frac{h}{x}$. Præterea, quia $\frac{2}{3}y = \frac{2}{3}x$
 $= \frac{4xx}{3\sqrt{ax - xx}}$, erit $\frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}} = x$. Nunc determinatu-
rus z & z assume $\sqrt{aa - ax} = z$; unde (per Probl. I.) $-\frac{a}{2z}$
 $2xz$, aut $z = -\frac{a}{2z}$. Quapropter est $y = (\frac{x}{z} = -\frac{2x}{\sqrt{ax - xx}}$
Cum autem Equatio hæc
sit, ad Circulū, hic habes Relationem inter Areas Circuli, & Cif-
roidis.

Quod si assumptiles $\frac{ax}{3\sqrt{ax - xx}} + \frac{x}{3} = x$, & $x = z$, hinc
diminasset $y = \sqrt{ax - xx}$; Equatio rursus ad Circulū.

Eadem ratione, si daretur aliqua Curva mechanica, possent repe-
ri alie Curvæ mechanice priori conferendæ.

Sed ad inveniendas Curvas geometricas, optimum erit ex Rectis,
quæ geometricè altera ab altera dependent, aliquam sumere pro
Basi, vel Abscissâ, & Arcum, qui complet Parallelogrammū,
investigare, ponendo ejus Fluxionem æquivalere Abscissæ ductæ in
Fluxionem Ordinatæ.

E X E M P L U M.

TAB. IV. Sic (Fig. 20.) propositâ Trochoïde ADF, eam refero ad Abs-
cissam AB; &, completo Parallelogrammū ABDG, investigo Su-
perficiem complementem ADG, eam supponendo descriptam motu
Rectæ GD., & idcirco ejus Fluxionem æquivalentem Linæ GD
ductæ in Velocitatem Motus sui, id est $x \times v$. Nunc, quia AL
parallela est Tangenti DT, est AB ad BL, ut Fluxio ejusdem AB
ad Fluxionem Ordinatæ BD, videlicet ut x ad v . Quocirca

$\frac{BL}{AB}$, & ideo $x\dot{u} = BL$. Ergo Area ADG describitur Fluxione BL; &, quia eadem Fluxione describitur Area circularis ALB, hæc illi æqualis est.

Eodem pacto, si concipias ADF esse Figuram Arcuum, aut Sinuum verforum, ea scilicet, cujus Ordinata BD æqualis est Arcui AL; Cum Fluxio Arcus AL sit ad Fluxionem Abscissæ AB, ut PL ad LB; id est, cum sit $\dot{u} : 1 :: \frac{1}{2} a : \sqrt{ax - xx}$, & propterea

$$\dot{u} = \frac{a}{2\sqrt{ax - xx}}, \text{ erit } x\dot{u}, \text{ Fluxio Areæ ADG} = \frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}}$$

Quocirca Recta æqualis Quantitati $\frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}}$ si concipiatur applicata, tanquam Ordinata perpendicularis ad Punctum aliquod B Rectæ AB, terminabitur certâ Curvâ geometricâ, cujus Area contigua Abscissæ AB æqualis est Areæ ADG.

Et sic inveniri possunt Figuræ geometricæ, æquales aliis Figuris effictis Applicatione (sub quovis Angulo) Arcuum Circuli, Hyperbolæ, aut alterius cujuscunque Curvæ, ad Sinus rectos, aut versos horum Arcuum, aut ad aliam quamlibet Rectam, quæ possit geometricè determinari.

In Spiralibus brevissimum est negotium. Nam (Fig. 36.) ex TAB. VI. Rotationis Centro A describe quolibet Radio Arcum DG, qui secet Rectam AF in G, & Spiralem in D; quia hic Arcus, tanquam Linea, quæ fertur per Abscissam AG, describit Spiralis Aream AHDG, ita ut Fluxio hujus Areæ sit ad Fluxionem Rectanguli $1 \times AG$, ut Arcus GD est ad 1, ideo Recta perpendicularis GL æqualis huic Arcui, eodem pacto peragrans eandem Lineam AG describet Aream A/LG æqualem Areæ AHDG; & Curva A/L erit geometrica. Præterea, si ducatur subtensa AL, erit Triangulum ALG $= \frac{1}{2} AG \times GL = \frac{1}{2} AG \times GD =$ Sectori AGD.

Igitur Segmenta complementia ALI & ADH erunt etiam æqualia. Et hæc non solum conveniunt *Spirali Archimedea*, (in quâ Hypothesi A/L est *Parabola Apolloniana*) sed cuicumque alteri; ita ut

If. Newtoni Opuscula, Tom. I S quævis

quævis earum converti eadem facilitate possit in æquales Geometricas Curvas.

Poteram attulisse plura specimina Constructionum hujus Problematis, sed hæc sufficient; sunt enim adeo generalia, ut, quæcunque hætenus inventa sunt, aut (opinor) inveniri possunt de Curvarum Arcis, aliquo pacto in his contineantur, & per hæc determinari possint, plerumque sine solitis ambagibus, & perplexitatibus.

Præcipua verò utilitas hujus, & præcedentis Problematis in eo sita est, quòd assumptis conicis Sectionibus, aut quibuscvis aliis Curvis cognitæ magnitudinis, invenire licet alias Curvas, quæ cum iis comparari possunt, & earum Æquationes ordine disponi in Catalogo, seu Tabulâ. Constructâ autem hac Tabulâ, quando invenienda est Area Curvæ alicujus, perspicendum est utrùm Æquatio definienti ejus naturam, vel immediatè sit in hac Tabulâ, vel saltem transformari possit in aliam, quæ ibi sit; quod si accidit, datur hæc Area. Insuper Catalogus, aut Tabula hæc applicari potest ad determinandas Curvarum Longitudines; ad inveniendâ earum Centra Gravitatis; Solida genita earum rotatione; Superficies horum Solidorum, & quasvis alias Fluents Quantitates generatas Fluxionibus huic analogis.

PROBL. IX.

Determinare Arcam cujuscunque Curvæ propositæ

Hujus Problematis Resolutio hinc pendet, quòd ex datâ Fluxionum Relatione, potest inveniri Fluentium Ratio, (ut in Probl. II.).

TAB. V. Et primò, quidem, si (Fig. 27.) recta Linea BD, cujus Motu describitur Area quæsitâ AFDB, fertur ad rectos Angulos super Abscissam AB positione datam; intellige, (ut antea,) Parallelogrammum ABEC eodem tempore describi ultra AB à Lineâ, quæ Unitatem æquet. Et, posito, quòd BE sit Fluxio hujus Parallelogrammi; erit BD Fluxio Areae quæsitæ.

Fac igitur $AB = x$; & pariter $ABEC = 1 \times x = x$; ac $BE = \dot{x}$;

Item, voca Arcam AFDB $= z$; eritque $BD = \dot{z}$; quinetiam $=$

$$\frac{z}{x}$$

$\frac{z}{x}$, quia $\dot{x} = 1$. Igitur Aequatio exprimens BD, unà exprimit

Rationem Fluxionum $\frac{z}{x}$, & hinc (per Problematis I. Caf. I.)
potest excudi Relatio Fluentium x , & z .

E X E M P L. I.

Quando BD, aut z , æquat aliquam simplicem Quantitatem.

Detur $\frac{xx}{a} = z$, aut $= \frac{z}{x}$ (Æquatio ad Parabolam), hinc

(per Probl. II.) conficietur $\frac{x^3}{3a} = z$. Quapropter $\frac{x^3}{3a}$, aut $\frac{1}{3}$
 $AB \times BD$ æquat Aream Parabolæ AFDB.

Proponatur $\frac{x^3}{aa} = z$ (Æquatio ad Parabolam secundi generis),
hinc habebimus $\frac{x^4}{4aa} = z$; videlicet $\frac{1}{4} AB \times BD$ est Area
AFDB.

Sit $\frac{a^3}{xx} = z$, aut $a^3x^{-2} = z$ (Æquatio ad Hyperbolam
secundi generis), ex eâ cruetur $a^3x^{-1} = z$, aut $-\frac{a^3}{x} = z$.

Rectangulum nempe (Fig. 37.) $AB \times BD$ æquat Aream HDBH TAB. VI.
in infinitum extensam, & jacentem ultra Ordinam BD, ut infi-
nuat negativus ejus valor.

Eodem pacto, si daretur, $\frac{a^4}{x^3} = z$, assequeremur —
 $\frac{a^4}{2xx} = z$.

Quinimo proposita Aequatio $ax = zz$, (quæ rursus pertinet

ad Parabolam), id est $a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} = z$, suppeditat $\frac{2}{3} a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} = z$,

scilicet $\frac{2}{3} AB \times BD = \text{Areae AFDB}$.

Sed $\frac{a^{\frac{1}{2}}}{x} = z$; dat $+ 2 a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} = z$, aut $2 AB \times BD = \text{AFDB}$.

Sed $\frac{a^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} = z$; gignit $-\frac{2a^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{3}{2}}} = z$, five $2 AB \times BD = \text{HDBH}$.

Denique $axx = z^3$; præbet $\frac{3}{5} a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{5}{2}} = z$; videlicet $\frac{3}{5} AB \times BD = \text{AFDB}$.

E X E M P L. II.

Quando z aequat Aggregatum ex simplicibus Quantitatibus.

Sit $x + \frac{xx}{a} = z$; erit $\frac{xx}{2} + \frac{x^3}{3a} = z$.

Detur $a + \frac{a^3}{xx} = z$; habebimus $ax - \frac{a^3}{x} = z$.

Proponatur $3x^{\frac{1}{2}} - \frac{5}{xx} - \frac{2}{x^{\frac{3}{2}}} = z$; hinc exfurget $2x^{\frac{3}{2}} + \frac{5}{x} - 4x^{\frac{1}{2}} = z$.

E X E M P L. III.

Ubi Reductio per Divisionem præmittenda est.

Detur $\frac{a^2}{b+x} = z$ (Æquatio ad Hyperbolam Apollonianam).

& Divisione in infinitum peractâ, fiet $z = \frac{a^2}{b} - \frac{aax}{bb} + \frac{aax}{b^3}$.



24

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 141

$-\frac{aa x^3}{b^4}$; &c. Et hinc (per Probl. II.), ut in secundâ Exemplo-
rum congerie, obtinebis $z = \frac{aa x}{b} - \frac{aa x x}{2 b b} + \frac{aa x^3}{3 b^3} - \frac{aa x^5}{4 b^4}$;
&c.

Proponatur $\frac{1}{1+x x} = z$, erit, per Divisionem, $z = 1 -$
 $x x + x^4 - x^6$; &c, aut etiam $z = \frac{1}{x x} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^5}$; &c.
Quapropter (per Probl. II.) $z = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7$;
&c. = AFDB; aut $z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{3 x^3} - \frac{1}{5 x^5}$; &c. = HDBH.

Sit $\frac{2 x^{\frac{5}{2}} - x^{\frac{7}{2}}}{1+x^{\frac{1}{2}}-3 x} = z$; Divisio suppeditabit $z = 2 x^{\frac{5}{2}} - 2 x$
 $+ 7 x^{\frac{3}{2}} - 13 x x + 34 x^{\frac{5}{2}}$; &c. Et hinc (per Probl. II.) erit z
 $= \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - x x + \frac{14}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{13}{3} x^3 + \frac{68}{7} x^{\frac{7}{2}}$; &c.

E X E M P L. IV.

Ubi prævia: Reductio per Extractionem Radicis requiritur.

Detur $z = \sqrt{aa + x x}$ (Æquatio ad Hyperbolam,) cujus Ra-
dix extracta, ad infinitam Terminorum multitudinem, dat $z = a$
 $+ \frac{x x}{2 a} - \frac{x^4}{8 a^3} + \frac{x^6}{16 a^5} - \frac{5 x^8}{112 a^7}$; &c., unde, ut supra, $z = a x$
 $+ \frac{x^3}{6 a} - \frac{x^5}{40 a^3} + \frac{x^7}{112 a^5} - \frac{5 x^9}{1008 a^7}$; &c.

Eodem pacto, si proponeretur Æquatio (ad Circulum) $z =$
 $\sqrt{aa - x x}$, ea suppeditaret $z = a x - \frac{x^3}{6 a} - \frac{x^5}{40 a^3} - \frac{x^7}{112 a^5}$
 $- \frac{5 x^9}{1008 a^7}$; &c.

Et si haberemus $z = \sqrt{x - xx}$ (Æquatio iterum ad Circulum)
 per Radicis Extractionem exurgeret $z = x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} x^{\frac{5}{2}}$
 $- \frac{1}{16} x^{\frac{7}{2}}; \&c.$ Et idcirco $z = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}}$
 $- \frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}}; \&c.$

Sic $z = \sqrt{ax + bx - xx}$ (Æquatio pariter ad Circulum) sup-
 peditat, per Radicis Extractionem, $z = a + \frac{bx}{2a} - \frac{xx}{2a} - \frac{bbxx}{8a^3};$
 $\&c.$ Hinc autem conficitur $z = ax + \frac{bxx}{4a} - \frac{x^3}{6a} - \frac{bbx^3}{24a^3}; \&c.$

Sic etiam $\sqrt{\frac{1+axx}{1-bxx}} = z$, dat per debitam Reductionem

$$z = 1 + \frac{1}{2} bxx + \frac{3}{8} bbx^2; \&c.$$

$$+ \frac{1}{2} a - \frac{1}{4} ab; \&c.$$

$$- \frac{1}{8} aa; \&c.$$

unde fit

$$z = x + \frac{1}{6} bx^3 + \frac{3}{40} bbx^5; \&c.$$

$$- \frac{1}{6} a + \frac{1}{20} ab; \&c.$$

$$- \frac{1}{40} aa; \&c.$$

Sic demum $z = \sqrt[3]{a^3 + x^3}$ per Extractionem cubicæ Radicis, dat
 $z = a + \frac{x^3}{3aa} - \frac{x^6}{9a^5} + \frac{5x^9}{81a^8}; \&c.$, quapropter (per Probl. II.)
 est $z = ax + \frac{x^4}{12aa} - \frac{x^7}{63a^5} + \frac{x^{10}}{162a^8}; \&c. = \text{AFDB.}$

Aut

Aut etiam $z = x + \frac{a^3}{3xx} - \frac{a^6}{9x^5} + \frac{5a^9}{81x^8}$; &c., unde $z = \frac{1}{2} \times$
 $xx - \frac{a^3}{3x} + \frac{a^6}{36x^4} - \frac{5a^9}{567x^7}$; &c. = HDBH.

E X E M P L. V.

*Quando Aequatio per Solutionem affectæ Aequationis præpara-
 randa est.*

Si Curva definiretur Aequatione $z^3 + aaz + axz - 2a^3 - x^3$
 $= 0$; Extrahe Radicem, & invenies $z = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a}$,
 $+ \frac{131x^3}{512aa}$; &c., unde obtinebis, Methodo jam sæpius usurpatâ,
 $z = ax - \frac{xx}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048aa}$; &c.

Quod si $z^3 - czx - 2xxz - ccz + 2x^3 + c^3 = 0$ effet
 Aequatio ad Curvam, Resolutio proferret tres varias Radices; vi-
 delicet aut $z = c + x - \frac{xx}{4c} + \frac{x^3}{32cc}$; &c., aut $z = c - x$
 $+ \frac{3xx}{4c} - \frac{15x^3}{32cc}$; &c., aut denique $z = -c - \frac{xx}{2c} - \frac{x^3}{2cc}$
 $+ \frac{x^5}{4c^4}$; &c. Unde prodirent valores trium Arearum correspon-
 tium; nempe $z = cx + \frac{1}{2}xx - \frac{x^3}{12c} + \frac{x^4}{128cc}$; &c., aut z
 $= cx - \frac{1}{2}xx + \frac{x^3}{4c} - \frac{15x^4}{128cc}$; &c., aut denique $z = -cx$
 $- \frac{x^3}{6c} - \frac{x^4}{8cc} + \frac{x^6}{24c^4}$; &c.

Nihil hîc subjungo de Curvis Mechanicis, quia Methodus eas
 revocandi ad geometricarum formam postea tradetur.

Cùm autem valores z hîc inventi pertineant ad Areas, quæ ja-
 cent aliquando juxta finitam Abscissæ partem AB, aliquando juxta
 ejus partem BH infinitè productam versùs H, aliquando tandem
 juxta

juxta partes ambas pro variis earum Terminis; ut assignari possit legitimus Areæ valor adjacens alicui parti Abscissæ, hæc Area semper fieri debet æqualis differentiæ valorum z , pertinentium ad partes Abscissarum, quæ terminantur initio & fine Areæ.

TAB. VI.

Ex. gr. Curva (Fig. 37.) expressa per Æquationem $\frac{1}{1+xx} = z$ habet Aream, (ut jam invenimus,) $z = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$, &c. Nunc, determinaturus Quantitatem Areæ $b d D B$ adjacentis parti Abscissæ $b B$; ex valore ipsius z , qui oritur ponendo $AB = X$, aufero valorem z , qui exsurgit dicendo $Ab = x$, & restat $X - \frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{5}X^5$; &c. $-x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5$, &c., pro valore Areæ $b d D B$. Unde constat, quòd, si Ab . aut x supponeretur æqualis nihilo, valor totius Areæ $AFDB$ foret $X - \frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{5}X^5$, &c.

In eadem Curvâ reperitur etiam $z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5}$; &c. Hinc rursus, juxta jam dicta, Area $b d D B = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5}$, &c., $-\frac{1}{X} + \frac{1}{3X^3} - \frac{1}{5X^5}$; &c. Quapropter, si AB , aut X poneretur infinita, adjacens Area $b d H$ protensa versùs H , quæ etiam in infinitum extenditur, æquivaleret $\frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5}$; &c. Nam, ultima Series $-\frac{1}{X} + \frac{1}{3X^3} - \frac{1}{5X^5}$; &c., evanesceret ob Denominatorem infinitum.

In Curvâ expositâ per Æquationem $a + \frac{a^3}{xx} = z$ invenimus, quòd $z = ax - \frac{a^3}{x}$. Quod ostendit, quòd $aX - \frac{a^3}{X} - ax + \frac{a^3}{x}$ exponit Aream $b d D B$, quæ fit infinita, quando x ponitur æqualis nihilo, aut X infinita; & idcirco utraque Area $AFDB$, & $b d H$ in infinitum protenditur; & aliquæ tantummodo partes intermediae, ut

ut $b d$ DB, exhiberi possunt. Hoc autem semper accidit, quando Abscissa x est simul in aliquorum ex Terminis valoris z Denominatore, & in aliorum Numeratore. Sed quando x est solum in eorum Numeratore, ut in primo Exemplo, valor z pertinet ad Aream adjacentem ipsi AB, hinc ab hac Ordinata. Et quando x est tantum in Denominatore, ut in secundo Exemplo, hic valor, postquam omnia Terminorum signa mutaveris, spectat ad totam Aream infinite productam inde ab Ordinata.

Si Curva (Fig. 38.) fecit Abscissam alicubi inter Puncta b , & TAB. VI. B, puta, in E, pro Area habebis differentiam ($b d E - BDE$) Arrearum sitarum ad diversas Abscissæ partes; cui differentię adde Rectangulum B D G b & obtinebis Aream $dEDG$.

Sed hoc præcipue observandum est, cum in valore z nonnulli Termini divisi sunt per x non ascendenti supra primam Dimensionem: Nam Areæ respondentes hisce Terminis pertinent ad conicas Hyperbolas; & ideo seorsum exhiberi debent per Series infinitas, quomodo factum videbis in sequentibus.

Sit $\frac{a^3 - aax}{ax + xx} = z$ Aequatio ad Curvam: Hæc, per Divisionem, suppeditat $z = \frac{a^3}{x} - 2a + 2x - \frac{2xx}{a} + \frac{2x^3}{aa}$; &c. Hinc $z = \left[\frac{aa}{x} \right] - 2ax + xx - \frac{2x^3}{3a} + \frac{x^5}{2aa}$; &c. Et Area $b d D B$ $= \left[\frac{aa}{X} \right] - 2aX + XX - \frac{2X^3}{3a}$, &c., $- \left[\frac{aa}{x} \right] + 2ax - xx + \frac{2x^3}{3a} - \frac{x^5}{2aa}$; &c. Ubi signa $\left[\frac{aa}{x} \right]$; & $\left[\frac{aa}{X} \right]$ indicant exiguas Areas spectantes ad Terminos $\frac{aa}{x}$, & $\frac{aa}{X}$.

Nunc investigaturus $\left[\frac{aa}{x} \right]$; & $\left[\frac{aa}{X} \right]$, pono Ab, aut x esse definitam & bB indefinitam, aut Fluentem, quam idcirco voco $= y$; *If. Newtoni Opuscula*, Tom. I T ita

ita ut sit $\boxed{\frac{aa}{x+y}}$ Quantitas æqualis Areæ Hyperbolicæ, quæ adjacet

ipfi bB , id est, $\boxed{\frac{aa}{X}} - \boxed{\frac{aa}{x}}$. Atqui, per Divisionem, inve-

nio $\frac{aa}{x+y} = \frac{aa}{x} - \frac{aay}{xx} + \frac{aay^2}{x^3} - \frac{aay^3}{x^4}$; &c. & ideo

$\boxed{\frac{aa}{x+y}}$, aut $\boxed{\frac{aa}{X}} - \boxed{\frac{aa}{x}} = \frac{aay}{x} - \frac{aay^2}{2xx} + \frac{aay^3}{3x^3} - \frac{aay^4}{4x^4}$;

&c.; ergo tota Area petita $bdDB = \frac{aay}{x} - \frac{aay^2}{2xx} + \frac{aay^3}{3x^3}$; &c.
 $- 2aX + XX - \frac{2X^3}{3a}$; &c. $+ 2ax - xx + \frac{2x^3}{3a}$; &c.

Eodem pacto, si sumpsissẽm AB , aut X pro Lineâ definitâ, ha-
 buissẽm $\boxed{\frac{aa}{X}} - \boxed{\frac{aa}{x}} = \frac{aay}{X} + \frac{aay^2}{2XX} + \frac{aay^3}{3X^3} + \frac{aay^4}{4X^4}$;

&c.

TAB. VI.

Quinimo, si (*Fig. 37.*) Bb bisecaretur in C , & AC assume-
 retur definitæ Longitudinis, & Cb ac CB indefinitæ; fac AC
 $= e$; & bC , aut $CB = y$, erit $bd = \frac{aa}{e-y} = \frac{aa}{e} + \frac{aay}{ee}$

$+ \frac{aay^2}{e^3} + \frac{aay^3}{e^4} + \frac{aay^4}{e^5}$; &c. quapropter Area Hyperbolica ad-

jacens Abscissæ parti bC , erit $= \frac{aay}{e} + \frac{aay^2}{2ee} + \frac{aay^3}{3e^3} + \frac{aay^4}{4e^4}$
 $+ \frac{aay^5}{5e^5}$; &c. Sed etiam $BD = \frac{aa}{e+y} = \frac{aa}{e} - \frac{aay}{ee} + \frac{aay^2}{e^3}$

$- \frac{aay^3}{e^4} + \frac{aay^4}{e^5}$; &c. & idcirco Area adjacens alteri Abscissæ parti

$BC = \frac{aay}{e} - \frac{aay^2}{2ee} + \frac{aay^3}{3e^3} - \frac{aay^4}{4e^4} + \frac{aay^5}{5e^5}$; &c. Ergo sum-

ma harum Arcarum $= \frac{2aay}{e} + \frac{2aay^3}{2e^3} + \frac{2aay^5}{5e^5}$; &c. æquiva-

lebit ipfi $\boxed{\frac{aa}{X}} - \boxed{\frac{aa}{x}}$.

Sic.

Sic Aequationis $z^3 + z^2 + z - x^3 = 0$, denotantis naturam Curvæ, Radix est $z = x - \frac{1}{3} - \frac{2}{9x} + \frac{7}{81xx} + \frac{5}{81x^3}$; &c.

Unde conficitur $z = \frac{1}{2}xx - \frac{x}{3} - \frac{\frac{2}{9x}}{\frac{2}{9x}} - \frac{7}{81x} - \frac{5}{162xx}$; &c. Et Area $b d D B = \frac{1}{2} X X - \frac{1}{3} X - \frac{\frac{2}{9X}}{\frac{2}{9X}} - \frac{7}{81X} - \frac{5}{162XX}$; &c. $= \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x + \frac{\frac{2}{9x}}{\frac{2}{9x}} + \frac{7}{81x} + \frac{5}{162xx}$; &c, id est, $= \frac{1}{2} X X - \frac{1}{3} X - \frac{7}{81X}$; &c; $= \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x + \frac{7}{81x}$; &c. $= \frac{4y}{9e} - \frac{4y^3}{27e^3} - \frac{4y^5}{45e^5}$; &c.

Sed hi Termini Hyperbolici plerumque, & summo quidem commodo, possunt evitari immutato Abscissæ initio, id est, ipsamet Abscissâ auctâ, vel diminutâ Quantitate aliquâ datâ. Ut, in primo Exemplo, in quo $\frac{a^3 - aax}{ax + xx} = z$ erat Aequatio ad Curvam, si ponerem initium Abscissæ ad Punctum b , & assumptâ Ab alicujus datæ Longitudinis, $\frac{1}{2}a$, scriberem x pro reliquâ Abscissâ Bb ; videlicet, si minuerem Abscissam Quantitate $\frac{1}{2}a$, scribens $x + \frac{1}{2}a$

pro x , Aequatio evaderet $\frac{\frac{1}{2}a^3 - aax}{\frac{1}{2}aa + 2ax + xx} = z$; & (per Divisionem) $z = \frac{2}{3}a - \frac{28}{9}x + \frac{200xx}{27a}$; &c., unde fit $z = \frac{2}{3}ax - \frac{14}{9}xx + \frac{200}{81a}x^3$; &c. $=$ Area $b d D B$.

Et sic, modò initium Abscissæ ponatur nunc ad hoc, nunc ad illud Punctum, Area Curvæ potest exprimi modis infinitis.

Etiam Aequatio $\frac{a^3 - aax}{ax + xx} = z$ poterat resolvi in duas infinitas

T 2

Series

Series $z = \frac{a^3}{xx} - \frac{a^4}{x^3} + \frac{a^5}{x^4}; \&c; - a + x - \frac{xx}{a} + \frac{x^3}{a \cdot a};$

&c. ubi nullus invenitur Terminus divisus per primam Potestatem ipsius x . Sed genus hoc Serierum, in quarum una x in infinitum ascendit in Numeratoribus, & in altera in Denominatoribus, aptæ non sunt ad obtinendum ex iis valorem z , per Calculum arithmeticum, quando Species convertuntur in Numeros.

Si quis, postquam consecutus fuerit Areæ valorem in Speciebus, aggrediatur Calculum numericum, is non faciliè in difficultates incidet. Attamen, ut major lux superioribus affundatur, addam unum, aut alterum Exemplum.

TAB. VI. Proponatur (Fig. 32.) Hyperbola AD, cujus Aequatio quidem

est $\sqrt{x+xx} = z$, Vertex autem A, & uterque Axis æqualis Unitati. Juxta ea, quæ supra attulimus, Area ADB $= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}}$
 $= \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}} - \frac{5}{704} x^{\frac{11}{2}}; \&c.$, id est, ea æquat $x^{\frac{1}{2}}$ in
 $\frac{2}{3} x + \frac{1}{5} xx - \frac{1}{28} x^3 + \frac{1}{72} x^4 - \frac{5}{704} x^5; \&c.$, quæ Series in infinitum produci potest, multiplicando ultimum Terminum, per successivos Terminos hujus Progressionis $\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 5} x; \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 7} x;$
 $-\frac{3 \cdot 7}{6 \cdot 9} x; -\frac{5 \cdot 9}{8 \cdot 11} x; -\frac{7 \cdot 11}{10 \cdot 13} x; \&c.$ Id est, primus Terminus $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \times \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 5} x$ dat secundum Terminum $\frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}}; \text{ Hic autem}$
multiplicatus per $-\frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 7} x$ conficit tertium $-\frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}}; \text{ Qui rursus}$
multiplicatus per $-\frac{3 \cdot 7}{6 \cdot 9} x$ facit $\frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}}$ quartum; & sic in infinitum.

Jam, tribuatur ipsi AB data quævis Longitudo, puta, $\frac{1}{4}$ & pro x scribatur hic Numerus, ejusque Radix $\frac{1}{2}$ pro $x^{\frac{1}{2}}$: tunc primus Terminus $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$, aut $\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}$ reductus ad Fractiones decimales

evadit

evadit 0,0833333333; &c. Hic in $\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}$ ductus conficit 0,00625
 secundum Terminum; Qui ductus in $\frac{-1 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 7}$ præbet — 0,0002790178;
 &c., tertium Terminum. Atque ita porrò. At in duas Tabulas
 distribuo Terminos, quos ita gradatim invenio; ponens Affirmati-
 vos in earum unâ, negativos autem in alterâ, & illos addo, ut hic
 factum vides.

+ 0,0833333333333333	— 0,0002790178571429
6250000000000000	34679066051
2712673611111111	834465027
5135169396	26285354
144628917	961296
4954581	38676
190948	1663
7963	75
352	4
16	— 0,0002825719389575
1	+ 0,0896109885646518
+ 0,0896109885646518	0,0893284166257043

Deinde ex Affirmativorum summâ detraho summam negativorum;
 superest 0,0893284166257043, quæ est Quantitas Areæ hyper-
 bolicæ ADB. Quod erat inveniendum.

Nunc, proponatur (Fig. 39.) Circulus A d F qui exprimitur TAB. VI.

Æquatione $\sqrt{x - xx} = z$, cujus nempe Diameter Unitas est, ac

(juxta jam dicta) ejus Area A d B erit $\frac{2}{2} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}}$

— $\frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}}$; &c. Cum autem in hac Serie, Termini nullo pacto

differant à Terminis Seriei, quâ superius exposita fuit Area hyper-
 bolica, nisi signis + & —; tantum connectendi, supersunt iidem
 Termini cum diversis signis; Subtrahendum est, scilicet, Aggregatum
 ex ambabus superiorum Tabularum Summis 0,0898935605036193.

T 3.

ex.

ex duplo primi Termini 0, 1666666666666666; &c., & quod restat, nempe, 0, 0767731061630473 erit pars A δ B Areæ circularis, supposita Recta AB quadrante Diametri. Hinc observare potes, quòd, licet Area circularis cum hyperbolica conferri nequeat, geometricè rem considerando, tamen ambas deteximus eodem Calculo arithmetico.

Circuli parte A δ D sic inventa, hinc erui potest tota Area. Etenim age Radium δ C, & multiplica B δ , aut $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ in BC vel $\frac{1}{4}$, & Producti semissis, id est, $\frac{1}{32}\sqrt{3}$, aut 0, 0541265877365275 erit valor Trianguli C δ B; hoc adde Areæ A δ B, & assequeris Sectorem AC δ = 0, 1308996938995747, qui sextuplicatus, id est, 0, 7853981633974482 dabit totam Aream.

Hinc, obiter, detegetur Longitudo Peripheriæ, (quæ erit 3, 1415926535897928,) dividendo scilicet Aream per Diametri quadrantem.

His addere libet Calculum Areæ comprehensæ inter Hyperbolam TAB. VI. δ FD (Fig. 40.) & ejus Asymptotum CA. Sit C Hyperbolæ Centrum,

& faciendo CA = a , AF = b , & AB = Ab = x : erit $\frac{ab}{a+x}$ = BD & $\frac{ab}{a-x} = b\delta$; igitur Area AFD B = $bx - \frac{bx^2}{2a} + \frac{bx^3}{3aa} - \frac{bx^4}{4a^3}$; &c., & Area AF δ b = $bx + \frac{bx^2}{2a} + \frac{bx^3}{3aa} + \frac{bx^4}{4a^3}$; &c., earumque Summa δ b BD = $2bx + \frac{2bx^2}{3aa} + \frac{2bx^3}{5a^4} + \frac{2bx^4}{7a^6}$;

&c. Jam suppone AC = AF = 1 & AB aut Ab = $\frac{1}{10}$; existentibus Cb = 0,9, & CB = 1,1, ac substituendo hos Números pro a , b , & x , primus Seriei Terminus evadit 0,2, secundus 0,0006666666 &c., tertius 0,000004, & sic deinceps, ut vides in appositâ Tabellâ.

0,2000000000000000
 66666666666666
 400000000000
 285714286
 2222222
 18182
 154
 1

Summa 0,2006706954621511 = Area $b d' D B$.

Si seorsum habere velles Areae partes $A d'$ & $A D$, subduc mino-
 rem $A B$ ex majore $A d'$, & superesse perspicias $\frac{bxx}{a} + \frac{bx^4}{2a^3} + \frac{bx^6}{3a^5}$
 $+ \frac{bx^8}{4a^7}$; &c., ubi scriptis 1 pro a & b , ac $\frac{1}{10}$ pro x & Terminis
 ad Fractiones decimales revocatis, habebis.

0,0100000000000000
 500000000000
 3333333333
 25000000
 200000
 1667
 14

Summa 0,0100503358535014 = $A d' - A D$.

Jam, si hæc Arearum Differentia addatur earum Summæ jam
 repertæ, aut ab eâ subtrahatur, dimidium Aggregatum 0,105360
 5156578263 erit Area major $A d'$, & demidium reliquum 0,095
 3101798043248 erit minor Area $A D$.

Quin, tametsi supponas $A B$ & $A b = \frac{1}{100}$, vel $C B = 1,01$
 & $C b = 0,99$, excudere potes ex iisdem Tabulis Areas istas $A D$
 & $A d'$ dummodò Numeros legitime transferas in inferiora loca, ut
 hic factum vides.

Q

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 173.

Additionem reperies 1, 6093379124341004 = $AF\delta\beta$, quando $CB = 5$; & 2,3025850929940457 = $AF\delta\beta$, cum $CB = 10$.

Sic pariter, quia $10 \times 10 = 100$, & $10 \times 100 = 1000$, ac $\sqrt{5} \times 10 \times 0,98 = 7$, ac $10 \times 1,1 = 11$, ac $\frac{1000 \times 1,001}{7 \times 11} = 13$.

ac $\frac{100 \times 0,998}{2} = 499$, palam est quòd Area $AF\delta\beta$ reperiri potest per compositionem Arearum supra inventarum, quando $C\beta = 100$; 1000; 7, aut cuivis alteri supra dictorum Numerorum, stante semper $AB = BF = 1$.

Hæc ad id spectant, ut palam fiat, quòd hinc deduci potest Methodus valde concinna, quâ construi potest Canon Logarithmorum, qui determinant Areas hyperbolicas, (è quibus Areis erui facile possunt Logarithmi) & qui respondent Numeris primitivis quotquot sunt, & id solum per duas Operationes non nimis perplexas.

Sed, cum hic Canon ex hoc fonte melius quàm ex alio quolibet derivari videatur, quid fiet, si eorum Constructionem hic indico, quò magis perfectum sit opus?

Primum igitur, assumptis 0 pro Logarithmo Numeri 1, & 1 pro Logarithmo Numeri 10, ut vulgò fit, Logarithmi Numerorum primitivorum 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 37, investigandi sunt, dividendo Areas Hyperbolicas nuper inventas per 2,3025850929940457, quæ est Area respondens Numero 10: vel, (quod idem est,) multiplicando eas per hujus reciprocam 0,4342944819032518.

Sic, *ex.gr.*, si 0,69314718, &c., est Area respondens Numero 2, ea multiplicata per 0,43429 &c., facit 0,3010299956639814 Logarithmum Numeri 2.

Deinde Logarithmi aliorum Numerorum, qui sunt in Canone, & qui componuntur horum Multiplicatione, inveniendi sunt per Additionem Logarithmorum ad eos pertinentium, ut fieri solet. Ac loca inania postea sunt interpolanda ope sequentis Theorematis.

T H E O R. I.

Sit n Numerus, cui Logarithmus aptari debet, & x differentia inter hunc & duos proximos Numeros æqualiter utrinque distitos,
H. Newtoni Opuscula, Tom. I. V &

& quorum Logarithmi jam inventi sint, & fit d dimidiata Logarithmorum differentia. Tunc optatus Numeri n Logarithmus obtinebitur addendo Quantitatem $d + \frac{dx}{2n} + \frac{dx^2}{12n^2}$ &c. Logarithmo minoris Numeri.

Nam, si Numeri exponantur per Cp , $C\beta$ & CP ; & fit Rectangulum CBD aut $C\beta d = 1$, ut antea; & agantur Ordinatae pq & PQ ; scribatur n pro $C\beta$, & x pro βp aut βP , Area $pqQP$ aut $\frac{2x}{n} + \frac{2x^2}{3n^2} + \frac{2x^3}{5n^3}$; &c., erit ad Aream $pq d\beta$ aut $\frac{x}{n} + \frac{xx}{2nn} + \frac{x^2}{3n^2}$; &c. ut differentia quæ est inter extremorum Numerorum Logarithmos, vel $2d$, ad differentiam quæ est inter Logarithmos mi-

noris & mediæ, quæ idcirco erit $\frac{\frac{dx}{n} + \frac{dx^2}{2nn} + \frac{dx^3}{3n^2}}{\frac{x}{n} + \frac{xx}{2nn} + \frac{x^2}{3n^2}}$; &c. id est (fac-

tâ Divisione) $d + \frac{dx}{2n} + \frac{dx^2}{12n^2}$; &c.

Hujus Series duo primi Termini $d + \frac{dx}{n}$ erunt, puto, satis accurati ad construendum Canonem Logarithmorum, quanquam Logarithmæ ad quatuordecim vel quindecim Figuras usque producendæ forent; dummodò tamen Numeri, quorum Logarithmi sunt inveniendi, non sint infra 1000. Quod vix molestiam facessere posset ei qui computat, quia x passim unitas est aut binarium. Sed tamen non necessario loca omnia interpolanda sunt per hanc Regulam. Nam, Logarithmi Numerorum, qui constantur per Multiplicationem aut Divisionem Numerorum jam inventorum, excudi possunt ex Numeris, quorum Logarithmi reperti jam sunt, addendo scilicet, aut subducendo Logarithmos istos. Quinimo etiam per Logarithmorum differentias primas, secundas, tertias, &c., si res postulat, impleri possunt loca inania, & quidem expedite, Superior autem Regula solum adhibenda est, quando plura loca plena deinceps desunt, ut sic inveniuntur eorum differentia.

Eadem Methodo possunt inveniri Regulae, pro Logarithmorum interca-

intercalatione, quando ex tribus Numeris dantur Logarithmi, pertinentes ad medium & minimum, aut ad medium & maximum, quamquam Numeri non constituent arithmeticam Progressionem.

Quinetiam, facile, hujus Methodi vestigia premendo detegi possunt Regulæ utiles ad construendas Tabulas Sinuum & Tangentium artificialium sine naturalium auxilio: Sed hæc obiter.

Hactenus locuti sumus de Quadraturâ Curvarum, quæ exprimentur Aequationibus constantibus ex Terminis complicatis, & id per harum Aequationum Reductionem, ad alias quæ constanter infinito simplicium Terminorum numero. Cùm autem hæ Curvæ possint aliquando quadrari etiam per Aequationes finitas, aut quomodocumque comparari cum aliis Curvis, quarum Areæ quodam modo haberi possunt pro datis; cujus generis sunt Sectiones conicæ. Ideo non extra rem putavi hic afferre duos sequentes Catalogos, aut Tabulas Theorematum, quas pollicitus eram, quasque construxi ope superiorum Propositionum VII. & VIII.

Harum Tabularum prima exhibet Areas Curvarum quæ quadrari possunt. Secunda verò continet Curvas, quarum Areæ conferri possunt cum Sectionum conicarum Areis. In utrâque litteræ d ; e ; f ; g ; h , denotant datas Quantitates quascumque, x & z Curvarum Abscissas, y & y Ordinatæ parallelas, s & t Areas, ut prius. Sed litteræ η & θ adnexæ x , indicant Numerum Dimensionum ipsius x , sive is sit integer, sive fractus, sive affirmativus sive negativus: Ut si $\eta = 3$, tunc

$$x^\eta = x^3; x^{2\eta} = x^6, x^{-\eta} = x^{-3} \text{ aut } \frac{1}{x^3}; x^{\eta+1} = x^4;$$

$$\& x^{\eta-1} = x^2.$$

Præterea in Arearum valoribus scripsi, brevitatæ causâ, R pro Radicalibus $\sqrt{s + fz^\eta}$ aut $\sqrt{e + fz^\eta + g z^{2\eta}}$, & p pro $\sqrt{h + iz^\eta}$, quibus afficitur valor Ordinatæ y .

V

Tabula I.

Tabula I. continens aliquas Areas Curvilineas relatas ad rectilin. Figuras, constructa per Probl. VII.

Ordo Curvarum		Arearum Valor	
I	$dz^{\eta-1} = y$	$\frac{d}{\eta} z^{\eta} = t$	
II	$\frac{dz^{\eta-1}}{ce + 2efz^{\eta} + ffz^{2\eta}} = y$	$\frac{dz^{\eta}}{\eta ce + \eta efz^{\eta}} = t$, aut $\frac{dz}{\eta ef + \eta ffz^{\eta}} = t$.	
III	1 $\frac{dz^{\eta-1}}{dz^{\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{2d}{3\eta f} R^{\eta} = t$	
	2 $\frac{dz^{2\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}}{dz^{2\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{-4e + 6fz^{\eta}}{15\eta ff} dR^{\eta} = t$	
	3 $\frac{dz^{3\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}}{dz^{3\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{16ce - 24efz^{\eta} + 30ffz^{2\eta}}{105\eta f^3} dR^{\eta} = t$	
	4 $\frac{dz^{4\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}}{dz^{4\eta-1} \sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{-96e^3 + 144cefz^{\eta} - 180effz^{2\eta} + 210f^3z^{3\eta}}{945\eta f^6} dR^{\eta} = t$	
IV	1 $\frac{dz^{\eta-1}}{\sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{2d}{\eta f} R = t$	
	2 $\frac{dz^{2\eta-1}}{\sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{-4e + 2fz^{\eta}}{3\eta ff} dR = t$	
	3 $\frac{dz^{3\eta-1}}{\sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{16ce - 8efz^{\eta} + 6ffz^{2\eta}}{15\eta f^3} dR = t$	
	4 $\frac{dz^{4\eta-1}}{\sqrt{ce + fz^{\eta}}} = y$	$\frac{-96e^3 + 48cefa^{\eta} - 36effz^{2\eta} + 30f^3z^{3\eta}}{105\eta f^6} dR = t$	

Ordo Curvarum		Arearum Valor
V	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta f_2^{\theta+1} - 1 \\ + 3\eta f \end{array} \quad *$	$z^{\theta} R^3 = f$
	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta f_2^{\theta+1} - 1 \\ + 3\eta f \end{array} \quad * \quad \begin{array}{l} \text{in } \frac{1}{2} \sqrt{c+f_2^2} = y \\ \text{in } \frac{1}{2} \sqrt{c+f_2^2} + g_2^2 \theta + 2\eta - 1 \\ + 6\eta g \end{array}$	$z^{\theta} R^3 = f$
VI	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + \eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{2\sqrt{c+f_2^2}}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + \eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = y \end{array}$	$z^{\theta} R = f$
	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + \eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{2\sqrt{c+f_2^2} + g_2^2 \theta}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + \eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = y \end{array}$	$z^{\theta} R = f$
VII	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - \eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{c+f_2^2 \theta \times 2\sqrt{c+f_2^2}}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - \eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = y \end{array}$	$\frac{z^{\theta}}{R} = f$
	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - \eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{c+f_2^2 \theta \times 2\sqrt{c+f_2^2} + g_2^2 \theta}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - \eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = y \end{array}$	$\frac{z^{\theta}}{R} = f$
VIII	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - 2\eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{cc + 2cf_2^2 \theta + ff_2^{2\theta}}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - 2\eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = 2y \end{array}$	$\frac{z^{\theta}}{RR} \text{ aut } \left(\frac{z^{\theta}}{c+f_2^2 \theta} \right) = f$
	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - 2\eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ \frac{cc + 2cf_2^2 \theta + ff_2^{2\theta}}{2\theta c^{\theta-1} + 2\theta - 2\eta \times f_2^{\theta+1} - 1} = 2y \end{array}$	$\frac{z^{\theta}}{RR} \text{ aut } \frac{z^{\theta}}{c+f_2^2 \theta + g_2^2 \theta} = f$
IX	$\begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + 3\eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ + 2\theta + \eta \times c \end{array} \quad \text{in } \frac{\sqrt{c+f_2^2}}{2\sqrt{b+iz^2}} = y$	$z^{\theta} R^3 p = f$
X	$\begin{array}{l} 2\theta c^{\theta-1} + 2\theta + 3\eta \times f_2^{\theta+1} - 1 \\ + 2\theta - \eta \times c \end{array} \quad \text{in } \frac{\sqrt{c+f_2^2}}{b+iz^2 \times \sqrt{b+iz^2}} = y$	$\frac{z^{\theta} R^3}{p} = f$

Addere potuisssem alia plura ejusdem generis: sed jam transire libet ad aliud Curvarum genus, quæ cum Sectionibus conicis comparari possunt. Curvæ omnes, de quibus agit sequens Catalogus aut Tabula, repræsentantur (*Fig. 41.*) Lineis QER . Harum Abscissæ incipiunt ab A , & sunt AC , Ordinatæ CE , initium Areæ $\alpha\chi$, & Areæ descripta $\alpha\chi EC$. At initium Areæ, vel primus Terminus (qui plerumque aut initium ducit ab Abscissæ initio A , aut ab eo distat per infinitum intervallum,) invenitur repertâ Longitudine Abscissæ $A\alpha$, cum Areæ valor evanescit & erectâ Perpendiculari $\alpha\chi$.

TAB. VI. Eodem pacto habes Sectiones conicas repræsentatas (*Fig. 42. N^{os} 1.2.3.4.*) Lineis PDG quarum Centrum est A , Vertex α , Semidiametri rectangulares $A\alpha$ & AP , initium Abscissæ A aut α aut α , Abscissa AB vel αB vel αB , Ordinata BD , Tangens DT , quæ occurrit ipsi AB in T , subtensa αD , & Rectangulum inscriptum aut circumscriptum $ABDO$.

Servatis igitur symbolis supra constitutis, erit $AC = x$; $CE = y$; $\alpha\chi EC = s$; AB vel $\alpha B = x$; $BD = u$; & $ABDP$ aut $\alpha GDB = s$. Et præterea, si quando duæ Sectiones conicæ necessariae erunt ad Aream aliquam determinandam; Area secunda dicetur σ , ejus Abscissa ξ , & Ordinata γ . Ponitur autem p pro $\sqrt{ff - 4gs}$.

Tab. II.

	I
VII {	2
	3
	4

THE [illegible] OF [illegible]

[The main body of the page contains several paragraphs of text that are extremely faint and mostly illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into sections, possibly separated by headings or subheadings, but the specific words and sentences cannot be discerned.]

Antequam ad Exemplis illustranda Theoremata in hisce Curvarum classibus tradita pertranseam, observandum puto, quòd.

I.

Cùm in Aequationibus Curvas exprimentibus semper posuerim omnia Quantitatum d ; e ; f ; g ; h ; & i , signa affirmativa, si quando ea negativa occurrunt, mutanda sunt in subsequentijs valoribus Abscissæ & Ordinatæ ad conicam Sectionem pertinentium, atque etiam. Areæ quæsitæ.

II.

Quinetiam cùm signa symbolorum Numeralium η & θ negativa sunt, mutari debent in Arearum valoribus. His autem signis mutatis, Theoremata ipsa novam formam induunt.

Sic, si signum ipsius η mutetur in quartâ formâ Tabulæ II, tertium

Theorema evadit $\frac{d}{z^{2\eta+1}\sqrt{e+fz-\eta}} = y$; $\frac{x}{z-\eta} = x$,

&c., id est, $\frac{dz^{3\eta-1}}{\sqrt{e z^{2\eta} + f z^\eta}} = y$; $z^\eta = x$; $\sqrt{fx + exx} = u$;

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2ux-3} = z$. Quod in ceteris quoque observandum est

III.

Series singulorum ordinum, præter secundum Tabulæ I, continuari in infinitum utrimque possunt. Etenim in Seriebus tertii & quarti ordinis Tabulæ I. Numerales primorum Terminorum Coefficientes (2; — 4; 16; — 96; 768; &c.) constanter continuâ Multiplicatione Numerorum — 2; — 4; — 6; — 8; — 10; &c., & Coefficientes sequentium Terminorum deducuntur ex priorum Coefficientibus, in tertio quidem ordine, eos gradatim multipli-

cando per — $\frac{3}{2}$; — $\frac{5}{4}$; — $\frac{7}{6}$; — $\frac{9}{8}$; — $\frac{11}{10}$; — $\frac{13}{12}$; &c.,

&c., & in quarto per $-\frac{1}{2}$; $-\frac{3}{4}$; $-\frac{5}{6}$; $-\frac{7}{8}$; $-\frac{9}{10}$; $-\frac{11}{12}$; &c.; At Denominatorum Coefficientes 1; 3; 15; 105; &c., conficiuntur invicem gradatim multiplicando Numeros 1; 3; 5; 7; 9; &c.

Veniamus ad Tabulam II. Series Ordinum primi, secundi, tertii, quarti, noni, & decimi, in infinitum producantur solâ Divisione.

Habes, *ex. gr.* in primo ordine $\frac{dz^{4\eta-1}}{e+fz^\eta} = y$; unde, si

Divisionem protrahas ad convenientem periodum, assequeris

$$\frac{d}{f} z^{3\eta-1} - \frac{de}{ff} z^{2\eta-1} + \frac{dee}{fff} z^{\eta-1} - \frac{\frac{de^3}{f^3} z^{\eta-1}}{e+fz^\eta} = y.$$

Tres primi Termipi spectant ad primum Ordinem Tabulæ I. & quartus ad primam Speciem hujus Ordinis. Hinc patet quod Area est

$$\frac{d}{3\eta f} z^{3\eta} - \frac{de}{2\eta ff} z^{2\eta} + \frac{dee}{\eta f^3} z^\eta - \frac{e^3}{\eta f^3} s, \text{ ponendo } s \text{ pro}$$

Area Sectionis conicæ, cujus Abscissa est $x = z^\eta$ & Ordinata z

$$= \frac{d}{e+fz^\eta}.$$

Series autem Ordinum quinti & sexti continuari possunt in infinitum ope duorum Theorematum constituentium quintum Ordinem Tabulæ I. per legitimam Additionem & Subtractionem. Series autem septimi & octavi ope Theorematum sexti Ordinis Tabulæ I. & Series undecimi, auxilio Theorematis decimi Ordinis ejusdem Tabulæ I.

Continuanda sit, *ex. gr.*, Series tertii Ordinis Tabulæ II. suppone $\theta = -4\eta$, & primum Theorema quinti Ordinis Tabulæ I. fiet

$$-8\eta e z^{-4\eta-1} - 5\eta f z^{-3\eta-1} \times \frac{1}{2} \sqrt{e+fz^\eta} = y; \frac{R^3}{z^{4\eta}} = z.$$

Sed juxta quartum Theorema hujus Series producendæ, scribendo

$$-\frac{5\eta f}{2} \text{ pro } d, \text{ est } -\frac{5\eta f z^{-3\eta-1}}{2} \sqrt{e+fz^\eta} = y; \frac{1}{z^\eta} = x;$$

$$\sqrt{fx}$$



11

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 161

$$\begin{aligned} \sqrt{fx+cx} &= u; \& \frac{10fu^3 - 15ffs}{12e} = t, \text{ ergo subtrahendo primos} \\ \text{valores } y \& t, \text{ superest } 4gez^{-4\eta-1} \sqrt{e+fz^\eta} &= y; \frac{10fu^3 - 15ffs}{12e} \\ - \frac{R^3}{2^{4\eta}} &= s. \text{ His multiplicatis per } \frac{d}{4\eta e}, \& (\text{ si libet }) \text{ pro } \frac{R^3}{2^{4\eta}} \\ \text{scripto } u^3 x, \text{ prodibit quintum Theorema Seriei producendæ, nempe} \\ \frac{d}{2^{4\eta+1}} \sqrt{e+fz^\eta} &= y; \frac{1}{2^\eta} = x; \sqrt{fx+cx} = u; \& \frac{10dfu^3 - 15dffs}{48\eta ee} \\ - \frac{d11^3 x}{4\eta e} &= s. \end{aligned}$$

I V.

Plures ex his Ordinibus possunt etiam aliter ex aliis excudi. Sic, in Tabulâ II. quintus, sextus, septimus, & undecimus ex octavo, & nonus ex decimo: Ita ut eos omisisse potuissem, nisi possent esse alicujus utilitatis, quamquam non omninò necessarij sint. Omisi tamen plures Ordines quos educere potuissem ex primo & secundo, ut & ex nono & decimo ob Denominatores complicatos nimis, quibus afficiuntur, quâ de causâ non facilè utiles esse possunt.

V.

Si Æquatio Curvam definiens composita est ex pluribus Æquationibus diversorum Ordinum aut diversarum Specierum ejusdem ordinis, ejus Area pariter composita erit ex correspondentibus Areis. Semper autem curandum est ut eæ rectè connectantur aptis signis. Nam, non semper unâ addendæ, aut subducendæ sunt Ordinatæ ex Ordinatis, & correspondentes Areæ ex Areis; sed aliquando harum summa, & illarum Differentia sumi debet ad constituendam novam Ordinatam aut Aream correspondentem. Et hoc fieri debet, quando Areæ positæ sunt ad contrarias Ordinatæ partes. Sed ut cautus Geometra faciliùs vitare possit hos scopulos, præfixi apta signa variis Arearum valoribus, licèt aliquando eæ forent negativæ, ut feci in quinto & septimo Ordine Tabulæ II.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

X

V L.

V I.

Præterea, circa Arearum Signa animadvertendum est, quòd $+s$ æquè denotat, aut quòd Area Sectionis conicæ pertinens ad Abscissam, de quâ agitur, addi debet alteri Quantitati in valore ipsius s ; (vide primum ex Exemplis sequentibus); aut quòd subtrahi debet Area posita ad alteram ab Ordinatâ partem. Et vice versâ — s ambigüè denotat tum, quòd Area adjacens Abscissæ subtrahenda est, tum, quòd Area ad alteram Ordinatæ partem posita, addenda est, ut conveniens videtur. Pariter valor ipsius s , si prodit affirmativus, indicat Aream Curvæ adjacere Abscissæ; Et è contra, si negativus est, eam jacere ad alteram ab Ordinatâ partem.

V I I.

Sed, ut hæc Area certius definiatur, quærendi tibi sunt ejus Limites. Hi autem Limites, (quod spectat ad Abscissam, Ordinatam, & Curvæ Perimetrum,) incerti, aut ambigui nequeunt esse; Sed Limes initialis, aut initium unde Curva incipit describi, habere potest plures situs. In Exemplis sequentibus, Limes hic est aut ad initium Abscissæ, aut ab eo distat intervallo infinito, aut ad Punctum, in quo Curva concurrit cum Abscissâ. At esse potest ubicunque; &, ubicunque tamen ille sit, inveniri potest quærendo Longitudinem, quâ gaudet Abscissâ quando valor ipsius s nihilo æqualis est, & inde agendo Ordinatam. Nam, Ordinata sic ducta erit Limes quæsitus.

V I I I.

Si aliqua pars Areæ jacet infra Abscissam, s indicat differentiam hujus partis, ab illâ, quæ est supra Abscissam.

I X.

Si quando in valoribus ipsarum x ; y ; & s ; Terminorum Dimensiones aut nimium ascendunt, aut nimium descendunt, revocari pos-

possunt ad justum gradum, Terminos aliquâ datâ Quantitate, quæ concipi potest fungi munere Unitatis, toties dividendo, aut multiplicando, quoties opus est ad Exponentes æquandos.

X.

Præter superiores Catalogos aut Tabulas, construi possunt Tabulæ Curvarum relatarum ad alias Curvas, in suo genere, simpliciores; puta ad $\sqrt{a+fx^2} = u$; aut ad $x\sqrt{e+fx^2} = u$; aut ad $\sqrt{e+fx^4} = u$; &c. Ita ut simul derivare liceat Aream Curvæ propositæ ex modulo simpliciori, & noscere ad quas Curvas ea referatur. Sed jam, quæ supra tradidimus, Exemplis illustremus.

E X E M P L. I.

Sit (Fig. 43.) QER Curva Conchoïdalis ejus naturæ, ut descripto Semicirculo QHA, & actâ AC Perpendiculari ad Diametrum AQ, si compleatur Parallelogrammum QACI, & ducatur ejus Diagonalis AI, quæ Semicirculum secat in H, ac demittatur ex H super IC ad rectos Angulos HE, Punctum E tangat hanc Curvam, cujus quæritur Area ACEQ. TAB. VII.

Idcirco fac $AQ = a$; $AC = z$; $CE = y$; &, ob continuè Proportionales IA; AQ; HA; EC, erit EC, aut $y = \frac{a^3}{aa+zz}$.

Nunc, ut hæc Æquatio induat formam illarum, quæ sunt in Tabulis, pone $\eta = 2$; & pro z^2 scribe in Denominatore z^η ; atque in Numeratore $a^3 z^{\frac{1}{2}\eta-1}$ pro a^3 , aut $a^3 z^{1-1}$, unde orietur $y = \frac{a^3 z^{\frac{1}{2}\eta-1}}{aa+z^\eta}$, Æquatio primæ Speciei secundi Ordinis Tabulæ II, &, per Comparationem Terminorum, habebis $d = a^3$;

$e = aa$; & $f = 1$; quapropter $\sqrt{\frac{a^3}{aa+zz}} = x$; $\sqrt{a^3 - aaxx} = u$;

& $ux - 2s = t$. Jam, ut inventi valores x , & u , redigantur ad justum Dimensionum numerum, elige aliquam datam Quantita-

tem, ut a , per quam, tanquam per Unitatem in valore ipsius x , semel a^3 multiplicetur, in valore autem u , dividantur

a^3 quidem semel, sed $aaxx$ bis. Unde obtinebis $\sqrt{\frac{a^4}{aa+zz}} = x$;

$\sqrt{aa-xx} = u$; & $ux - 2s = s$: En autem Constructionem.

Centro A, Radio AQ describe Circuli Quadrantem QDP; ex AC abscinde AB = AH, educ Perpendicularem BD Arcui occurrentem in D, & junge AD. Dico, quòd duplex Sector ADP æquat Aream quæsitam ACEQ. Nam, quia $\sqrt{\frac{a^4}{aa+zz}} = (\sqrt{AQ \times EC} = HA =) AB = x$; & $\sqrt{aa-xx} = (\sqrt{ADq - Aqg} =) BD$ aut u ; atque $ux - 2s =$ bis Triang. ADB — 2ABDQ; aut = bis Triang. ADB + 2BDP; hæc Area est æqualis sive — 2QAD, sive + 2DAP; Quorum valorum affirmativus 2DAP, pertinet ad Aream ACEQ hinc ab EC; & negativus — 2QAD ad Aream RCER, quæ in infinitum protenditur ultra EC.

At hæ Problematum Solutiones ita repertæ aliquando majori elegantia donari possunt. Ut nunc, ductâ HR Semidiametro Circuli QHA, erit, ob æquales Arcus QH, & DP, Sector QHR semis Sectoris DAP, & ideo Quadrans Superficieci ACEQ.

EXEMPLUM II.

TAB. VII. Sit (Fig. 44.) AGE Curva descripta à Puncto E, quod est ad Verticem Anguli recti AEF, cujus alterum latus AE indefinitum semper transit per datum Punctum A, alterum verò FE datæ Longitudinis labitur super indefinitam Rectam AF positione datam; Demitte EH ad rectos Angulos super AF, & comple Parallelogrammum AHEC; Jam distis AC = z ; CE = y ; & EF = a ; Quia FH; HE; HA sunt in proportionem continuâ, erit HA aut

$$y = \frac{zz}{\sqrt{aa-zz}}.$$

Nunc, ut cognoscamus Aream AGE, pone $zz = z^2$; aut $z = r$;

$z = \eta$; quapropter erit $\frac{z^{\frac{3}{2}\eta - 1}}{\sqrt{aa - z^\eta}} = y$. Cum autem hic z habeat in Numeratore fractam Dimensionem, deprime valorem y , cum dividendo per $z^{\frac{1}{2}\eta}$, & obtinebis $\frac{z^{\eta - 1}}{\sqrt{aa z^{-\eta} - 1}} = y$, Æquationem secundæ Speciei septimi Ordinis Tabulæ II. Terminis autem comparatis, invenimus $d = 1$; $e = -1$; & $f = aa$.

Est igitur $zx = \left(\frac{1}{z^{-\eta}}\right)xx$; $\sqrt{aa - xx} = u$; & $s - ux = t$. Quapropter, cum x , & z simul æquantur, & cum $\sqrt{aa - xx} = u$ fit Æquatio ad Circulum, cujus Semidiameter est a , Centro A, Radio EF, aut a , describe Circulum PDQ, quem CE secet in D, & compleatur Parallelogrammum ACDI; Tunc erit $AC = z$; $CD = u$; & Area quæsita AGE C $= s - ux = ACDP - ACDI = IDP$.

E X E M P L. III.

Sit (Fig. 45.) AGE Cissois pertinens ad Circulum ADQ def. TAB. VII. criptum Diametro AQ. Agatur DCE ad rectos Angulos super Diametrum, & quæ secet has Curvas in D, & E. Jamque, vocatis $AC = z$; $CE = y$; & $AQ = a$; Cum sint CD; AC; CE.

continuè proportionales, erit CE, five $y = \frac{zz}{\sqrt{az - zz}}$; & (di-

videndo per z) $y = \frac{z}{\sqrt{az - 1}}$. Igitur $z^{-1} = z^\eta$, aut

$\eta = -1$; & ideo $y = \frac{z^{-2\eta - 1}}{\sqrt{az^\eta - 1}}$, quæ Æquatio est ter-

tiæ speciei, quarti Ordinis Tabulæ II. Quapropter, per Terminorum. Comparationem, est $d = 1$; $e = -1$; & $f = a$; Ergo z

$= \frac{1}{z^\eta} = x$; $\sqrt{ax - xx} = u$; & $3s - 2ux = t$. Quâ de-

X 3

causâ

causa est $AC = x$; $CD = u$; & ideo $ACDH = s$; itaque
 $3ACDH - 4ADC \text{ Triang.} = 3s - 2ux = t = \text{Areæ}$
 Cissoïdali $ACEGA$. Aut, (quod idem est,) ter Segmentum
 $ADHA$ æquat Aream $ADEGA$, five quater Segmentum $ADHA$
 æquat Aream $AHDEGA$.

E X E M P L. IV.

TAB. VII. Sit (*Fig. 46.*) PE prima Veterum Conchoïds descripta Centro
 G ; Asymptoto AL ; & Intervallo LE . Age ejus Axem GAP , &
 demitte Ordinatam CE . Nunc appella $AC = z$; $CE = y$; GA
 $= b$; & $AP = c$: Proportionales $AC:CE - AL :: GC:CE$
 dabunt CE , five $y = \frac{b+z}{2} \times \sqrt{cc - zz}$.

Jam, ut hinc excudi possit ejus Area PEC , seorsum considerari
 debent partes Ordinatæ CE . Et, si Ordinata CE ita dividatur in
 D , ut sit $CD = \sqrt{cc - zz}$, & $ED = \frac{b}{2} \sqrt{cc - zz}$, erit
 CD Ordinata ad Circulum descriptum Centro A , & Radio AP .
 Quapropter Areæ pars CDP cognita est, & tantum invenienda
 superest pars DPE . Quia igitur Ordinatæ pars DE , quæ descri-
 bitur, æquivalat $\frac{b}{2} \sqrt{cc - zz}$, suppone $z = 1$, & ea fiet
 $\frac{b}{2} \sqrt{cc - 1} = DE$, Æquatio primæ Speciei tertii Ordinis
 Tabulæ II. Terminos igitur compara, & reperiēs $d = b$; $e = cc$;
 $\& f = -1$; quapropter $\frac{1}{z} = \sqrt{\frac{1}{z^2}} = x$; $\sqrt{-1 + ccxx}$
 $= u$; & $2bccs - \frac{bu^3}{x} = t$.

His autem inventis, revocandi sunt ad justum Dimensionum Nu-
 merum Termini, multiplicando scilicet nimium depresso, & divi-
 videndo nimium altos per aliquam datam Quantitatem. Hoc si fiat
 per

per c , assequemur $\frac{c^2}{z} = x$; $\sqrt{-cc + xx} = u$; & $\frac{2bs}{c} - \frac{bu^3}{cx} = z$. Quæ Æquatio sic potest construi.

Centro A, præcipuo Vertice P, & Latere recto 2 AP describe Hyperbolam PK. Tunc ex Puncto C age rectam CK, quæ tangat Hyperbolam in K: Eritque ut PA ad bis AG, ita Area CKPC ad Aream quæsitam DPED.

E X E M P L. V.

Gyret (Fig. 47.) Norma GFE circa Polum G, ita ut angulare Punctum F labatur super Rectâ AF positione datâ, & quodvis aliud Punctum E sumptum in altero Latere EF, concipiatur describere Curvam PE. TAB. VIII

Investigaturus Aream hujus Curvæ demitte GA, & EH ad rectos Angulos super Rectam AF, & completo Parallelogrammo AHEC, dic GA = b ; AC = z ; CE = y ; & EF = c . Ac, propter Proportionales FH : HE :: GA : AF, habebis AF = $\frac{bz}{\sqrt{cc - zz}}$.

Igitur CE, aut $y = \frac{bz}{\sqrt{cc - zz}} - \sqrt{cc - zz}$. Sed, quia $\sqrt{cc - zz}$ est Ordinata ad Circulum descriptum Semidiametro c ; Centro A describatur Circulus iste PDQ, quem CE producta secet in D; Tunc erit DE = $\frac{bz}{\sqrt{cc - zz}}$. Ope cujus Æquationis reliqua Area

PDEP, aut DERQ determinanda est. Quocirca suppone $\eta = z$, & $\theta = b$, & erit DE = $\frac{b z^{\eta - 1}}{\sqrt{cc - z^{\eta}}}$, Æquatio primæ Speciei

quarti Ordinis Tabulæ I; Nunc, per Comparisonem Terminorum, invenies $b = d$; $cc = e$; & $-1 = f$; ita ut $-b \sqrt{cc - zz} = -bR = z$.

Sed, quia negativus est valor ipsius z , & idcirco Area repræsentata per z , jacet ultra Lineam DE; ut inveniatur Limes initialis; quære cujusnam Longitudinis sit z ; cum z evanescit, eamque reperies c . Produc igitur AC ad Q donec sit AQ = c ; & erige Ordina-

dinatam QR; & DQRED erit Area illa, cujus valor nuper inventus exprimitur per $—b\sqrt{cc—zz}$.

Si vis noscere Quantitatem Areæ PDE positæ ad Abscissam AC, & cum eâ coextensæ, ignoto Limite QR, eam potes hoc pacto determinare.

Ex valore, quem habet t , cùm Abscissa est ipsa AC, subduc valorem, quem t habet ad Abscissæ initium, id est ex $—b\sqrt{cc—zz}$, subtrahe $—bc$, & sic reperiēs optatam Quantitatem $bc—b\sqrt{cc—zz}$. Quare, comple Parallelogrammum PAGK, & super AP demitte ad rectos Angulos Rectam DM, occurrentem ipsi GK in M, erit Parallelogrammum PKML æquale Areæ PDE.

Si quando Æquatio definiens Curvæ naturam, in Tabulis nequit inveniri, nec ad simpliciores Terminos reduci per Divisionem, aut per alias artes; ea transformanda est in alias Æquationes ad Curvas, quæ ad eam referantur, ut ostendimus in Probl. VIII. donec tandem aliqua proveniat, cujus Area nosci possit ex Tabulis. Quòd si, licet omnibus Laboribus exhaustis, tamen id inveniri non possit, pro certo habendum est, quòd Curva proposita comparari nequit, neque cum Figuris Rectilineis, neque cum Sectionibus conicis.

Eodem pacto, quando res est de Curvis mechanicis, eæ prius transformandæ sunt in æquales Figuras geometricas, ut ostensum est in eodem Probl. VIII, & deinde harum geometricarum Curvarum Areæ sunt per Tabulas inveniendæ. Accipe hujus negotii Exemplum.

EXEMPL. VI.

Determinanda proponatur Area Figuræ Arcuum cujuscunque Sectionis conicæ, quando ii Arcus ordinatim applicantur ad rectos earum Sinus. *Ex. gr.* Sit (Fig. 48.) A Centrum Sectionis conicæ, ejus Semiaxes sint QA, & AR; CD Ordinata ad Axem AR, & PD Curvæ ad Angulos rectos occurrat in Puncto D.

Præterea sit AE dicta mechanica Curva, quæ secet CD in E; & ex ejus naturâ jam definitâ, erit CE æqualis Arcui QD. Igitur

tur determinari debet, aut Area A E C, aut, completo Parallelogrammo A C E F, excessus A E F. Ad quod obtinendum, fit a Latus rectum Sectionis conicæ, & b , aut $2A Q$ Latus transversum.

Insuper sint $A C = z$; & $C D = y$; & erit $\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zx} = y$,

Æquatio ad Sectionem conicam, ut omnes norunt. Sed $P C = \frac{b}{a} z$;

$$\text{ergo } P D = \sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zx}.$$

Jam, quia Fluxio Arcûs Q D est ad Fluxionem Abscissæ A C, ut P D est ad D C; si Fluxio Abscissæ ponatur æqualis Unitati; erit

$$\text{Fluxio Arcûs Q D, aut Ordinatz C E} = \frac{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zx}}{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zx}}.$$

$$\text{Hanc duc in F E, aut } z, \text{ \& invenies } z \frac{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zx}}{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zx}} \text{ esse}$$

Fluxionem Areæ A E F. Quapropter, si ex Ordinată C D abscindas

$$C G = z \frac{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zx}}{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zx}}, \text{ Area A C G descripta ab ipsâ}$$

C G latâ per A C æquabit Aream A E F, & Curva A G erit geometrica.

Igitur invenienda restat Area A G C. Ut voti compos fias, substitue z^n pro z in ultimâ Æquatione, quæ hoc pacto evadet

$$z^{n-1} \frac{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}z^n}}{\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}z^n}} = C G, \text{ Æquatio secundæ speciei.}$$

Ordinis undecimi Tabulæ II. Compara Terminos, eritque $d=1$;
 $e=\frac{1}{4}bb=g$; $f=\frac{bb+ab}{aa}$, & $b=\frac{b}{a}$; itaque $\sqrt{\frac{1}{4}bb+\frac{b}{a}xx}$
 $=x$; $\sqrt{-\frac{b^2}{4a}+\frac{a+b}{a}xx}=u$; & $\frac{a}{b}s=s$. Videlicet CD
 $=x$; DP $=u$, & $\frac{a}{b}s=s$. Cujus Constructio sic fieri potest.

Ad Q erige QK perpendicularem, & æqualem ipsi QA, & per
 Punctum D age HI ei quidem parallelam, sed æqualem ipsi DP.
 Linea KI, ad quam HI terminatur, erit Sectio conica, & Area
 comprehensa HIKQ erit ad Arcum quæsitam AEF ut b , ad a , aut
 ut PC ad CA.

Hic animadverte, quod, mutato signo ipsius b , Sectio conica,
 cujus Arcus æquat Rectam CE, evadit Ellipsis, & si præterea facias
 $b=-a$, Ellipsis abit in Circulum; & tunc Linea KI fit Recta
 parallela ipsi AQ.

Postquam Area Curvæ alicujus ita reperta est & constructa, in-
 daganda est Demonstratio Constructionis, ut omisso, quatenus fieri
 potest, Calculo algebraico, Theorema fiat concinnum, & elegans,
 ac publicum lumen sustinere valeat. Est autem generalis demon-
 strandi Methodus, quam illustrare conabor sequentibus Exemplis.

CONSTRUCTIONIS EXEMPLUM.

DEMONSTRATIO.

TAB. VIII. In (Fig. 47.) Arcu PQ, sume Punctum d indefinitè propin-
 quum Puncto D, & age de , ac dm parallelas ipsis DE, ac DM,
 & secantes DM, & AP in p , ac l . Erit DE $e d$ Momentum Areæ
 PDEP, & LM $m l$ Momentum Areæ LMKP. Age Semidiametrum
 AD, & concipe Arcum indefinitè exiguum Dd esse Lineam
 rectam, ac Triangula Dpd, & ALD similia erunt, & ideo Dp:
 pd::AL:LD. Sed est FH:HE::GA:AF; id est AL:LD:
 ::ML:DE; ergo Dp:pd::ML:DE. Quapropter pD×DE
 $=pd×ML$; id est Momentum DE $e d$ æquale est Momento
 LM $m l$. Cum autem hoc demonstratum indeterminatè sit de om-
 nibus.

nibus simul genitis Momentis quibuscunque, patet quòd omnia Momenta Areæ PDEP æqualia sunt omnibus unà subfurgentibus Momentis Areæ PLMK, & idcirco, quòd Areæ ipsæ compositz ex his Momentis æquales sunt. Q. E. D.

CONSTRUCTIONIS EXEMPLI III.

DEMONSTRATIO.

Sit (Fig. 45.) DE*cd* Momentum superficièi AHDE, & A*d* TAB.VII
DA eodem tempore genitum Momentum Segmenti ADH. Age Semidiametrum DK, & D*e* secet AK in *e*; eritque C*e* ad D*d* ut CD ad DK. Præterea, est DC : QA (2DK) :: AC : DE; ergo C*e* : 2D*d* :: CD : 2DK :: AC : DE, & C*e* × DE = 2D*d* × AC. Nunc ad D*d* Momentum Peripheriæ, productum, id est ad Tangentem Circuli, demitte ad rectos Angulos AI; & IA æquabit AC. Itaque 2D*d* × AC = 2D*d* × AI = quater Triang. A*d*D. Quocirca quater Triang. A*d*D = C*e* × DE = Momento DE*cd*. Igitur quodlibet Momentum Spatii AHDE quadruplex est eodem tempore geniti Momenti Segmenti ADH, quamobrem totum illud Spatium quadruplex est totius Segmenti. Q. E. D.

CONSTRUCTIONIS EXEMPLI IV.

DEMONSTRATIO.

Age (Fig. 46.) *ce* parallelam ipsi CE, & indefinitè parum ab TAB.VII
eà distitam; duc pariter *ck* Tangentem Hyperbolæ; & demitte KM perpendicularem ad AP. Jam, ex Hyperbolæ naturà est CA : AP :: PA : AM, & idcirco AG*q* : GL*q* :: CA*q* : LE*q* (aut AP*q*) :: AP*q* : AM*q*, & *divisim* AG*q* : AL*q* (DE*q*) :: AP*q* : AM*q* — AP*q* (MK*q*). Et *inverse* GA : AP :: DE : MK: Sed Areola DE*cd* est ad Triangulum CK*c*, ut Altitudo DE ad ad dimidiam Altitudinem KM; id est, ut AG ad $\frac{1}{2}$ AP. Ergo omnia Momenta Spatii PDE sunt ad omnia simul orta Momenta
Y 2 Spatii

Spatii PKC, ut AG ad $\frac{1}{2}$ AP, quapropter tota Spatia erunt in eadem ratione. Q. E. D.

CONSTRUCTIONIS EXEMPLI VI.

DEMONSTRATIO.

TAB. VIII. Duc *dc* Parallelam, & infinitè proximam ipsi DC (Fig. 48.,) & Curvæ AE occurrentem in *e*; atque age *bi* & *fe*, quæ secant DC in *p*, atque *q*. Erit per Hypothesim, $dD = Eq$; & quia similia sunt Triangula Ddp , & DCP , habebis $pD : (Dd) Eq :: CP : (PD) HI$; itaque $Dp \times HI = Eq \times CP$; & propterea $DP \times HI$ (Momentum scilicet ipsius $HIib$): $Eq \times AC$ (Momentum ipsius $EFfe$) :: $Eq \times CP : Eq \times AC :: PC : CA$. Et, quia PC, & CA sunt in datâ ratione, in eâ nempe quam Latus transversum habet ad rectum conicæ Sectionis DQ, ideò Momenta $HIib$, & $EFfe$ Arearum $HIKQ$. & AEF sunt in eadem ratione, ergo in hac quoque sunt Areæ ipsæ. Q. E. D.

In hoc Demonstrationum genere, animadvertendum est, quòd pro æqualibus habeo Quantitates, quarum ratio est æqualitatis. Ea autem existimanda est ratio æqualitatis, quæ ab æqualitate differt ratione inæquali minori, quàm quælibet assignabilis. Sic, in ultimâ Demonstratione supposui rectangulum $Eq \times AC$, aut $FEqf$ æquale Spatio $FEef$, quia (cùm differentia Ege sit iis infinitè minor, aut nihilo æqualis relata ad illa Spatia) nulla est inter illa inæqualitatis ratio. Eadem ratione assumpsi $DP \times HI = HIib$; & sic de ceteris.

Methodum demonstrandi, quòd Curvarum Areæ sunt æquales, aut in datâ ratione, ex eo quòd earum Momenta sunt æqualia, aut in datâ ratione, usurpavi, quia affinitatem quandam habet cum Methodis, quæ passim in his negotiis adhibentur.

Magis tamen genuina, & rerum naturæ consona videtur ea, quæ profluit ex Superficierum genesi per motum, aut Fluxiones. Ex quo fonte sic, *Ex. gr.* deduci posset Demonstratio Constructionis

TAB. VII. Exempli II. Ex naturâ Circuli (Fig. 44.) Fluxio Rectæ DI est ad Fluxio-

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 173

Fluxionem Rectæ IP, ut AI ad ID, & est AI: ID :: DI: CE
ex Curvæ AGE naturâ; ergo $CE \times \dot{ID} = DI \times \dot{IP}$. Sed CE
 $\times \dot{ID}$ æquat Fluxionem Areæ ACEG, & $DI \times \dot{IP}$ æquat Fluxio-
nem Areæ PDI; Ergo Areæ istæ genitæ Fluxionibus æqualibus
debent esse æquales. *Q. E. D.*

Ut major lux his affundatur, addam Demonstrationem Construc-
tionis, quâ determinavimus Aream Cissoïdis in Exemplo III. Dele-
tæ concipiantur in Schemate (*Fig. 45.*) Lineæ solis Punctis indi-
catæ. Age Chordam DQ, & Rectam QR, quæ est Cissoïdis TAB. VII.
Asymptotus. Nunc, ex Circuli naturâ, est $DQ \times \dot{Q} = AQ \times \dot{QC}$.
Ergo (per Probl. I.) $2DQ \times \dot{Q} = AQ \times \dot{QC}$. Quapropter
 $AQ: QD :: 2\dot{DQ}: \dot{QC}$. Rursum, ex Cissoïdis naturâ, est $ED:$
 $DA :: AQ: QD$; ergo $ED: DA :: 2\dot{DQ}: \dot{QC}$, ac $ED \times \dot{QC}$
 $= AD \times 2\dot{DQ} = 4 \times \frac{1}{2} AD \times \dot{DQ}$. Jam, quia DQ per-
pendicularis est ad extremitatem ipsius DA gyrantis circa A; &
 $\frac{1}{2} AD \times \dot{QD}$ æquat Fluxionem, quæ gignit Aream ADOQ, at-
que ejus Quadruplex $ED \times \dot{CQ}$ æqualis est Fluxioni generanti
Aream cissoïdalem QREDO; Igitur hæc Area QREDO in in-
finitum protensa gignitur Quadruplex alterius ADOQ. *Q. E. D.*

S. C. H. O. L. I. U. M.

Ope Superiorum Tabularum, non solùm Curvarum Areæ, sed
etiam Quantitates alterius generis, quæ gignuntur analogâ fluendi
ratione, deduci possunt ex earum Fluxionibus, & id per hoc Theo-
rema; nempe, Quantitas cujuscunque generis, est ad Unitatem
ejusdem generis, ut Area cujuscunque Curvæ est ad Unitatem superficia-
lem, dummodo Fluxio generans hanc Quantitatem sit ad Unitatem
sui generis, ut Fluxio generans Aream est ad Unitatem pariter sui
generis; id est, ut Recta perpendiculariter lata per Abscissam, (five:

Y 3 Ordinata.,))

Ordinata,) quâ Area describitur est ad Unitatem linearem. Quapropter, si quælibet Fluxio exponatur per hanc mobilem Ordinatam, Quantitas genita hac Fluxione exponetur per Aream ab hac Ordinâtâ descriptam, aut, si Fluxio exponatur per eosdem algebraïcos Terminos, qui exponunt Ordinatam, genita Quantitas per eos exponetur, qui exponunt Aream descriptam. Igitur quærendâ est in primâ Tabularum Columnâ Æquatio, quæ exhibet Fluxionem cujuscvis generis, & valor ipsius t , qui est in ultimâ Columnâ exprimet Quantitatem genitam.

Exhibeat, *Ex. gr.* $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$ Fluxionem alicujus generis, eam fac æqualem y , & ut revocetur ad Formam Æquationum, quæ sunt in Tabulis, scribe z^η pro z , & prodibit $z^{\eta-1} \sqrt{1 + \frac{9}{4a} z^\eta} = y$, Æquatio primæ Speciei tertii Ordinis Tabulæ I. Comparatis verò Terminis, conficietur $d = 1$; $e = 1$; $f = \frac{9}{4a}$; & propterea $\frac{8a+18z}{27} \times \sqrt{1 + \frac{9z}{4a}} = \frac{2d}{3\eta f} R^1 = t$. Ergo Quantitas $\frac{8a+18z}{27} \times \sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$ ea est, quæ generatur Fluxione $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$.

Eodem pacto si $\sqrt{1 + \frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$ exprimit Fluxionem aliquam, legitime reducendo hanc Æquationem, (aut ponendo $z^{\frac{2}{3}}$ extra signum, & scribendo z^η pro $z^{-\frac{2}{3}}$), habebitur $\frac{1}{2^{\eta+1}} \sqrt{z^\eta + \frac{16}{9a^{\frac{2}{3}}}} = y$, Æquatio secundæ Speciei quinti Ordinis Tabulæ II.

Collatio Terminorum dat $d = 1$; $e = \frac{16}{9a^{\frac{2}{3}}}$; & $f = 1$. Est igitur $z^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{z^\eta} = xx$; $\sqrt{1 + \frac{16xx}{9a^{\frac{2}{3}}}} = n$; & $\frac{3}{2} t = \frac{2d}{\eta} = t$. Quibus inventis, cognita erit Quantitas genita Fluxione $\sqrt{1 + \frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$.

$\sqrt{1 + \frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$, eam faciendo ad Unitatem sui generis, ut Area

$\frac{3}{2}z$ est ad Unitatem superficiale, aut, (quod in idem recidit,) supponendo z non amplius indicare Superficiem, sed Quantitatem alterius generis, quæ est ad Unitatem sui generis, ut hæc Superficies ad Unitatem Superficierum.

Sic, si supponas, quod $\sqrt{1 + \frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$ exponit Fluxionem linea-

rem, intellige z non amplius exprimere Superficiem, sed Lineam, quæ ex. gr. fit ad Unitatem linearem, ut Area, quæ (secundum Tabulas) exponitur per z , est ad superficiale Unitatem, aut quæ invenitur applicando hanc Aream Unitati lineari. Tunc, si hæc Unitas linearis ponatur $= e$; Longitudo genita à præcedente Fluxione erit $= \frac{3z}{2e}$. Atque his Fundamentis possunt hæ Tabulæ uti-

les esse ad determinandam Curvarum Longitudinem, Soliditatem Solidorum ab iis genitorum, & quascunque alias Quantitates, æquè bene ac Areas Curvarum.

De Questionibus, quæ ad has referuntur.

I.

Mechanicè invenire per approximationem Areas Curvarum.

Tota Methodus in eo versatur, ut valores duarum, aut plurium Figurarum rectilinearum jungantur, ita ut quamproximè constituent quæsitum Areæ curvilinæ valorem.

Sic (Fig. 49.) in Circulo AFD, qui exprimitur Equatione TAB. VIII.
 $x - xx = z z$, invento valore Areæ AFD B, videlicet $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$

$= \frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72} x^{\frac{9}{2}}$, &c. inveniendi sunt valores plurium

Rectan-

Rectangulorum, qualia sunt $x\sqrt{x - xx}$, aut $x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{5}{2}}$
 $-\frac{1}{8}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{9}{2}}$; &c., valor ipsius $DB \times BA$; & $x\sqrt{x}$ aut
 $x^{\frac{3}{2}}$, valor ipsius $DA \times AB$. Deinde hi valores multiplicandi sunt
per aliquas diversas litteras, quæ gerunt vicem Numerorum inde-
finite, & simul addendi, hujusque summæ Termini comparandi sunt
correspondentibus Terminis valoris Areæ AFDB, ut ad æqualita-
tem accedant, quantum fieri potest. Multiplicentur *Ex. gr.* hæc
Parallelogramma per e & f ; erit eorum summa $\frac{+e}{+f}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}ex^{\frac{5}{2}}$
 $-\frac{1}{8}ex^{\frac{7}{2}}$; &c., qui Termini comparati cum his $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}$
 $-\frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}}$; &c., suppeditant $e + f = \frac{2}{3}$; & $-\frac{1}{2}e = -\frac{1}{5}$;
aut $e = \frac{2}{3}$, & $f = \frac{2}{3} - e = \frac{4}{15}$. Quapropter $\frac{2}{3}DB \times BA$
 $+\frac{4}{15}DA \times AB = \text{Areæ AFDB}$, quàm proximè. Nam $\frac{2}{3}DB$
 $\times BA + \frac{4}{15}DA \times AB = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{20}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{40}x^{\frac{9}{2}}$;
&c., quo valore subducto ex Areâ AFDB restat solum error
 $\frac{1}{20}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{90}x^{\frac{9}{2}}$; &c.

TAB.VIII. Pariter (Fig. 49.), Si AB bifariam secta esset in E, valor Rec-
tanguli $AB \times DE$ esset $x\sqrt{x - \frac{3}{4}xx}$, aut $x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{8}x^{\frac{5}{2}}$
 $-\frac{9}{128}x^{\frac{7}{2}} - \frac{27}{1024}x^{\frac{9}{2}}$; &c., quod collatum cum Rectangulo
 $DA \times AB$ præbet $\frac{8DE + 2AD}{15}$ in $AB = \text{Areæ AFDB}$, &
error est solum $\frac{1}{560}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5760}x^{\frac{5}{2}}$; &c., qui semper minor est,
quàm $\frac{1}{1500}$ pars totius Areæ, etiam quando AFDB est Circuli
Quadrans. Sed hoc Theorema potest ita proponi. Ut 3 est ad 2,
ita

ita Rectangulum ex AB in DE unà cum quintà parte Differentiæ, quæ est inter AD, & DE ad Aream AFDB quàmproximè.

Et sic in unum conjiciendo duo Rectangula $AB \times ED$, & $AB \times BD$, aut tria Rectangula, aut sumendo semper plura Rectangula, confici possunt aliæ Regulæ, quæ eò accuratiores erunt, quò plura Rectangula adhibebuntur. Idem intelligendum est de Areâ Hyperbolæ, & quarumlibet aliarum Curvarum. Quinimo sæpè uno Rectangulo potest Area commodè exhiberi, ut in Circulo, de quo supra, sumendo EB ad BA, ut $\sqrt{10}$ ad 5, erit Rectangulum $AB \times ED$ ad Aream AFDB, ut 3 ad 2, & error solum erit $\frac{1}{175} x^2 + \frac{11}{2250} x^2$; &c.

I I.

Areâ datâ determinare Abscissam, & Ordinam.

Nulla est difficultas, quando Area exprimitur Equatione finitâ: Sed quando ea exponitur per infinitam Seriem, extrahi debet Radix affecta, quæ denotat Abscissam. Sic pro Hyperbolâ, quam

definit Equatio $\frac{ab}{a+x} = z$, postquam inveneris $z = bx - \frac{bx^2}{2a} + \frac{bx^3}{3aa} - \frac{bx^4}{4a^3}$; &c., si ex datâ Areâ vis invenire Abscissam x , extrahe Radicem affectam, & habebis $x = \frac{z}{b} + \frac{zz}{2abb} + \frac{z^3}{6a^2b^3} + \frac{z^4}{24a^3b^4} + \frac{z^5}{96a^4b^5}$; &c., & præterea si noscere cupis Ordinam z , divide ab per $a+x$, id est per $a + \frac{z}{b} + \frac{zz}{2abb} + \frac{z^3}{6a^2b^3} + \frac{z^4}{24a^3b^4}$; &c., unde fiet $z = b - \frac{z}{a} - \frac{zz}{2aab} - \frac{z^3}{6a^2b^3} - \frac{z^4}{24a^3b^4}$; &c.

Eodem pacto in Ellipsi, quæ determinatur Equatione $ax - \frac{a}{c} x^2$

If. Newtoni Opuscula, Tom. I

Z

$xx =$

$xx = z\dot{z}$, postquam inventa fuerit Area $z = \frac{2}{3} a^{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}}$
 $= \frac{a^{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}}}{5c} - \frac{a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{5}{2}}}{28cc} - \frac{a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{7}{2}}}{72c^3}$; &c., scribe u^3 pro $\frac{3z}{2a^{\frac{1}{2}}}$, & t
 pro $x^{\frac{3}{2}}$, ea fit $u^3 = t^3 - \frac{3t^5}{10c} - \frac{3t^7}{56cc} - \frac{t^9}{48c^3}$; &c., & ex-
 tractâ Radice, $t = u + \frac{u^3}{10c} + \frac{81u^5}{1400cc} + \frac{1171u^7}{25200c^3}$; &c., cujus
 Quadratum $uu + \frac{u^4}{5c} + \frac{22u^6}{175cc} + \frac{823u^8}{7875c^3}$; &c., æquale est x ; &
 hoc valore posito pro x , in Æquatione $ax - \frac{a}{c} xx = z\dot{z}$, &
 extractâ Radice, conficitur $\dot{z} = a^{\frac{1}{2}} u - \frac{2a^{\frac{1}{2}} u^3}{5c} - \frac{38a^{\frac{1}{2}} u^5}{175cc} -$
 $\frac{407a^{\frac{1}{2}} u^7}{2250c^3}$; &c., Ita ut ex datâ Area z , & ideo u , aut $\sqrt[3]{\frac{3z}{2a^{\frac{1}{2}}}}$, da-

tur Abscissa x , & Ordinata z . Hæc omnia possunt aptari Hyperbo-
 læ, mutatis tantum signis Quantitatis c in eis Terminis, in quibus
 ea ascendit ad impares Dimensiones.

PROBL. X.

*Invenire quoslibet Curvas, quarum Longitudo, finitâ Æquatione
 possit exprimi.*

Sequentes positiones viam aperiunt ad hujus Problematis Solu-
 tionem.

I.

TAB. VIII.

Si (Fig. 50.) recta Linea DC concipiatur ita moveri, ut sem-
 per Perpendicularis sit Curvæ AD, omnia ejus Puncta G; r; g;
 &c., describent alias Curvas, ut GK; rs; gk; &c., quæ æquidif-
 tantes erunt & Perpendiculares illi Rectæ.

II. Si

I I.

Si hæc Recta utrinque in infinitum producat, ejus extrema ad contrarias partes movebuntur; idcirco erit aliquod Punctum intermedium, omnis motus expers, quod propterea vocari poterit Centrum motus. Hoc Punctum erit Centrum ipsum Curvaturæ, quæ Curva AD gaudet ad Punctum D, & de quo supra locuti sumus. Sit illud C.

I I I.

Si supponis, quod Linea AD non est Circularis, sed inæquabiliter curvata, sit ea magis curvata δ versus, quam versus Δ . Centrum illud assidue locum mutabit, & propius accedet ad partes magis curvas, ut in K; ac recedet à partibus minus Curvis, ut in k , & hoc pacto describet aliquam Lineam ut KC k .

I V.

Recta Linea DC semper tanget Lineam à Curvaturæ Centro descriptam. Moveatur enim versus δ Punctum D in hac Recta sumptum, alterum ejus Punctum G positum inter C, & D Puncta, eodem tempore accedit ad Punctum K, & movetur ad easdem partes, ac Punctum D per Posit. II. Rursus, idem Punctum D moveatur versus Δ ; tunc Punctum g , quod eodem tempore fertur versus K, & situm est ultra Punctum C, movetur ad contrarias partes, ac Punctum D, id est, ad easdem, ad quas ferebatur Punctum G in priori suppositione, dum accedebat ad K. Igitur Puncta K, & k jacent ad easdem partes Lineæ DC; sed Puncta K & k indefinite exprimunt omnia Puncta; ergo patet, quod tota Curva jacet ad eandem partem Lineæ rectæ DC, & ideo ab eâ non secatur, sed solum tangitur.

Hic supposuimus Lineam δ D Δ esse semper magis curvatam versus δ , & minus versus Δ ; Nam, si ejus major, aut minor Curvatura esset in D, tunc recta Linea DC secaret Curvam CK, sub

Z 2

Angulo

Angulo tamen, qui minor esset quocunque Angulo rectilineo, quod idem est ac si diceres, eam tangeret. Quinimo tunc Punctum C est Limes, aut Cuspis, in quo duæ partes hujus Curvæ, quàm maximè potest, obliquè concurrentes, mutuò se se tangunt; & ideo melius dici potest hanc Curvam tangi, quàm secari à Rectâ DC, quæ dividit angulum Contactûs.

V.

Recta Linea CG æquat Curvam CK. Nam, intellige omnia Rectæ Puncta r ; $2r$; $3r$; $4r$; &c. describere Arcus Curvarum rs ; $2r2s$; $3r3s$; $4r4s$; &c; dum accedunt ad Curvam CK motu Rectæ; & quia Arcus isti (per Positionem I.) Perpendiculares sunt Rectis, quæ tangunt Curvam CK (per Posit. IV.) ideo Perpendiculares sunt etiam ad hanc Curvam. Quapropter eæ partes Lineæ CK. quæ interceptæ sunt his Arcubus, & quæ, ob infinitam earum exiguitatem, haberi possunt tanquam Rectæ, æquales sunt intervallis eorundem Arcuum; videlicet (per Posit. I.) singulis partibus Rectæ CG; Et, æqualibus æqualia addendo, tota Linea CK æqualis est toti Lineæ CG.

Idem conficies considerando, quòd quævis pars Lineæ CG, dum movetur, semet successivè applicat cuilibet parti Curvæ CK, & ideo eam metitur, ad amussim ut Peripheria rotæ, dum gylando movetur super Planum, metitur intervallum, quod jugiter describitur à Puncto Contactûs.

Hinc liquet quòd Problema solvi potest, assumendo ad libitum aliquam Curvam $A \delta D \Delta$, & hinc determinando aliam Curvam KCK , TAB.VIII. in quâ semper sit Centrum Curvaturæ Curvæ assumptæ. Igitur (*Fig. 51.*) demitte Perpendiculares DB, & CL, super Rectâ AB positione datâ, & in AB sume aliquod Punctum A, & dic $AB = x$; Et $BD = y$; & assume relationem quamcunque inter x , & y ad determinandam Curvam AD; deinde, per Probl. V, inveni Punctum C, per quod determinare poteris Curvam KC, & ejus Longitudinem CG.

E x e m-

E X E M P L U M.

Sit (Fig. 51.) $ax=yy$ Æquatio ad Curvam, quæ ideo erit Parabola TAB.VIII.
Apolloniana. Et, per Probl. V. reperiens $AL = \frac{1}{2}a + 3x$; CL
 $= \frac{4y^3}{aa}$; & $DC = \frac{a+4x}{a} \times \sqrt{\frac{1}{4}aa + ax}$. Quibus inventis
 Curva KC determinatur per AL, & LC; ac Longitudo ejus per
 DC. Nam, quia, pro arbitrio sumpsimus Puncta K, & C ubi li-
 buit in Curvâ KC, supponamus K esse Centrum Curvaturæ Para-
 bolæ ad ejus Verticem; quocirca, ponendo AB, & BD, id est,
 x , & y , evanescere, assequemur $DC = \frac{1}{2}a$. Et hæc est Longi-
 tudo ipsius AK, vel DG, quâ subductâ ex indefinito valore DC,

supereft GC, aut $CK = \frac{a+4x}{a} \times \sqrt{\frac{1}{4}aa + ax} - \frac{1}{2}a$.

Nunc, si cognoscere vis quænam Curva sit hæc, & quantâ ejus
 Longitudo absque relatione ad Parabolam; dic $KL = z$, & $LC = x$;
 & erit $z = AL - \frac{1}{2}a = 3x$, vel $\frac{1}{3}z = x$; ac $\frac{a^2}{3} = ax = yy$.
 Quapropter $4\sqrt{\frac{z^3}{27a}} = \frac{4y^3}{aa} = CL = x$, aut $\frac{16z^3}{27a} = xx$; quæ
 Æquatio ostendit Curvam KC esse Parabolam secundi generis. Ejus

Longitudo autem reperitur $\frac{3a+4z}{3a} \times \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{3}az} - \frac{1}{2}a$,
 scribendo scilicet $\frac{1}{3}z$ pro x in valore ipsius CG.

Problema resolvî etiam potest fumendo Æquationem, quæ expri-
 mat relationem quæ est inter AP, & PD, supposito P Puncto,
 quo Abscissa, & Perpendicularis se interfecant. Nam, vocatis AP
 $= x$, & PD $= y$; concipe CDP moveri per Spatium infinitè
 parvum, & venire, puta, in Cpd. Abscinde ex CD, & Cd, par-
 tes CΔ, & Cδ, ambas ejusdem datæ Longitudinis, Ex. gr. $= 1$;
 & ad CL demitte Perpendiculares Δg; & δγ, quarum altera Δg,
 (quam dico $= z$,) secat Cd in f. Jam, completo Parallelo-
 Z 3 grammo

grammo $gyde$, & ponendo esse \dot{x} ; \dot{y} ; & \dot{z} Fluxiones Quantitatum x ; y ; & z , ut prius, erit $e\Delta : \Delta f :: \overline{e\Delta}^2 : \overline{\Delta d}^2 : \overline{gC}^2 : \overline{C\Delta}^2$
 $:: \frac{\overline{Cg}^2}{\overline{C\Delta}^2} : \Delta C$. Et $\Delta f : Pp :: \Delta C : CP$. Ergo, *ex aequo*, $\Delta e : Pp$
 $:: \frac{\overline{Cg}^2}{\overline{C\Delta}^2} : CP$. Sed Pp est Momentum Abscissæ, quo accedente ea fit Ap ; & Δe est eodem tempore genitum Momentum Perpendicularis Δg , quo recedente ea fit $d\gamma$: Quocirca Δe ; & Pp sunt ut Fluxiones Linearum Δg (z), & Ap (x), id est, ut \dot{z} & \dot{x} . Quamobrem $\dot{z} : \dot{x} :: \frac{\overline{Cg}^2}{\overline{C\Delta}^2} : CP$. Sed, quia est $\overline{Cg}^2 = \overline{C\Delta}^2 - \overline{\Delta g}^2$
 $= 1 - zz$, & $C\Delta = 1$, erit $CP = \frac{\dot{x} - zz\dot{x}}{2}$. Præterea,

quia licet assumere aliquam ex tribus Fluxionibus \dot{x} ; \dot{y} ; & \dot{z} , pro uniformi illâ, ad quam aliæ referuntur; sit \dot{x} Fluxio hæc, quæ Unitati æquivalet; erit igitur $CP = \frac{1 - zz}{2}$.

Insuper est $C\Delta (1) : \Delta g (z) :: CP : PL$; & $\Delta C (1) : Cg (\sqrt{1 - zz}) :: PC : CL$; quapropter $PL = \frac{z - z^3}{2}$, & $CL = \frac{1 - zz}{2} \times \sqrt{1 - zz}$. Denique, ductâ pq parallela Arcui infinitè exiguo Dd , aut perpendiculari ad DC , erit Pq Momentum ipsius DP , quo scilicet accedente ea fit $d\gamma$ eodem tempore, quo Ap evadit Ap . Quocirca pP , & Pq sunt ut Fluxiones ipsarum AP (x), & PD (y), id est, ut 1 ad \dot{y} . Igitur quia ob similia Triangula Ppq , & $C\Delta g$, sunt $C\Delta$, & Δg , vel 1, & z , in eadem ratione, erit $\dot{y} = z$. Unde habes Problematis solutionem hanc.

Ex propositâ Æquatione, quæ exprimit relationem inter x ; & y ; investiga relationem Fluxionum, \dot{x} , & \dot{y} (per Probl. I.), & ponendo

nendo $x = 1$ obtinebis valorem y , cui æqualis est z . Deinde scribendo z pro y , ope ultimæ Equationis require relationem Fluxionum x ; y ; & z (per Probl. I.), & rursus substitue 1 pro x , hinc affequeris valorem z . Quibus inventis fac $\frac{1 - \dot{y}\dot{y}}{z} = CP$; $z \times$

$CP = PL$; & $CP \times \sqrt{1 - \dot{y}\dot{y}} = CL$; & C erit Punctum in Curvâ, cujus pars quæcunque CK æqualis est rectæ Lineæ CG, quæ est differentia Tangentium ad Angulos rectos insistentium Curvæ Dd, & actarum ex Punctis C, & K.

E X E M P L U M.

Sit $ax = yy$ Equatio exponens relationem ipsarum AP, & PD; eritque (per Probl. I.) primò $a\dot{x} = 2y\dot{y}$, aut $a = 2yz$. Deinde $2y\dot{z} + 2x\dot{y} = 0$, aut $\frac{-z\dot{z}}{y} = \dot{z}$. Unde conficitur $CP =$

$$\frac{1 - \dot{y}\dot{y}}{z} = y - \frac{4y^3}{aa}; PL = z \times CP = \frac{1}{2}a - \frac{2yy}{a}, \text{ \& CL} \\ = \frac{aa - 4yy}{2aa} \times \sqrt{4yy - aa}. \text{ Et, subtrahendo ex CP \& PL } y \text{ \& } x, \text{ rema-}$$

net $CD = \frac{4y^3}{aa}$; & $AL = \frac{1}{2}a - \frac{3yy}{a}$. subtraho autem y , & x , quia, quando CP & PL habent valores affirmativos, cadunt ultra Punctum P versùs D & A, & minui debent sublati Quantitatibus affirmativis DP, & PA; Quando verò valores habent negativos, cadunt ad contrarias partes Puncti P, & augeri debent, quod pariter fit ablatis affirmativis Quantitatibus DP & PA.

Nunc excudenda est Longitudo Curvæ, in quâ est Punctum C, comprehensa inter duo ejus Puncta K & C; ad quod obtinendum quærenda est Longitudo Tangentis ad Punctum K, & subducenda ex CD. Ex. gr., si K esset Punctum, ubi Tangens terminatur, cum $C\Delta$ & Δg , aut 1 & z invicem æquantur, quod ideo erit in ipsâ Abscissâ AP; scribe 1 pro z in Equatione $a = 2yz$, unde repe-

ries $a = 2y$, vel $\frac{1}{2} a = y$. Quapropter pro y scribe $\frac{1}{2} a$ in valore ipsius CD, id est, in $-\frac{4y^3}{aa}$; & provenit $-\frac{1}{2} a$. Et hæc est Longitudo Tangentis ad Punctum K, aut ipsius DG; Quantitas autem, quæ superior indefinitus valor CD ab hac differt, est $\frac{4y^3}{aa} - \frac{1}{2} a$, nempe GC, cui æqualis est Curvæ pars KC.

Jam, hoc pacto deteges quænam Curva ea sit; Ex AL, (mutato prius ejus signo, quò fiat affirmativa;) aufer AK, quæ erit $\frac{1}{4} a$, & restabit KL $= \frac{3yy}{a} - \frac{3}{4} a$; hanc dic $= t$, & in valore Lineæ CL, quam appello u , scribe $\frac{4at}{3}$ pro $4yy - aa$; hinc orientur $\frac{2t}{3a} \sqrt{\frac{4}{3} at} = u$, aut $\frac{16t^3}{27a} = uu$, quæ Æquatio pertinet ad Parabolam secundi generis, ut jam inveneramus.

Si quando relatio ipsarum t , & u concinnè Æquatione concludi nequit, sufficiet invenisse Longitudines CP, & PL. Ut, si ad exponendam relationem inter AP, & PD assumeretur Æquatio $3aax + 3aay - y^3 = 0$. Hinc (per Probl. I.) habetur primò $aa + aaz - yyz = 0$; Deinde $aaaz - 2zyy - yyz = 0$, & propterea $z = \frac{aa}{yy - aa}$,

& $z = \frac{2zyy}{aa - yy}$. Unde dantur PC $= \frac{1 - yy}{z}$, & PL $= z \times PC$,

quibus determinatur Punctum C, quod Curvam tangit; & Longitudo Curvæ duobus Punctis intercepta innotescit ex differentiâ duarum correspondentium Tangentium DC, aut CP $- y$.

Ex. gr. si ponas $a = 1$, & sumas (ad determinandum aliquod Punctum C in Curvâ) $y = 2$; P, aut x evadit $\frac{y^3 - 3aay}{3aa} = \frac{2}{3}$; $z = \frac{1}{3}$; $z = -\frac{4}{9}$; PC $= -2$; & PL $= -\frac{2}{3}$. Jam, si aliud Punctum determinaturus, facias $y = 3$; erit AP $= 6$; z

$= \frac{1}{8}$; $\dot{z} = -\frac{3}{256}$; $PC = -84$, & $PL = -10\frac{1}{2}$. Quibus datis, aufer y ex PC , & supererit -4 in primâ Hypothesi, & -87 in secundâ, quæ erunt duæ Longitudines duarum DC ; harum verò differentia 83 est Longitudo Curvæ inter duo Puncta reperta C , & c .

Hæc intelligenda sunt de Curvis, quæ inter duo Puncta C , & c , aut C , & K nullum habent ex illis Terminis, aut Limitibus, quos vocavimus Cuspides. Nam, quando unus aut plures ex Terminis istis, sunt inter hæc Puncta, (qui Termini reperiuntur determinatis maximis aut minimis PC , vel CD ,) seorsum quærendæ sunt Longitudines singularum partium Curvæ, quæ sunt inter Terminos istos, & Puncta C , vel K , & deinde hæ Longitudines invicem addendæ.

P R O B L. X I

Invenire quotlibet Curvas, quarum Longitudines comparari possint cum aliquâ Curvâ propositâ, aut cum suis Arcis applicatis data Linea, & id per finitam Æquationem.

Problema solvitur involvendo Longitudinem, aut Aream Curvæ propositæ in Æquatione, quam assumpsimus in Problemate superiore, ad definiendam relationem, quæ est inter AP , & PD . Sed, ut x , & z hinc (per Probl. I.) eruere liceat, prius detegenda est Fluxio Longitudinis, aut Areæ.

Fluxio autem Longitudinis invenitur eam ponendo æqualem Radici quadratæ, extractæ ex Aggregato Quadratorum ex Fluxionibus Abscissæ, & Ordinatæ. Nam, sit (Fig. 52.) RN Ordinata ad rectos Angulos super Abscissam MN , & ea moveatur super MN ; sit autem QR Curva proposita, ad quam terminatur RN . Jam, dic $MN = s$; $NR = t$; & $RQ = u$; ac Fluxiones earum s ; t , & u respectivè. Intellige Rectam NR venire in locum nr priori infinitè propinquum, & demitte Rs ad rectos Angulos super nr ; Tunc erunt Rs ; sr ; & rR simul exorientia Momenta Linearum MN ; NR ; & RQ , quibus accedentibus illæ evadunt Ms ; nr ; & rQ .

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

A a

Hæc

TAB. IX.

Hæc autem Momenta eandem inter se rationem habent, ac earumdem Linearum Fluxiones; & quia rectus est Angulus Rsr , erit

$$\sqrt{R\dot{s}^2 + s\dot{r}^2} = R\dot{r}; \text{ aut } \sqrt{\dot{s}\dot{s} + \dot{t}\dot{t}} = \dot{x}.$$

Sed duabus Æquationibus opus est ad determinandas Fluxiones \dot{s} , & \dot{t} , quarum una definire debet Relationem, quæ est inter MN , & NR , aut inter s , ac t , & ex quâ deducenda est Relatio Fluxionum \dot{s} , & \dot{t} ; altera verò determinare debet Relationem, existentem inter MN , aut NR in datâ Figurâ, ac PA , aut x in quæsitâ; unde deducere liceat Relationem, quam Fluxio \dot{s} , aut \dot{t} habet ad Fluxionem \dot{x} , aut \dot{r} .

Detectâ verò \dot{x} , Fluxiones \dot{y} , & \dot{z} excudi debent ex tertiâ assumptâ Æquatione, quâ definiri potest Longitudo ipsius PD , aut y .

Deinde sumere debes $PC = \frac{1 - \dot{y}\dot{y}}{2}$; $PL = \dot{y} \times PC$; ac $DC = CP - y$, ut in Problemate superiore.

EXEMPLUM I.

Sit $as - ss = tt$ Æquatio ad datam Curvam QR , quæ erit Circulus; exprimat $xx = as$ Relationem ipsarum AP & MN , ac $\frac{2}{3}u = y$ Relationem Longitudinis Curvæ datæ QR , & Rectæ PD .

Per primam erit $as - 2s\dot{s} = 2t\dot{t}$, aut $\frac{a - 2\dot{s}\dot{s}}{2\dot{t}} = \dot{t}$; Quapropter

$\frac{as}{2\dot{t}} = \sqrt{\dot{s}\dot{s} + \dot{t}\dot{t}} = \dot{x}$. Per secundam est $2x = as$, & ideo

$\frac{x}{\dot{t}} = \dot{x}$; & per tertiam $\frac{2}{3}u = y$; id est, $\frac{2x}{3\dot{t}} = z$; & idcirco

$\frac{2}{3\dot{t}} - \frac{2x\dot{t}}{3\dot{t}\dot{t}} = z$. Quibus inventis, accipere debes $PC = \frac{1 - \dot{y}\dot{y}}{2}$,

$PL = \dot{y} \times PC$; & $DC = CP - y$, aut $PC - \frac{2}{3}QR$. Unde

constat, quòd Longitudo datæ Curvæ QR nequit inveniri, nisi prius detur Longitudo Rectæ DC , & hinc Longitudo Curvæ, ad quam pertinet Punctum C , & vice versâ.

EXEMPLUM.

EXEMPL. II.

Stante Æquatione $as - ss = tt$, pone $x = s$, & $us - 4ax = 4ay$.
Ex primâ erues $+\frac{as}{2s} = \dot{u}$, ut supra. At è secundâ $1 = \dot{s}$, &
ideo $\frac{a}{2s} = \dot{u}$. Ex tertiâ verò $2us - 4a = 4ay$, aut (eliminan-
do \dot{u}) $\frac{u}{4s} - 1 = z$. Quapropter $\frac{\dot{u}}{4s} - \frac{us}{4s^2} = \dot{z}$.

EXEMPL. III.

Proponantur hæ tres Æquationes $aa = st$; $a + 3s = x$; & $x + a = y$.
Prima, quæ pertinet ad Hyperbolam, dat $o = ts + ss$ aut
 $-\frac{ts}{s} = \dot{s}$; igitur $\frac{s}{s} \sqrt{ss + ts} = \sqrt{ss + ts} = \dot{u}$; secunda præ-
bet $3s = 1$, & ideo $\frac{1}{3s} \sqrt{ss + ts} = \dot{u}$; Tertia denique $1 + \dot{u} = \dot{y}$
aut $1 + \frac{1}{3s} \sqrt{ss + ts} = z$; quapropter $\dot{w} = z$, ponendo scilicet
 \dot{w} pro Fluxione Radicalis $\frac{1}{3s} \sqrt{ss + ts}$, quam si facias $= w$, aut
 $\frac{1}{9} + \frac{ts}{9ss} = ww$ invenies $\frac{2ts}{9ss} - \frac{2tts}{9s^3} = 2w\dot{w}$; Et primum sub-
stituendo $-\frac{ts}{s}$ pro \dot{s} , deinde $\frac{1}{3}$ pro \dot{s} & dividendo per $2w$,
oriatur $-\frac{2ts}{27ws^2} = \dot{w} = z$. Nunc, inventis y , & z , cetera perfici-
entur ut in primo Exemplo.

Jam, si ex quocunque Curvæ Puncto Q demittatur super MN
perpendicularis QV, & postuletur Curva, cujus Longitudo nosci
possit ex Areâ QRNV applicatâ ad datam Lineam, hæc data Linea
dicatur E, & Longitudo $\frac{QRNV}{E}$, quæ prodit ex hac applicatio-

ne, vocetur u , ac Fluxio ejus \dot{u} ; Quia Fluxio Areæ QRNV est
ad Fluxionem Areæ Parallelogrammi rectanguli constituti super VN,

A a a

&

& cujus altitudo est E, ut Ordinata, aut mobilis Linea NR = t , quâ describitur Area Curvilinea, est ad mobilem Lineam E, quâ eodem tempore describitur Rectangulum; & Fluxiones \dot{x} ; & \dot{s} Linearum x , & MN, (aut s ,) aut Longitudines, quæ exsurgunt applicando has Areas ad datam Lineam E, sunt in eadem ratione, erit $\dot{x} = \frac{\dot{s}}{E}$. Quocirca quærendus est per hanc Regulam valor ipsius \dot{x} , & cetera conficienda, ut in præcedentibus Exemplis.

EXEMPLUM IV.

Sit Q R Hyperbola, quæ definitur Equatione $xx + \frac{asx}{c} = ts$; hinc prodit (per Probl. I.) $\frac{asx}{c} = ts$, vel $\frac{asx}{ct} = s$; si jam assumas duas alias Equationes $x = s$, & $y = x$; ex primâ assequeris $x = s$, unde $\dot{x} = \frac{\dot{s}}{E} = \frac{\dot{t}}{E}$, ultima verò præbebit $\dot{x} = \dot{y}$ aut $x = \frac{t}{E}$, quapropter $\dot{x} = \frac{\dot{t}}{E}$, & substituendo $\frac{asx}{ct}$ aut $\frac{as}{ct}$ pro \dot{x} , reperies $\frac{as}{ct} = \dot{z}$. Nunc inventis \dot{y} , & \dot{z} , fac $\frac{1 - \dot{y}\dot{z}}{z} = CP$, & $\dot{y} \times CP = PL$, ut priùs, & sic determinabitur Punctum C, & Curva, in quâ est Punctum illud. Hujus autem Curvæ Longitudo innotescet ex Longitudine DC, quæ æquivalet ipsi CP = x , ut jam satis demonstravimus.

Sed, & alia Methodus adest hujus Problematis resolvendi, & hæc in eo tota versatur, ut inveniantur Curvæ, quarum Fluxiones sint aut æquales Fluxionibus Curvæ propositæ, aut compositæ ex hujus, & alterius Lineæ Fluxionibus. Hæc Methodus aliquando utilis est, cum Curvæ mechanicæ transformandæ sunt in æquales geometricas Curvas, cujus rei præclarum Exemplum habemus in Lineis Spiralibus.

Sic

Sit enim (*Fig. 53.*) *AB* Recta positione data; *DB* Arcus, qui TAB. IX.
moveatur super *AB*, tanquam Abscissa, & cujus Centrum semper
fit *A*; *AD* *d* Spiralis, quâ Arcus isti semper terminantur; *bd* Ar-
cus infinitè priori proximus, aut Locus, in quem venit hic Arcus
exiguo motu; *DC* perpendiculariter insistat Arcui *bd*; & *dG* sit
illorum Arcuum differentia; *AH* alia Curva æqualis Spirali *AD*; *BH*
Recta, quæ ad rectos Angulos movetur super *AB*, & quæ finitur
Curvâ *AH*; *bb* Locus quamproximus, in quem Linea pervenit
motu suo, & *HK* perpendicularis ad *bb*. Jam, in infinitè exiguis
Triangulis *DCd*, *HKb*, quia *DC*, & *HK* æquales sunt eidem
tertiæ Lineæ *Bb*, & idcirco mutuò æquales, & *Dd* ac *Hb* (per
Hypothesim) sunt correspondentes æqualium Curvarum partes, &
ideo æquales, ac recti sunt Anguli ad *C* & *K*; æqualia pariter
erunt reliqua latera *Cd*, & *Kb*; Præterea, quia *AB* : *BD* :: *Ab* :

$$bC : bA — AB (Bb) : bc — BD (CG), \text{ idcirco } \frac{BD \times Bb}{AB}$$

$$= CG; \text{ Hoc dempto ex } dG \text{ remanet } dG — \frac{DB \times Bb}{AB} = dC$$

$$= bK. \text{ Dic igitur } AB = z; BD = u; \& BH = y, \text{ earumque}$$

Fluxiones \dot{z} ; \dot{u} ; & \dot{y} respectivè; Cum *Bb*, *dG*, & *bK* sint unâ
genita earundem Momenta, quibus accedentibus eæ Lineæ evadunt
Ab; *bD*; & *bb*, ea Momenta sunt inter se, ut Fluxiones. Igitur
in ultimâ Æquatione pro Momentis ponantur Fluxiones, & sym-

bola pro Lineis, ac habebitur $\dot{u} — \frac{u \dot{z}}{z} = \dot{y}$. Nunc si \dot{z} po-
natur æquabilis, aut Unitas, ad quam ceteræ Fluxiones referuntur,
Æquatio erit $\dot{u} — \frac{u}{z} = \dot{y}$.

Quapropter, si Relatio quæ existit inter *AB*, & *BD*, (aut inter
 z , & u ,) exponatur Æquatione aliquâ Spiralem determinante, da-
bitur Fluxio \dot{u} (per Probl. I.) & ideo etiam Fluxio \dot{y} , eam po-
nendo æqualem $\dot{u} — \frac{u}{z}$. Et (per Probl. II.) dabitur Linea y ,
aut *BH*, cujus illa est Fluxio.

A a 3

EXEMPL.

E X E M P L. I.

Si detur Æquatio $\frac{z^2}{a} = u$, quæ est ad Spiralem ARCHIMEDIS, erit (per Probl. I.) $\frac{2z}{a} = \dot{u}$; hinc aufer $\frac{u}{z}$, aut $\frac{z}{a}$, restabit $\frac{z}{a} = \dot{y}$; igitur (per Probl. II.) $\frac{z^2}{2a} = y$. Quæ Æquatio monstrat Curvam AH, cui æqualis est Spiralis AD, esse Parabolam *Apollo-nianam*, cujus Latus rectum est $2a$, & Ordinata BH æqualis semissi Arcus BD.

E X E M P L. I I.

Si proponeretur Spiralis definita per Æquationem $z^3 = a u u$, aut $u = \frac{z^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}$, hinc assequeremur (per Probl. I.) $\dot{u} = \frac{3z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}}$, unde subtrahere $\frac{u}{z}$, aut $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}}$ restat $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} = \dot{y}$; hinc autem conficiemus (per Probl. II.) $\frac{z^{\frac{3}{2}}}{3a^{\frac{1}{2}}} = y$. Id est, $\frac{1}{3} BD = BH$, & AB erit Parabola secundi generis.

E X E M P L. I I I.

Si Æquatio ad Spiralem esset $z \sqrt{\frac{a+z}{c}} = u$, haberemus (per Probl. I.) $\frac{2a+z}{2\sqrt{ac+cz}} = \dot{u}$; unde si demis $\frac{u}{z}$ aut $\sqrt{\frac{a+z}{c}}$, superstitem invenies $\frac{z}{2\sqrt{ac+cz}} = \dot{y}$. Jam, quia Quantitas genita Fluxione y nequit reperiri per Probl. II., nisi ea resolvatur in Seriem infinitam, juxta Scholium Problematis IX, eam reduco ad Formam Æquationum,

num, quæ sunt in primâ Tabularum Columnâ, substituendo z^y pro z ; quo facto Æquatio superior evadit $\frac{z^{2y-1}}{2\sqrt{ac+cz^y}} = j$, quæ est secundæ Speciei, quarti Ordinis Tabulæ I, Et comparatis Terminis, est $d = \frac{1}{2}$; $e = ac$; & $f = c$; itaque $\frac{z^{2-2a}}{3c} \times \sqrt{ac+cz}$ $= t = y$; quæ Æquatio pertinet ad Curvam geometricam AH Longitudine æqualem Spirali A D.

PROBL. XII.

Determinare Curvarum Longitudinem.

In præcedenti Problemate demonstravimus Fluxionem curvæ Li-
neæ, æqualem esse Radici quadratæ extractæ ex Aggregato Quadrato-
rum Fluxionum Abscissæ, & Ordinatæ perpendicularis. Accipe igitur
Fluxionem Abscissæ pro uniformi & determinatâ mensurâ, aut
pro Unitate, ad quam reliquæ Fluxiones referuntur; deinde, ex
Æquatione Curvam definiente, erue Fluxionem Ordinatæ, & ha-
bebis Fluxionem Curvæ, ex quâ (per Probl. II.) deducere poteris
ejus Longitudinem.

EXEMPL. I.

Proponatur (Fig. 54.) Curva FDH, quæ definitur Æquatione TAB. IX.
 $\frac{z^2}{aa} + \frac{aa}{12z} = y$; dictis scilicet Abscissâ AB = z , & Ordinatâ mo-
bili BD = y . Jam; ex Æquatione istâ deduces (per Probl. I.)
 $\frac{32z}{aa} - \frac{aa}{12z} = j$ (ponendo Unitatem pro Fluxione ipsius z , &
 j pro Fluxione y). Harum Fluxionum Quadrata in unum conjl-
ce, inventurus $\frac{9z^4}{a^4} + \frac{1}{2} + \frac{a^4}{144z^4} = ii$, & , extracta Radice,
 $\frac{32z}{aa}$

$$\frac{3z^2}{aa} + \frac{aa}{12zz} = t; \text{ Et hinc (per Probl. II.) } \frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z} = t. \text{ Ubi}$$

t repræsentat Curvæ Fluxionem, & t ejus Longitudinem.

Quamobrem, si petitur Longitudo alicujus partis dD hujus Curvæ, ex Punctis d , & D demitte perpendiculares db & DB , super AB , & pone in valore ipsius t Quantitates Ab & AB seorsum, pro z ; eritque differentia Quantitatum hinc prodeuntium Longitudo quæsitæ dD . Ex. gr. fit $Ab = \frac{1}{2}a$, & $AB = a$, scribe $\frac{1}{2}a$

pro z , & invenies $t = -\frac{a}{24}$; Deinde rursus scribe a pro z , &

obtinebis $t = \frac{11a}{12}$, ex hoc valore primum deme, restabit $\frac{23a}{24}$, quæ erit Longitudo ipsius dD . Si verò tantum Ab determinata esset, & fieret $= \frac{1}{2}a$, & haberetur AB pro indefinita, restaret

$$\frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z} + \frac{a}{24} \text{ pro valore } dD.$$

Si noscere cupis partem Curvæ repræsentatam per t , suppone valorem ipsius t nihilo æqualem; unde obtinebis $z^4 = \frac{a^4}{12}$, aut z

$= \sqrt[4]{\frac{a^4}{12}}$. Igitur, sume $Ab = \sqrt[4]{\frac{a^4}{12}}$, & erige perpendicularem

bd . Longitudo Arcûs dD erit t aut $\frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z}$. Idem dictum volo de aliis Curvis.

Nec diversa via ineunda esset, si proponeretur Curva, cujus Æquatio foret $\frac{z^4}{a^3} + \frac{a^3}{32zz} = y$; hinc enim deduceretur $\frac{z^4}{a^3} - \frac{a^3}{32zz}$

$= t$; neque si daretur Æquatio $\frac{z^{\frac{5}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{3}a^{\frac{1}{2}}z^{\frac{3}{2}} = y$; ex qua

fieret $\frac{z^{\frac{5}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{3}a^{\frac{1}{2}}z^{\frac{3}{2}} = t$. Neque demum si proponeretur Æqua-

tio

tio generalis $cx^\theta + \frac{z^2 - \theta}{4\theta c - 8\theta c} = y$, in qua θ adhibetur ad indicandum quemvis numerum sive integrum, sive fractum. Hæc autem Æquatio præbet $cx^\theta - \frac{z^2 - \theta}{4\theta c - 8\theta c} = s$.

E X E M P L. I I

Proponatur Curva definita hac Æquatione $\frac{2aa + 2zz}{3aa} \times \sqrt{aa + zz} = y$; Erit (per Probl. I.) $y = \frac{4a^4z + 8aa z^2 + 4z^3}{3a^4y}$, aut (extremato y) $y = \frac{2z}{aa} \sqrt{aa + zz}$. Hujus Quadratum adde Unitati, & obtinebis $1 + \frac{4zz}{aa} + \frac{4z^4}{a^4}$, & erit ejus Radix $1 + \frac{2zz}{aa} = s$. Hinc autem (per Probl. II.) erit $z + \frac{2z^3}{3aa} = s$.

E X E M P L. I I I

Proponatur Parabola secundi generis, cujus Æquatio est $z^3 = ay$, aut $\frac{z^3}{a^3} = y$; hæc (per Probl. I.) dat $\frac{3z^2}{2a^2} = y$. Igitur, $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}} = \sqrt{1 + yy} = s$. Sed quia Longitudo Curvæ genitæ Fluxione s , nequit inveniri per Probl. II. absque Reductione ad infinitam Seriem Terminorum simplicium, consulo Tabulas Probl. IX., & juxta

Scholium ad illud pertiñens, invenio $s = \frac{8a + 18z \times \sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}}{27}$.

Et eadem ratione poteris invenire Longitudinem Parabolæ expressarum Æquationibus $z^4 = ay^4$; $z^7 = ay^6$; $z^8 = ay^3$; &c.

EXEMPL. IV.

Proponatur Parabola, cujus Æquatio est $z^4 = ay^3$; aut $\frac{z^4}{y^3} = a$
 $= y$. hinc (per Probl. I.) oriatur $\frac{4z^3}{3a^{\frac{3}{4}}} = y$. Igitur $\sqrt{1 + \frac{16z^3}{9a^{\frac{3}{4}}}}$
 $= \sqrt{1 + yy} = s$. His inventis, consulo Tabulas, secundum su-
 pradictum Scholium, & hos Terminos comparando cum Terminis
 secundi Theorematis quinti ordinis Tabulæ II, habeo $z^{\frac{1}{4}} = x$;
 $\sqrt{1 + \frac{16xx}{9a^{\frac{3}{4}}}} = s$; & $\frac{3}{2}s = t$. Ubi x quidem denotat
 Hyperbolæ Abcissam, y Ordinatam, s verò Aream, & t Longitudi-
 nem, quæ prodit Aream $\frac{3}{2}s$ applicando Unitati lineari.
 Eodem Pacto Longitudines Parabolæ $z^4 = ay^3$; $z^5 =$
 ay^4 ; $z^6 = ay^5$; &c. revocari possunt ad Aream Hyperbolæ.

EXEMPL. V.

TABUL. Proponatur (Fig. 55.) Cissois Veterum, cujus Æquatio est
 $\frac{aa - 2az + zz}{\sqrt{a^2 - zz}} = y$; hinc fit (per Probl. I.) $\frac{a - 2z}{2zz} x$.
 $\sqrt{a^2 - zz} = y$; & idcirco $\frac{a}{2z} \sqrt{\frac{a + 3z}{z}} = \sqrt{1 + yy} = s$;
 quæ, scribendo $z^{\frac{1}{2}}$ pro $\frac{1}{z}$, aut $z^{-\frac{1}{2}}$, evadit $\frac{a}{2z} \sqrt{az^{\frac{3}{2}} + 3} = s$.
 Æquatio primæ Speciei tertii Ordinis Tabulæ II; Jam, per Termi-
 norum comparisonem, invenio $\frac{a}{2} = d$; $3 = e$; & $a = f$; ita-
 que $z = \frac{1}{2z^{\frac{3}{2}}} = xx$; $\sqrt{a + 3xx} = s$, & $6s - \frac{2u^3}{x} = \frac{4de}{xf}$
 $\times \frac{u^3}{2ex} - s = t$. Hæc autem Æquatio, accipiendo a pro Uni-
 tate,

tate, per quam multiplicatæ aut diviſæ hæ Quantites revocari poſſunt ad juſtum Dimenſionum numerum, evadit $ax = xx$;

$$\sqrt{aa + 3xx} = u; \& \frac{6x}{a} - \frac{2u^3}{ax} = t; \text{ quæ ſic conſtrui poteſt.}$$

Sit DV Cifſois; VA Diameter Circuli, ad quem illa pertinet; AF Cifſoidis Aſymptotus; & DB perpendicularis ad AV, & Curvæ occurrens in D. Semiaxe FA = AV, & Semiparametro GA = $\frac{1}{3}$ AV deſcribe Hyperbolam FkK; deinde ſume AC mediam proportionalem inter BA, & AV; per C, & V age Ck, & VK perpendiculares ipſi AV, & occurrentes Hyperbolæ in k & K, quam in his Punctis tangant Rectæ kt, & KT occurrentes VA in t & T; & AV applicetur Rectangulum AVNM æquale ſpatio TKkt. Longitudinem Cifſoidis dico ſextuplam Altitudinis VN.

E X E M P L. V I.

Sit (Fig. 39.) Ad Ellipſis, cujus Aequatio $\sqrt{az - 2zz} = y$, & TAB. VI proponatur Curva mechanica AD ejus naturæ, ut ſi producat B d, aut y donec ea Curvæ occurrat in D, ſit BD æqualis Arcui Ad Ellipſeos. Nunc, ut hujus Longitudo determinetur; Aequatio

$$\sqrt{az - 2zz} = y \text{ dabit } \frac{a - 4z}{2\sqrt{az - 2zz}} = y, \text{ cujus Quadrato ad-}$$

$$\text{dens Unitatem, conſequeris } \frac{aa - 4az + 8zz}{4az - 8zz}, \text{ Quadratum Fluxio-}$$

nis Arcus Ad. Huic rurfus adde Unitatem, unde fiet $\frac{aa}{4az - 8zz}$.

cujus Radix quadrata $\frac{a}{2\sqrt{az - 2zz}}$ eſt Fluxio Curvæ AD. Ubi.

ſi z extrahatur extra ſignum radicale, & pro z^{-1} ſcribatur z^{η} , ea fiet $\frac{a}{2z\sqrt{az^{\eta} - 2}}$, Fluxio primæ Speciei quarti Ordinis Tabulæ

II. Hinc, Terminis collatis, deteges $d = \frac{1}{2} a; e = -2; \&$

B b 2


f = a

$$f = a, \text{ quapropter } z = \frac{1}{z^2} = x; \sqrt{ax - 2xx} = u; \& \frac{8x}{a} \\ - \frac{4xx}{a} + u = \frac{8de}{7ff} \times s - \frac{1}{2} ux - \frac{fn}{4f} = t.$$

En hujus Constructionem; Age dC (posito C Ellipseos Centro;) super AC constitue Parallelogrammum æquale Sectori ACd ; hujus dupla Altitudo æquabit Longitudinem Curvæ AD .

E X E M P L. VII.

TAB. IX. Sint (Fig. 56.) $AB = \phi$ (N°. I.), & ad Hyperbola, cujus Aequatio $\sqrt{-a + b\phi\phi} = \beta d$, & Tangens Td : Jam proponatur Curva VdD , cujus Abscissa AB sit $\frac{1}{\phi\phi}$, & cujus Ordinata perpendicularis BD , Longitudo, quæ oritur ex applicatione Areæ adT Ta , ad Unitatem Linearem. Nunc determinaturus Longitudinem hujus Curvæ VD , quæro Fluxionem Areæ adT positâ uniformi Fluxione ipsius AB , eamque reperio $\frac{a}{4bz} \sqrt{b - az}$, (vocando scilicet $AB = z$, & ejus Fluxionem $= r$),. Est enim $AT = \frac{a}{b\phi} = \frac{a}{b} \sqrt{z}$ cujus Fluxio est $\frac{a}{2b\sqrt{z}}$. Hujus autem semissis ductus in Altitudinem βd , aut $\sqrt{-a + \frac{b}{z}}$ est Fluxio Areæ adT descriptæ à Tangente dT . Quapropter hæc Fluxio est $\frac{a}{4bz} \sqrt{b - az}$, quæ applicata Unitati fit Fluxio Ordinatæ BD . Hujus Quadratum $\frac{aab - a^3z}{16bbzz}$ adde Unitati Quadrato Fluxionis ipsius BD , & exfurgit $\frac{aab - a^3z + 16bbzz}{16bbzz}$, cujus Radix $\frac{1}{4bz} \sqrt{aab - a^3z + 16bbzz}$ est Fluxio Curvæ VD . Sed hæc est Fluxio primæ Speciei septimi Ordinis Tabulæ II: Confer Terminos, & invenies $\frac{1}{4b} = d; aab$



24

METHO. FLUXIO. ET SERIER. INFIN. 197

$= e$; — $a^3 = f$; $16bb = g$ & idcirco $x = x$; &
 $\sqrt{a^3b - a^3x + 16bbxx} = u$, (Æquatio ad Sectionem conicam,
 puta HG (N°. 2.), cujus Area EFGH est s & ubi EF $= x$; ac
 FG $= u$;) pariter $\frac{x}{z} = \xi$; & $\sqrt{16bb - a^3\xi + ab\xi\xi} = \gamma$
 (Æquatio ad aliam Sectionem conicam, puta ML (N°. 3.), cu-
 jus Area IKLM est α , & ubi IK $= \xi$; & KL $= \gamma$) Demum

$$z = \frac{2aabb\xi\gamma - a^3b\gamma - a^3u - 4aabb\alpha - 32abbs}{64b^4 - a^4}$$

Quapropter, ut innotescat aliqua Curvæ VD pars Dd, demitte
 db perpendicularem ad AB, & fac Ab $= z$; deinde per nuper
 inventa quære valorem ipsius z . Jam fac AB $= z$, & hinc rursus
 erue z . Tunc Longitudo quæsitæ Dd exponetur per differentias
 horum duorum valorum ipsius z .

EXEMPL. VIII.

Proponatur Hyperbola, cujus Æquatio fit $\sqrt{aa + bzz} = y$;
 Hinc (per Probl. I.) habebis $y = \frac{bz}{y}$, aut $\frac{bz}{\sqrt{aa + bzz}}$. Cu-
 jus Quadratum adde Unitati; hujus autem Summæ Radix erit
 $\sqrt{\frac{aa + bzz + b^2zz}{aa + bzz}} = z$. Nunc, quia Fluxio hæc abest è Ta-
 bulis, eam redigo in Seriem infinitam, & primò, per Divisionem,
 fit $z = \sqrt{1 + \frac{bb}{aa}zz - \frac{b^3}{a^3}z^3 + \frac{b^4}{a^4}z^4 - \frac{b^5}{a^5}z^5; \&c.$ deinde,
 per Extractionem Radicis, $z = 1 + \frac{bb}{2aa}zz - \frac{4b^3 + b^4}{8a^4}z^3$
 $+ \frac{8b^4 + 4b^5 + b^6}{16a^6}z^5; \&c.$ Unde (per Probl. II.) invenietur Ar-
 cus hyperbolicus, aut $z = z + \frac{bb}{6aa}z^3 - \frac{4b^3 + b^4}{40a^4}z^5 + \frac{8b^4 + 4b^5 + b^6}{112a^6}$
 $z^7; \&c.$

Bb 3

Si

Si proponeretur Ellipsis $\sqrt{aa - b^2} = y$, ubique mutanda forent signa ipsius b , unde conficeretur $x + \frac{bb}{6aa}x^3 + \frac{4b^3 - b^4}{40a^4}x^5 + \frac{8b^4 - 4b^5 + b^6}{112a^4}x^7$; &c., pro Longitudine ejus Arcus. Similiter, ponendo Unitatem pro b , erit $x + \frac{2^3}{6aa} + \frac{32^5}{40a^4} + \frac{52^7}{112a^4}$; &c. Longitudo Arcus Circularis. Numerales autem Coefficientes hujus Seriei possunt inveniri in infinitum, continuâ Multiplicatione Terminorum hujus Progressionis $\frac{1 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{3 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{5 \times 5}{6 \times 7}$; $\frac{7 \times 7}{8 \times 9}$; $\frac{9 \times 9}{10 \times 11}$; &c.

E X E M P L. IX.

TAB. IX. Denique proponatur (Fig. 57.) Quadratrix VDE, cujus Vertex est V, A Centrum, & AV Semidiameter Circuli interioris, cui ea aptatur, & rectus sit Angulus VAE. Jam, per A ducatur quævis Recta AKD occurrens Circulo in K, & Quadratrici in D, & super AE demittantur KG, DB ad rectos Angulos; dic KV = x ; VA = a ; AG = z , & BD = y ; & erit, ut in superiore Exemplo, $x = z + \frac{z^3}{6aa} + \frac{3z^5}{40a^4} + \frac{5z^7}{112a^4}$; &c. Extrahe Radicem z , unde prodibit $z = x - \frac{x^3}{6aa} + \frac{x^5}{120a^4} - \frac{x^7}{5040a^6}$; &c. cujus Quadratum subduc ex AK^q, aut aa ; & reliqui Radix $a - \frac{x^2}{2a} + \frac{x^4}{24a^3} - \frac{x^6}{720a^5}$; &c. erit GK. Nunc, quia ob Quadratricis naturam est AB = VR = x , & est AG : GK :: AB : BD (y), divide AB \times GK per AG, quo pacto habebis $y = a - \frac{x^2}{3a}$.

$$-\frac{x^4}{45a^3} - \frac{2x^6}{945a^5}; \text{ \&c. Ergo (per Probl. I) } \dot{y} = -\frac{2x}{3a} - \frac{4x^3}{45a^3}$$

$$-\frac{4x^5}{315a^5}; \text{ \&c. , cujus Quadrato adjice Unitatem, \& quære Sum-$$

$$mæ Radicem, futuram } 1 + \frac{2xx}{9aa} + \frac{14x^4}{405a^4} + \frac{604x^6}{127575a^6}; \text{ \&c. } = x.$$

Unde (per Probl. II.) potest obtineri Arcus Quadratricis, videlicet

$$VD = x + \frac{2x^3}{27aa} + \frac{14x^5}{2825a^4} + \frac{604x^7}{893025a^6}; \text{ \&c. \&c. \&c. }$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



1894

OPUSCULUM

OPUSCULUM III
ISAACI
NEWTONI
TRACTATUS
DE
QUADRATURA CURVARUM.

Editus LONDINI 1706.

If. Newtoni Opuscula, Tom. I

C.

THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
JUL 12 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



I S A A C I
 N E W T O N I
 T R A C T A T U S
 D E
 Q U A D R A T U R A C U R V A R U M.

 I N T R O D U C T I O.



UANTITATES Mathematicas, non
 ut ex partibus quàm minimis constan-
 tes, sed ut motu continuo descriptas
 hìc confidero. Lineæ describuntur æ
 describendo generantur non per appo-
 sitionem partium; sed per motum con-
 tinuum Punctorum; Superficies per
 motum Linearum; Solida per motum
 Superficierum; Anguli per rotationem
 Laterum; Tempora per fluxum con-
 tinuum, & sic in ceteris. Hæ Geneses in rerum naturâ locum verè
 C 6 2 habent,

habent, & in Motu Corporum quotidie cernuntur. Et ad hunc modum Veteres ducendo Rectas mobiles in longitudinem Rectarum immobilium Genesim docuerunt Rectangulorum.

Considerando igitur, quòd Quantitates æqualibus Temporibus crescentes & crescendo genitæ, pro Velocitate majori vel minori, quâ crescunt ac generantur, evadunt majores vel minores, Methodum quærebam determinandi Quantitates ex Velocitatibus Motuum vel Incrementorum, quibus generantur; & has Motuum vel Incrementorum Velocitates nominando *Fluxiones*, & Quantitates genitas nominando *Fluentes*, incidi paulatim annis 1665, & 1666. in Methodum Fluxionum, quâ hic usus sum in Quadraturâ Curvarum.

Fluxiones sunt quàm proximè ut Fluentium Augmenta æqualibus Temporis particulis quàm minimis genita, & ut accuratè loquar, sunt in primâ Ratione Augmentorum nascentium; exponi autem possunt per Lineas quascunque, quæ sunt ipsis proportionales.

TAB. I. Ut si (*Fig. 1.*) Areæ *ABC*, *ABDG* Ordinatis *BC*, *BD* super Basi *AB* uniformi cum Motu progredientibus describantur, harum Arearum Fluxiones erunt inter se ut Ordinatæ describentes *BC* & *BD*, & per Ordinatas illas exponi possunt; propterea quòd Ordinatæ illæ sunt ut Arearum Augmenta nascentia.

Progrediatur Ordinata *BC* de loco suo *BC* in locum quemvis novum *bc*.

Compleatur Parallelogrammum *BCEb*, ac ducatur Recta *VTH*, quæ Curvam tangat in *C*, ipsisque *bc* & *BA* productis occurrat in *T* & *V*: & Abscissæ *AB*, Ordinatæ *BC*, & Lineæ curvæ *ACc* Augmenta modò genita erunt *Bb*, *Ee* & *Cc*; & in horum Augmentorum nascentium Ratione primâ sunt Latera Trianguli *CET*, ideòque Fluxiones ipsarum *AB*, *BC*, & *AC* sunt ut Trianguli illius *CET* Latera *CE*, *ET*, & *TC*, & per eadem Latera exponi possunt, vel, quod perinde est, per Latera Trianguli confimilis *VBC*.

Eodem recidit, si sumantur Fluxiones in ultimâ Ratione partium evanescentium. Agatur Recta *Cc*, & producat eadem ad *K*. Re-deat Ordinata *bc* in locum suum priorem *BC*, & coeuntibus Punctis

Punctis C & c , Recta CK coincidit cum Tangente CH , & Triangulum evanescens CEc in ultimâ suâ formâ evadet simile Triangulo CET , & ejus Latera evanescencia CE , Ec , & Cc erunt ultimò inter se, ut sunt Trianguli alterius CET Latera CE , ET , & TC ; & propterea in hac Ratione sunt Fluxiones Linearum AB , BC & CA . Si Puncta C & c parvo quovis intervallo à se invicem distant, Recta CK parvo intervallo à Tangente CH distabit. Ut Recta CK cum Tangente CH coincidat, & Rationes ultimæ Linearum CE , Ec , & cC inveniantur, debent Puncta C & c coire & omnino coincidere. Errores quàm minimi in rebus mathematicis non sunt contemnendi.

Simili argumento, si CIRCULUS Centro B , Radio BC , descriptus in longitudinem Abscissæ AB ad Angulos rectos uniformi cum motu ducatur, Fluxio Solidi geniti ABC erit ut Circulus ille generans; & Fluxio Superficie ejus erit ut Perimeter Circuli illius; & Fluxio Lineæ curvæ AC conjunctim. Nam, quo Tempore Solidum ABC generatur ducendo Circulum illum in longitudinem Abscissæ AB , eodem Superficies ejus generatur ducendo Perimetrum Circuli illius in Longitudinem Curvæ AC . Hujus Methodi accipe etiam Exempla; quæ sequuntur.

II.

*Recta (Fig. 2.) PB circa Polum datum P revolvens secet aliam TAB. III.
Positione datam Rectam AB : queritur Proportio Fluxionum Rectarum illarum AB & PB .*

Progrediatur Recta PB de loco suo PB in locum novum Pb . In Pb capiatur PC ipsi PB æqualis, & ad AB ducatur PD sic, ut Angulus bPD æqualis sit Angulo bBC ; & ob similitudinem Triangulorum bBC , bPD , erit Augmentum Bb ad Augmentum Cb , ut Pb ad bD . Redeat jam Pb in locum suum priorem PB , ut Augmenta illa evanescant, & evanescentium Ratio ultima, id est, Ratio ultima Pb ad Db , ea erit quæ est PB ad DB , existente Angulo PDB recto; & propterea in hac Ratione est Fluxio ipsius AB ad Fluxionem ipsius PB .

C. c. 3.

II. Rectæ

I I.

TAB. II. *Recta* (Fig. 3.) *PB* circa datum Polum *P* revolvens secet alias duas Positione datas Rectas *AB* & *AE*, in *B* & *E*: *quaritur Proportio Fluxionum Rectarum illarum AB & AE.*

Progrediatur Recta revolvens *PB* de loco suo *PB* in locum novum *Pb* Rectas *AB*, *AE* in Punctis *b* & *e* secantem, & Rectæ *AE*, Parallela *BC* ducatur ipsi *Pb* occurrens in *C*, & erit *Bb* ad *BC*, ut *Ab* ad *Ae*; & *BC* ad *Ee*, ut *PB* ad *PE*; & , conjunctis Rationibus, *Bb* ad *Ee*, ut *Ab* × *PB* ad *Ae* × *PE*. Re-deat jam Linea *Pb* in locum suum priorem *PB*, & Augmentum evanescens *Bb* erit ad Augmentum evanescens *Ee*, ut *AB* × *PB* ad *AE* × *PE*, idæoque in hac Ratione est Fluxio Rectæ *AB* ad Fluxionem Rectæ *AE*.

Hinc si Recta revolvens *PB* Lineas quasvis curvas Positione datas secet in Punctis *B*, & *E*, & Rectæ jam mobiles *AB*, *AE*, Curvas illas tangant in sectionum Punctis *B*, & *E*; erit Fluxio Curvæ, quam Recta *AB* tangit, ad Fluxionem Curvæ, quam Recta *AE* tangit, ut *AB* × *PB* ad *AE* × *PE*. Id quod etiam eveniet, si Recta *PB* Curvam aliquam Positione datam perpetuò tangat in Puncto mobili *P*.

I I I.

Fluat Quantitas x uniformiter, & invenienda sit Fluxio Quantitatis x^n .

Quo Tempore Quantitas *x* fluendo evadit *x + o*. Quantitas x^n evadet $x + o^n$, id est, per Methodum Serierum infinitarum,

$$x^n + nox^{n-1} + \frac{nn-n}{2} oo x^{n-2} + ; & c.$$

$$\text{Et Augmenta } o \text{ \& } nox^{n-1} + \frac{nn-n}{2} oo x^{n-2} + ; & c.$$

$$\text{sunt ad se invicem, ut } 1 \text{ \& } nx^{n-1} + \frac{nn-n}{2} o x^{n-2} + ; & c.$$

Eva-

Evanescent jam Augmenta illa, & eorum Ratio ultima erit 1 ad $n x^{n-1}$: ideoque Fluxio Quantitatis x est ad Fluxionem Quantitatis x^n , ut 1 ad $n x^{n-1}$.

Similibus argumentis, per Methodum Rationum primarum & ultimarum, colligi possunt Fluxiones Linearum, seu rectarum seu curvarum, in casibus quibuscunque; ut & Fluxiones Superficierum, Angulorum, & aliarum Quantitatum. In finitis autem Quantitatibus Analysis instituire, & finitarum nascentium vel evanescentium Rationes primas vel ultimas investigare, consonum est Geometrie Veterum; & volui ostendere quod in Methodo Fluxionum non opus sit Figuras infinite parvas in Geometriam introducere. Peragi tamen potest Analysis in Figuris quibuscunque, seu finitis seu infinite parvis, quæ Figuris evanescentibus finguntur similes, ut & in Figuris, quæ per Methodos *Indivisibilium* pro infinite parvis haberi solent, modò cautè procedas.

Ex Fluxionibus invenire Fluents Problema difficilius est, & Solutionis primus gradus æquipollet Quadraturæ Curvarum; de qua sequentia olim scripsi.



TRACTA-



TRACTATUS

DE

QUADRATURA CURVARUM.

QUANTITATES indeterminatas ut Motu perpétuo crescentes vel decrecentes, id est, ut fluentes vel defluentes in sequentibus considero, designoque litteris z, y, x, u , & earum Fluxiones, seu Celeritates crescendi, noto iisdem litteris punctatis $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{u}$. Sunt & harum Fluxionum Fluxiones, seu mutationes magis aut minus celeres, quas ipsarum z, y, x, u , Fluxiones secundas nominare licet, & sic designare $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{u}$, & harum Fluxiones primas, seu ipsarum z, y, x, u , Fluxiones tertias, sic $\dddot{z}, \dddot{y}, \dddot{x}, \dddot{u}$, & quartas sic $\ddddot{z}, \ddddot{y}, \ddddot{x}, \ddddot{u}$. Et quemadmodum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{u}$, sunt Fluxiones Quantitatum $\ddot{z}, \ddot{y}, \ddot{x}, \ddot{u}$; & hæ sunt Fluxiones Quantitatum $\dot{z}, \dot{y}, \dot{x}, \dot{u}$; & hæ sunt Fluxiones Quantitatum primarum z, y, x, u : sic hæ Quantitates considerari possunt ut Fluxiones aliarum, quas sic designabo, $\dot{\dot{z}}, \dot{\dot{y}}, \dot{\dot{x}}, \dot{\dot{u}}$; & hæ ut Fluxiones aliarum $\ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\dot{x}}, \ddot{\dot{u}}$; & hæ ut Fluxiones aliarum $\dddot{\dot{z}}, \dddot{\dot{y}}, \dddot{\dot{x}}, \dddot{\dot{u}}$. Designant igitur $\dot{\dot{z}}, \dot{\dot{z}}, \dot{\dot{z}}, \dot{\dot{z}}, \ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{z}}, \ddot{\dot{z}}$, &c. Seriem Quantitatum, quarum quælibet posterior est Fluxio præcedentis; & quælibet prior est Fluens Quantitas Fluxionem habens subsequenter. Similis est Series $\sqrt{ax} - \sqrt{x^2}, \sqrt{ax} - \sqrt{x^2}, \sqrt{ax} - \sqrt{x^2}, \sqrt{ax}$.

$\sqrt{az - zz}$, $\sqrt{az - zz}$, $\sqrt{az - zz}$, $\sqrt{az - zz}$; ut &

Series: $\frac{az + zz}{a - z}$, $\frac{az + zz}{a - z}$, $\frac{az + zz}{a - z}$, $\frac{az + zz}{a - z}$, $\frac{az + zz}{a - z}$,

$\frac{az + zz}{a - z}$...: & notandum est, quod Quantitas quælibet prior in his

Seriebus est, ut Area Figuræ curvilinæ, cujus ordinatim Applicata rectangula est Quantitas posterior & Abscissa est z : uti $\sqrt{az - zz}$,

Area Curvæ, cujus Ordinata est $\sqrt{az - zz}$, & Abscissa z . Quod autem spectant hæc omnia patebit in Propositionibus, quæ sequuntur.

PROPOSITIO I.

PROBLEMA I.

Datâ Equatione quocunque Fluente Quantitates involvente, invenire Fluxiones.

SOLUTIO.

Multiplicetur omnis Equationis Terminus per Indicem Dignitatis Quantitatis cujusque fluentis quam involvit, & in singulis Multiplicationibus mutetur Dignitatis Latus in Fluxionem suam; & Aggregatum Factorum omnium sub propriis Signis erit Æquatio nova.

EXPLICATIO.

Sunto a, b, c, d , &c. Quantitates determinatæ & immutabiles, & proponatur Æquatio quævis Quantitates fluentes x, y, z , &c. involvens, uti $x^3 - xyy + aaz - b^3 = 0$. Multiplicentur Termini primò per Indices Dignitatum x , & in singulis Multiplicationibus pro Dignitatis Latere, seu x unius Dimensionis, scribatur \dot{x} ; & Summa Factorum erit $3\dot{x}xx - \dot{x}yy$.

J. Newtoni Opuscula, Tom. I.

Dd

Idem

Idem fiat in y , & prodibit — $2xy\dot{y}$. Idem fiat in z , & prodibit

$aa\dot{z}$. Ponatur Summa Factorum æqualis nihilo, & habebitur Æquatio $3xxx - xyy - 2xy\dot{y} + aa\dot{z} = 0$. Dico, quòd hac Æquatione definitur Relatio Fluxionum.

DEMONSTRATIO.

Nam, fit o Quantitas admodum parva, & sunt $o\dot{z}$, $o\dot{y}$, $o\dot{x}$, Quantitatum z , y , x Momenta, id est, Incrementa momentanea synchrona. Et, si Quantitates fluentes jam sunt z , y , & x , hæ, post momentum temporis, Incrementis suis $o\dot{z}$, $o\dot{y}$, $o\dot{x}$, auctæ, evadent $z + o\dot{z}$, $y + o\dot{y}$, $x + o\dot{x}$, quæ in Æquatione primâ pro z , y , & x scriptæ, dant Æquationem $x^3 + 3xxo\dot{x} + 3xoo\dot{x}\dot{x} + ooo\dot{x}^2 - xyy - o\dot{x}yy - 2xoy\dot{y} - 2xoo\dot{y}\dot{y} - xoo\dot{y}\ddot{y} - xooo\dot{y}\ddot{y} + aa\dot{z} + aao\dot{z} - b^3 = 0$. Subducatur Æquatio prior, & Residuum divisum per o erit $3xxx + 3xxo\dot{x} + x^2oo - xyy - 2xy\dot{y} - 2xoy\dot{y} - xoy\ddot{y} - xoo\dot{y}\ddot{y} + aa\dot{z} = 0$. Minuatur Quantitas o in infinitum, & neglectis Terminis evanescentibus, restabit $3xxx - xyy - 2xy\dot{y} + aa\dot{z} = 0$. Q. E. D.

EXPLICATIO PLENIOR.

Ad eundem modum si Æquatio esset $x^3 - xyy + aa\sqrt{ax - yy}$, — $b^3 = 0$, produceretur $3xxx - xyy - 2xy\dot{y} + aa\sqrt{ax - yy} + aa\sqrt{ax - yy} = 0$. Ubi, si Fluxionem $\sqrt{ax - yy}$ tollere velis, pone $\sqrt{ax - yy} = z$, & erit $ax - yy = zz$, & (per hanc Propositionem) $a\dot{x} - 2\dot{y}y = 2z\dot{z}$, seu $\frac{a\dot{x} - 2\dot{y}y}{2z} = \dot{z}$, hoc est.

est, $\frac{ax - 2yy}{2\sqrt{ax - yy}} = \sqrt{ax} - yy$. Et inde $3xxx - xyy - 2xyy$

$$+ \frac{a^2x - 2aaa}{2\sqrt{ax - yy}} = 0.$$

Et, per Operationem repetitam pergitur ad Fluxiones secundas, tertias, & sequentes.

Sit Aequatio $xy^3 - x^4 + a^4 = 0$, & fiet, per Operationem primam, $xy^3 + 3xyyy - 4xz^3 = 0$; per secundam $xy^3 + 6xyyy + 3xyyy + 6xyyy - 4xz^3 - 12xxz = 0$; per tertiam $xy^3 + 9xyyy + 9xyyy + 18xyyy + 3xyyy + 18xyyy + 6xyyy - 4xz^3 - 36xxz - 24xxz = 0$.

Ubi verò sic pergitur ad Fluxiones secundas, tertias, & sequentes, convenit Quantitatem aliquam ut uniformiter fluentem considerare, & pro ejus Fluxione primâ Unitatem scribere, pro secundâ verò & sequentibus nihil. Sit Aequatio $xy^3 - x^4 + a^4 = 0$, ut supra; & fluat x uniformiter, sitque ejus Fluxio Unitas, & fiet, per Operationem primam $y^3 + 3xyyy - 4xz^3 = 0$; per secundam $6xyyy + 3xyyy + 6xyyy - 12xz = 0$; per tertiam $9xyyy + 18xyyy + 3xyyy + 18xyyy + 6xyyy - 24xz = 0$.

In hujus autem generis Aequationibus concipiendum est, quòd Fluxiones in singulis Terminis sint ejusdem ordinis, id est, vel omnes primi ordinis y , x , vel omnes secundi, y , yy , yz , zz , vel omnes tertii, y , yy , yz , y^3 , yyz , yzx , z^3 , &c. Et, ubi res aliter se habet, complendus est ordo per subintellectas Fluxiones Quantitatis uniformiter fluentis. Sic Aequatio novissima, complendo ordinem tertium, fit $9xyyy + 18xyyy + 3xyyy + 18xyyy + 6xy^3 - 24xz^3 = 0$.

PROPOSITIO II.

PROBLEMA II.

Invenire Curvas, quæ quadrari possunt.

TAB. I. Sit (Fig. 1.) ABC Figura invenienda, BC ordinatim Applicata rectangula, & AB Abscissa. Producatur CB ad D ut fit $BD = 1$, & compleatur Parallelogrammum $ABDG$: & Area-
rum ABC , $ABDG$ Fluxiones erunt ut BC & BD : Assuma-
tur igitur Æquatio quævis, quâ Relatio Arearum definiatur, & in-
de dabitur Relatio Ordinarum BC & BD per Prop. I. *Q. E. I.*
Hujus rei Exempla habentur in Propositionibus duabus sequen-
tibus.

PROPOSITIO III.

THEOR. I.

Si pro Abscissâ AB & Areâ AD , seu $AB \times 1$, promiscuè
scribatur z , & si pro $e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n} + \dots$ Scri-
batur R : fit autem Area Curvæ $z^\theta R^\lambda$ erit ordinatim Applicata:
 $BC =$

$$\begin{array}{ccccccc} \theta e & + \theta & & + \theta & & + \theta & \\ & fz^n & & & & & \\ & + \lambda n & & + 2\lambda n & & + 3\lambda n & \end{array} \quad \begin{array}{c} gz^{2n} \\ hz^{3n} \end{array} + \dots; \text{ & c. in } z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$$

DEMONSTRATIO.

Nam, si fit $z^\theta R^\lambda = u$, erit, per Prop. I, $\theta z^{\theta-1} R^\lambda + \lambda z^\theta \dot{R} R^{\lambda-1} = \dot{u}$. Pro R^λ , in primo Æquationis Terminò, &
 z^θ in secundo, scribe $R R^{\lambda-1}$ & $z z^{\theta-1}$, & fiet $\theta z R + \lambda z \dot{R}$
in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1} = u$. Erat autem $R = e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n} + \dots$

+ $b z^{3n} + \text{etc.}$ Et inde, per Prop. I, fit $R = n f z^{n-1} + 2 n g z^{2n-1} + 3 n h z^{3n-1} + \text{etc.}$, quibus substitutis & scripta BD seu 1 pro z , fiet

$$\begin{array}{ccccccc} +\theta & +\theta & +\theta & & +\text{etc.} \\ \theta e & f z^n & g z^{2n} & h z^{3n} & & \text{in } z^{\theta-1} R^{\lambda-1} \\ +\lambda\eta & +2\lambda\eta & +3\lambda\eta & & +\text{etc.} \\ = u = & BC. & Q. & E. & D. & \end{array}$$

PROPOSITIO IV.

THEOR. II.

Si Curvæ Absciffa AB fit z , & si pro $e + f z^n + g z^{2n} + \text{etc.}$ scribatur R , & pro $k + l z^n + m z^{2n} + \text{etc.}$ Scribatur S : fit autem Area Curvæ $z^\theta R^\lambda S^\mu$: erit ordinatim Applicata $BC =$.

$$\left. \begin{array}{l} \theta e k \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +\lambda n \end{array} \right\} f k \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +2\lambda n \end{array} \right\} g k \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +2\lambda n \end{array} \right\} \dots * \dots * \dots * \dots * \\ +\theta \\ e l \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +\lambda n f l \end{array} \right\} z^{2n} + \theta \\ +\mu n \left\{ \begin{array}{l} +\mu n \\ +2\lambda n g l \\ +\mu n \end{array} \right\} z^{2n} + \theta \\ +\theta \\ e m \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +\lambda n f m \\ +2\mu n \end{array} \right\} z^{3n} \dots * \dots * \dots * \\ +2\mu n \left\{ \begin{array}{l} +\theta \\ +\lambda n f m \\ +2\mu n \end{array} \right\} z^{3n} \dots * \dots * \dots * \end{array} \right\} \text{in } z^{\theta-1} R^{\lambda-1} S^{\mu-1}$$

Demonstratur ad modum Propositionis superioris.

Et z

PROQ

PROPOSITIO V.

THEOR. III.

Si Curvæ Abſciſſa AB fit z , & pro $e + fz^n + gz^{2n} + bz^{3n} + \&c.$ ſcribatur R : fit autem ordinatim Applicata $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$ in $a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \&c.$ & ponatur $\frac{\theta}{n} = r$; $r + \lambda = f$; $f + \lambda = r$; $r + \lambda = u$; $\&c.$

$$\begin{aligned} \text{erit Area } z^{\theta} R^{\lambda} \text{ in } & + \frac{\frac{1}{n} a}{r} \\ & + \frac{\frac{1}{n} b - sfA}{r + 1 \times e} z^n \\ & + \frac{\frac{1}{n} c - [r + 1] \times fB - sgA}{r + 2 \times e} z^{2n} \\ & + \frac{\frac{1}{n} d - [r + 2] \times fC - [r + 1] \times gB - ubA}{r + 3 \times e} z^{3n} \\ & + \frac{-[r + 3] \times fD - [r + 2] \times gC - [u + 1] \times bB}{r + 4 \times e} z^{4n} \\ & + \&c. \end{aligned}$$

Ubi A, B, C, D , &c. denotant totas Coefficientes datas Terminorum ſingulorum in Serie cum ſignis ſuis $+$, & $-$, nempe

$$A \text{ primi Termini Coefficientem } + \frac{\frac{1}{n} a}{r}$$

$$B \text{ ſecundi Termini Coefficientem } + \frac{\frac{1}{n} b - sfA}{r + 1 \times e}$$

$$C \text{ tertii Termini Coefficientem } + \frac{\frac{1}{n} c - [r + 1] \times fB - sgA}{r + 2 \times e}$$

Et ſic deinceps.

DE

DEMONSTRATIO.

Sunto, juxta Propositionem tertiam

CURVARUM ORDINATE.

1. θe	$+ \theta$	fAz^n	$+ \theta$	gAz^{2n}	$+ \theta$	bAz^{3n}	$+ \theta$	$+ \&c.$	} in $z^{\theta-1} R^{\lambda-n}$
	$+ \lambda e$		$+ 2\lambda n$		$+ 3\lambda n$		$+ \&c.$		
2. . .	$+ \theta$	eBz^n	$+ \theta$	fBz^{2n}	$+ \theta$	gBz^{3n}	$+ \theta$	$+ \&c.$	
	$+ n$		$+ \lambda n$		$+ 2\lambda n$		$+ \&c.$		
3.			$+ \theta$	eCz^{2n}	$+ \theta$	fCz^{3n}	$+ \theta$	$+ \&c.$	
			$+ 2n$		$+ \lambda n$		$+ \&c.$		
4.					$+ \theta$		$+ \&c.$		
					eDz^{3n}		$+ \&c.$		
					$+ 3n$		$+ \&c.$		

CURVARUM AREÆ.

1. $Az^{\theta} R^{\lambda}$
2. $Bz^{\theta+n} R^{\lambda}$
3. $Cz^{\theta+2n} R^{\lambda}$
4. $Dz^{\theta+3n} R^{\lambda}$

Et si Summa Ordinarum ponatur æqualis Ordinatz $a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \&c.$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, Summa Arcarum $z^{\theta} R^{\lambda}$ in $A + Bz^n + Cz^{2n} + Dz^{3n} + \&c.$ æqualis erit Areæ Curvæ, cujus ista est Ordinata. Æquentur igitur Ordinarum Termini correspondentes.

& fiet $a = \theta e A$.

$$b = \frac{\theta + \lambda n}{\theta + \lambda n} \times fA + \frac{\theta + n}{\theta + n} \times eB,$$

$$c = \frac{\theta + 2\lambda n}{\theta + 2\lambda n} \times gA + \frac{\theta + n}{\theta + n} \times fB + \frac{\theta + 2n}{\theta + 2n} \times eC,$$

&c.

&c.

$$\& \text{ inde } A = \frac{a}{\theta^e}$$

$$B = \frac{b - \theta + \lambda n \times f A}{\theta + n \times e}$$

$$C = \frac{c - \theta + 2 \lambda n \times g A - \theta + n + \lambda n \times f B}{\theta + 2 n \times e}$$

Et sic deinceps in infinitum.

Pone jam $\frac{\theta}{n} = r$; $r + \lambda = s$; $s + \lambda = t$ &c. & in Area $z^\theta R^\lambda$ in $A + Bz^n + Cz^{2n} + Dz^{3n} + \&c.$ scribe ipsorum $A, B, C, \&c.$ valores inventos, & prodibit Series proposita. *Q. E. D.*

Et notandum est, quòd Ordinata omnis duobus modis in Seriem resolvitur. Nam Index n vel affirmativus esse potest, vel negativus.

Proponatur Ordinata $\frac{3k - lzz}{zz\sqrt{kz - lzz + mzz}}$. Hæc vel sic scribi

potest $z^{-\frac{r}{2}} \times \frac{3k - lzz \times k - lzz + mzz}{-l + 3kz - 2 \times m - lzz^{-1} + kz^{-1}}^{-\frac{1}{2}}$, vel sic $z \times$

In Casu priore est $a = 3k$; $b = 0$; $c = -l$; $e = k$; $f = 0$; $g = -l$; $h = m$; $\lambda = -\frac{1}{2}$; $n = 1$; $\theta - 1 = -\frac{5}{2}$; $\theta = -\frac{3}{2} = r$; $s = -1$; $t = -\frac{1}{2}$; $u = 0$.

In posteriore est $a = -l$; $b = 0$; $c = 3k$; $e = m$; $f = -l$; $g = 0$; $h = 1$; $\lambda = -\frac{1}{2}$; $n = -1$; $\theta - 1 = 1$; $\theta = 2$; $r = -2$; $s = -1$; $t = -1$; $u = -\frac{1}{2}$;

Tentandus est casus uterque. Et, si Serierum alterutra ob Terminos tandem deficientes abruptitur ac terminatur, habebitur Area Curvæ in Terminis finitis. Sic, in Exempli hujus priore Casu, scribendo in Serie valores ipsorum $a, b, c, e, f, g, h, \lambda, \theta, r, s, t, u,$
Termini

Termini omnes post primum evanescunt in infinitum, & Area Cur-

væ prodit $2\sqrt{\frac{k - lxx + mx^3}{2}}$. Et hæc Area ob signum nega-

tivum adjacet Abscissæ ultra Ordinatam productæ. Nam, Area omnis affirmativa adjacet tam Abscissæ quàm Ordinatæ; negativa verò cadit ad contrarias partes Ordinatæ, & adjacet Abscissæ pro-

ductæ, manente scilicet signo Ordinatæ. Hoc modo Series alterutra, & nonnumquam utraque, semper terminatur & finita evadit, si Curva geometricè quadrari potest. At, si Curva talem Quadraturam non admittit, Series utraqùe continuabitur in infinitum, & earum altera converget & Aream dabit approximando, præterquam ubi r , (propter Aream infinitam,) vel nihil est, vel numerus in-

teger & negativus; vel ubi $\frac{z}{e}$ æqualis est Unitati. Si $\frac{z}{e}$ minor est

Unitate, converget Series, in quâ Index n affirmativus est: sin $\frac{z}{e}$ Unitate major est, converget Series altera. In uno Casu Area adjacet Abscissæ ad usque Ordinatam ductæ, in altero adjacet Abscissæ ultra Ordinatam productæ.

Nota insuper, quòd si Ordinata contentum est sub Factore rationali Q , & Factore furdo irreducibili R^π , & Factoris furdi Latus R non dividit Factorem rationalem Q ; erit $\lambda - 1 = \pi$; & $R^{\lambda-1} = R^\pi$. Sin Factoris furdi Latus R dividit Factorem rationalem semel, erit $\lambda - 1 = \pi + 1$, & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+1}$; si dividat bis, erit $\lambda - 1 = \pi + 2$, & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+2}$; si ter, erit $\lambda - 1 = \pi + 3$, & $R^{\lambda-1} = R^{\pi+3}$; & sic deinceps.

Si Ordinata est Fractio rationalis irreducibilis cum Denominatore ex duobus vel pluribus Terminis composito; resolvendus est Denominator in Divisores suos omnes primos. Et si Divisor sit aliquis, cui nullus alius est æqualis, Curva quadrari nequit; sin duo vel plures sint Divisores æquales, rejiciendus est eorum unus; & si adhuc alii duo vel plures sint sibi mutuò æquales & prioribus inæquales, rejiciendus est etiam eo-

J. Newtoni Opuscula, Tom. I.

E e

rum

rum unus, & sic in aliis omnibus æqualibus, si adhuc plures sint: deinde Divisor, qui relinquitur, vel contentum sub Divisoribus omnibus, qui relinquuntur, si plures sunt, ponendum est pro R , & ejus Quadrati reciprocum R^{-2} pro $R^{\lambda-1}$, præterquàm ubi contentum illud est Quadratum, vel Cubus, vel Quadrato-Quadratum, &c. quo casu ejus Latus ponendum est pro R , & Potestatis Index 2, vel 3, vel 4, negativè sumptus pro λ . Et Ordinata ad Denominatorem R^2 , vel R^3 , vel R^4 , vel R^5 &c. reducenda.

Ut, si Ordinata fit $\frac{z^5 + z^4 - 8z^3}{z^5 + z^4 - 5z^3 - 2z + 8z - 4}$, quoniam hæc Fractio irreducibilis est, & Denominatoris Divisores sunt pares, nempe $z-1$, $z-2$, $z-4$, & $z+2$, $z+2$, rejicio Magnitudinis utriusque Divisorem unum, & reliquorum $z-1$, $z-1$, $z+2$, contentum $z^3 - 3z + 2$ pono pro R , & ejus Quadrati reciprocum $\frac{1}{R^2}$, seu R^{-2} , pro $R^{\lambda-1}$. Dein Or-

dinatam ad Denominatorem R^2 seu $R^{\lambda-1}$ reduco, & fit

$$\frac{z^5 - 9z^4 + 8z^3}{z^3 - 3z + 2} \text{, id est, } \frac{z^3 \times 8 - 9z + z^3 \times 2 - 3z + z^3}{z^3 - 3z + 2} \text{.}$$

Et inde est $a=8$; $b=-9$; $c=0$; $d=-1$; &c. $e=2$; $f=-3$; $g=0$; $h=1$; $i=1$; $j=-2$; $k=-1$; $n=1$; $\theta=1$; $\phi=3$; $\psi=4$; $\chi=3$; $\tau=2$; $\nu=1$. Et

his in Serie scriptis prodit Area $\frac{z^4}{z^3 - 3z + 2}$, Terminis omnibus in totâ Serie post primum evanescentibus.

Si denique Ordinata est Fractio irreducibilis, & ejus Denominator contentum est sub Factore rationali Q , & Factore furdo irreducibili R^π , inveniendi sunt Lateris R Divisores omnes primi, & rejiciendus est Divisor unus Magnitudinis cujusque; & per Divisores qui restant, si qui sint, multiplicandus est Factor rationalis Q ; & si factum æquale est Lateri R , vel Lateris illius Potestati aliqui, cujus Index est numerus integer, esto Index ille m , & erit: $\lambda-1 = \pi - m$; & $R^{\lambda-1} = R^{\pi-m}$.

Ut,

DE QUADRATURA CURVARUM. 219

Ut, si Ordinata fit $\frac{3q^3 - 2q^2x + 9q^2xx - qqx^3 - 6qx^4}{qq - xx \times \sqrt{q^3 + qqx - qxx - x^3}}$;

quoniam Factoris surdi Latus R , seu $q^3 + qqx - qxx - x^3$, Divisores habet $q+x$, $q-x$, $q-x$, qui duarum sunt Magnitudinum, rejicio Divisorem unum Magnitudinis utriusque, & per Divisorem $q+x$, qui relinquitur, multiplico Factorem rationalem $qq - xx$. Et quoniam Factum $q^3 + qqx - qxx - x^3$ æquale est Lateri R , pono $m = 1$, &c. inde, cum π fit $\frac{1}{3}$, fit $\lambda = 1 = \frac{4}{3}$

Ordinatam igitur reduco ad Denominatorem $R^{-\frac{4}{3}}$, & fit

$x^0 \times \frac{3q^6 + 2q^5x + 8q^4xx + 8q^3x^3 - 7qqx^4 - 6qx^5}{q^3 + qqx - qxx - x^3}^{-\frac{4}{3}}$. Unde est $a = 3q^6$; $b = 2q^5$; &c. , $e = q^3$; $f = qq$; &c. , $\theta = 1 = 0$; $\phi = 1 = n$; $\lambda = \frac{1}{3}$; $r = 1$; $f = \frac{2}{3}$; $s = \frac{1}{3}$; $n = 0$. Et his in Serie

scriptis, prodit Area $\frac{3qqx + 3x^3}{\sqrt{q^3 + qqx - qxx - x^3}}$, Terminis omnibus in Serie tota post tertium evanescentibus.

PROPOSITIO VI

THEOR. IV.

Si Curvæ Abscissa AB fit z , & scribantur R pro $e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n} + \text{&c.}$ & S pro $k + lz^n + mz^{2n} + pz^{3n} + \text{&c.}$ Sit autem ordinatim Applicata $z^{\theta-1} R^{\lambda-1} \times S^{\mu-1}$ in $a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \text{&c.}$, & si Terminorum $e, f, g, h, \text{&c.}$, & $k, l, m, p, \text{&c.}$ Rectangula sint.

$ek \quad fk \quad gk \quad hk; \text{ &c.}$
 $el \quad fl \quad gl \quad hl; \text{ &c.}$
 $em \quad fm \quad gm \quad hm; \text{ &c.}$
 $ep \quad fp \quad gp \quad hp; \text{ &c.}$
 Ec a

Ec

Et si Rectangulorum illorum Coefficientes numerales sint respective.

$$\frac{1}{n} = r; r + \lambda = f; f + \lambda = t; t + \lambda = u; \&c.$$

$$r + \mu = f'; f' + \mu = t'; t' + \mu = u'; u' + \mu = w'; \&c.$$

$$f' + \mu = t''; t'' + \mu = u''; u'' + \mu = w''; w'' + \mu = x''; \&c.$$

$$t'' + \mu = u'''; u''' + \mu = w'''; w''' + \mu = x'''; x''' + \mu = y'''; \&c.$$

Area Curvæ erit hæc

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{n}} R^{\lambda} S^{\mu} \text{ in } &+ \frac{\frac{1}{n} a}{rek} \\ &+ \frac{\frac{1}{n} b - sfkA}{r+1 \times ek} x^n \\ &+ \frac{\frac{1}{n} c - \overline{s+1} \times fkB - tfl}{r+2 \times ek} x^{2n} \\ &+ \frac{\frac{1}{n} d - \overline{s+2} \times fKC - \overline{t'+1} \times fl - v'gm}{r+3 \times ek} x^{3n} \\ &+ \&c. \end{aligned}$$

Ubi A denotat Terminum primi Coefficientem datum $\frac{1}{n} a$ cum signo + vel —; B Coefficientem datum secundi; C Coefficientem datum tertii; & sic deinceps. Terminorum verò, $a, b, c, \&c.$ $e, f, g, \&c. k, l, m, \&c.$ unus vel plures deesse possunt. Demonstratur Propositio ad modum præcedentis, & quæ ibi notantur hic

hic obtinent. Pergit autem Series talium Propositionum in infinitum, & Progressio Seriei manifesta est.

PROPOSITIO VII.

THEOR. V.

Si pro $e + fz^n + gx^{2n} + \phi c$. scribatur R ut supra, & in Curvæ alicujus Ordinata $z^{\theta} \pm n^{\alpha} R^{\lambda} \pm \tau$ maneant Quantitates datæ $\theta, n, \lambda, e, f, g, \phi c$. & pro e ac τ scribantur successive numeri quicunque integri: & si detur Area unius ex Curvis, quæ per Ordinatæ innumeratæ sic prodeunt designantur, si Ordinatae sunt duorum nominum in Vinculo Radicis, vel, si dentur Areæ duarum ex Curvis, si Ordinatae sunt trium nominum in Vinculo Radicis, vel Areæ trium ex Curvis, si Ordinatae sunt quatuor nominum in Vinculo Radicis, & sic deinceps in infinitum: dico, quod dabuntur Areæ Curvarum omnium. Pro nominibus hic habeo Terminos omnes in Vinculo Radicis tam deficientes quàm plenos, quorum Indices Dignitatum sunt in Progressione arithmetica. Sic Ordinata $\sqrt{a^+ - ax^+ + x^+}$ ob Terminos duos inter a^+ & $-ax^+$ deficientes pro Quinquinomio haberi debet. At $\sqrt{a^+ + x^+}$ Binomium est, & $\sqrt{a^+ + x^+ - \frac{x^+}{a^+}}$ Trinomium, cum Progressio jam per majores differentias procedat. Propositio verò sic demonstratur.

CASUS I.

Sunto Curvarum duarum Ordinatae $px^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & $qz^{\theta+n-1} \times R^{\lambda-1}$, & Areæ pA , & qB , existente R Quantitate trium nominum $e + fz^n + gx^{2n}$.

Et, cum per Prop. III., sit $z^{\theta} R^{\lambda}$ Area Curvæ, ejus Ordinata est $\theta e^{\frac{\theta}{2n}} + \theta f z^{\frac{n}{2n}} + \theta g x^{\frac{2n}{2n}}$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, subduc Ordinatæ

E c 3

natas

natas & Areas priores de Area & Ordinata posteriori, & manebit

$$\frac{\theta e + \theta}{p + \lambda n} f z^n + \frac{\theta}{2\lambda n} g z^{2n} \text{ in } z^{\theta-1} R^{\lambda-1}, \text{ Ordina-}$$

$$- q z^n$$

nata nova Curvæ; & $z^{\theta} R^{\lambda} - pA - qB$ ejusdem Area. Pone $\theta e = p$; & $\theta f + \lambda n f = q$, & Ordinata evadet $\frac{\theta}{2\lambda n} g z^{2n}$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & Area $z^{\theta} R^{\lambda} - \theta e A - \theta f B - \lambda n f B$. Divide utramque per $\theta g + 2\lambda n g$, & Arcam prodeuntem dic C , & assumptâ utcumque r , erit rC Area Curvæ, cujus Ordinata est $r z^{\theta+2n-1} R^{\lambda-1}$. Et, quâ ratione ex Areis pA & qB Arcam rC Ordinatæ $r z^{\theta+2n-1} R^{\lambda-1}$ congruentem invenimus, licebit ex Areis qB & rC Arcam quartam, puta fD , Ordinatæ $f z^{\theta+3n-1} R^{\lambda-1}$ congruentem invenire, & sic deinceps in infinitum. Et par est ratio Progressionis ab Areis B & A in partem contrariam pergentis. Si Terminorum θ , $\theta + \lambda n$, & $\theta + 2\lambda n$ aliquis deficit & Seriem abrumpit, assumatur Area pA in principio Progressionis unius, & Area qB in principio alterius, & ex his duabus Areis dabuntur Areæ omnes in Progressione utrâque. Et contra, ex aliis duabus Areis assumptis fit regressus per Analysin ad Areas A & B , adeo ut ex duabus datis ceteræ omnes dentur. Q. E. O.

Hic est casus Curvarum, ubi ipsius z Index θ augetur vel diminuitur perpetuâ Additione vel Subductione Quantitatis n . Casus alter est Curvarum ubi Index λ augetur vel diminuitur Unitatibus.

CASUS II.

Ordinatæ $p z^{\theta-1} R^{\lambda}$ & $q z^{\theta+n-1} R^{\lambda}$, quibus Areæ pA & qB jam respondeant, si in R , seu $e + f z^n + g z^{2n}$, ducantur, ac deinde ad R vicissim applicentur, evadunt $p e + p f z^n + p g z^{2n}$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$, & $q e z^n + q f z^{2n} + q g z^{3n}$ in $z^{\theta-1} R^{\lambda-1}$. Et, per Prop. III., est $z^{\theta} R^{\lambda}$ Area Curvæ, cujus Ordinata est $\theta a e$

DE QUADRATURA CURVARUM. 223

$$\theta ac \frac{+\theta}{+\lambda n} afx^n \frac{+\theta}{+\lambda n} agx^{2n} \text{ in } x^{\theta-1} R^{\lambda-1}, \& bx^{\theta+n} R^{\lambda}$$

$$\text{Area Curvæ, cujus Ordinata est } \frac{+\theta}{+\lambda n} bex^n, \frac{+\theta}{+\lambda n} bfx^{2n} \frac{+\theta}{+\lambda n} bgx^{3n}$$

in $x^{\theta-1} R^{\lambda-1}$. Et harum quatuor Arearum Summa est pA
 $+qB+ax^{\theta} R^{\lambda} + bx^{\theta+n} R^{\lambda}$, & Summa respondentium Or-
 dinatarum,

$$\left. \begin{array}{l} \theta ac \frac{+\theta}{+\lambda n} af \\ p e \frac{+\theta}{+\lambda n} be \\ + pf \\ + qe \end{array} \right\} x^n \left. \begin{array}{l} ag \frac{+\theta}{+\lambda n} \\ + n bf \\ + pg \\ + qf \end{array} \right\} x^{2n} + \left. \begin{array}{l} \frac{+\theta}{+\lambda n} bg \\ qg \end{array} \right\} x^{3n} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \theta ac \\ p e \\ + pf \\ + qe \end{array}} \right\} \text{ in } x^{\theta-1} R^{\lambda-1}$$

Si Terminus primus, tertius, & quartus ponantur seorsim æquales
 nihilo, per primum fiet $\theta ac + pe = 0$, seu $-\theta a = p$, per
 quartum $-\theta b - nb - 2\lambda nb = q$, & per tertium (eliminan-
 do p & q) $\frac{2ag}{f} = b$. Unde secundus fit $\frac{\lambda n aff - 4\lambda n age}{f}$; adeo-
 que Summa quatuor Ordinatarum est $\frac{\lambda n aff - 4\lambda n age}{f} x^{\theta+n-1}$
 $R^{\lambda-1}$, & Summa totidem respondentium Arearum est $ax^{\theta} R^{\lambda}$
 $+ \frac{2ag}{f} x^{\theta+n} R^{\lambda} - \theta a A - \frac{2\theta + 2n + 4\lambda n}{f} agB$. Dividan-
 tur hæ Summæ per $\frac{\lambda n aff + 4\lambda n age}{f}$, & si Quotum posterius
 dicatur D , erit D Area Curvæ, cujus Ordinata est. Quotum prius
 $x^{\theta+n-1} \times R^{\lambda-1}$. Et, eadem ratione, ponendo omnes
 Ordinatz Terminos, præter primum, æquales nihilo, potest Area
 Curvæ

Curvæ inveniri, cujus Ordinata est $z^{\theta} - R^{\lambda}$. Dicatur Area ista C ; & quâ ratione ex Areis A & B inventæ sunt Areæ C ac D , ex his Areis C ac D inveniri possunt aliæ duæ E & F Ordinatis $z^{\theta} - R^{\lambda}$ & $z^{\theta+n} - R^{\lambda}$ congruentes, & sic deinceps in infinitum. Et, per Analysin contrariam, regredi licet ab Areis E & F ad Areas C ac D , & inde ad Areas A & B , aliâque, quæ in Progressione sequantur. Igitur si Index λ perpetuâ Unitatum Additione vel Subductione augeatur vel minuatur, & ex Areis, quæ Ordinatis sic prodeuntibus respondent, duæ simplicissimæ habeantur, dantur aliæ omnes in infinitum. Q. E. O.

C A S U S I I I.

Et per Casus hosce duos conjunctos, si tam Index θ perpetuâ Additione vel Subductione ipsius n , quàm Index λ perpetuâ Additione vel Subductione Unitatis, utcunque augeatur vel minuatur, dabuntur Areæ singulis prodeuntibus Ordinatis respondentes. Q. E. O.

C A S U S I V.

Et simili argumento, si Ordinata constat ex quatuor nominibus in Vinculo Radicali, & dantur tres Arcarum; vel si constat ex quinque nominibus, & dantur quatuor Arcarum, & sic deinceps: dabuntur Areæ omnes, quæ addendo vel subducendo numerum n Indici θ , vel Unitatem Indici λ generari possunt. Et par est ratio Curvarum, ubi Ordinata ex Binomiis constantur, & Area una earum, quæ non sunt geometricè quadrabiles, datur. Q. E. O.

P R O P O S I T I O V I I I.

T H E O R E M V I.

Si pro $e + fz^n + gz^{2n} + \dots$, & $k + lz^n + mx^{2n} + \dots$ scribantur R & S ut supra, & in Curvæ alicujus Ordinata $z^{\theta \pm n^r} \times R^{\lambda \pm r}$

$R^{\lambda \pm \tau} S^{\mu \pm \nu}$ maneant Quantitates datæ $\theta, n, \lambda, \mu, e, f, g, k, l, m, &c.$ Et pro $\sigma, \tau, & \nu$, scribantur successive numeri quicunque integri: & si dentur Areæ duarum ex Curvis, quæ per Ordinatæ sic prodeunt designantur, si Quantitates R & S sunt Binomia; vel si dentur Areæ trium ex Curvis, si R & S conjunctim ex quinque nominibus constant; vel Areæ quatuor ex Curvis, si R & S conjunctim ex sex nominibus constant; & sic deinceps in infinitum: dico quòd dabuntur Areæ Curvarum omnium.

Demonstratur ad modum Propositionis superioris.

PROPOSITIO IX.

THEOR. VII.

Æquantur Curvarum Areæ inter se, quarum Ordinatæ sunt reciproce ut Fluxiones Abscissarum.

Nam, contenta sub Ordinatis & Fluxionibus Abscissarum erunt æqualia, & Fluxiones Arcuum sunt ut hæc contenta.

COROLL. I.

Si assumatur Relatio quævis inter Abscissas duarum Curvarum, & inde, per Prop. I., quærat Relatio Fluxionum Abscissarum, & ponantur Ordinatæ reciproce proportionales Fluxionibus, inveniri possunt innumeræ Curvæ, quarum Areæ sibi mutuò æquales erunt.

COROLL. II.

Sic enim Curva omnis, cujus hæc est Ordinata $x^{\theta - 1}$ in $e + f x^n + g x^{2n} + &c.$ assumendo Quantitatem quamvis pro x , & ponendo $\frac{n}{\nu} = f$, & $x^f = x$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{\nu}{n} x^{\frac{\theta - 1}{n}}$ in $e + f x^\nu + g x^{2\nu} + &c.$

COROLL. III.

Et Curva omnis, cujus Ordinata est $\frac{z^{\theta-1}}{a + bz^n + cz^{2n} + \phi c. \times c + fz^n + gz^{2n} + \phi c.}^{\lambda}$ assumendo Quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{n}{v} = f$; & $z^f = x$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{v^{\theta-n}}{n} \times \frac{1}{a + bx^v + cx^{2v} + \phi c. \times c + fx^v + gx^{2v} + \phi c.}^{\lambda}$.

COROLL. IV.

Et Curva omnis, cujus Ordinata est $\frac{z^{\theta-1}}{a + bz^n + cz^{2n} + \phi c. \times c + fz^n + gz^{2n} + \phi c.}^{\lambda} \times \frac{k + lx^n + mx^{2n} + \phi c.}^{\mu}$, Assumendo Quantitatem quamvis pro v , & ponendo $\frac{n}{v} = f$, & $z^f = x$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{v^{\theta-n}}{n} \times \frac{1}{a + bx^v + cx^{2v} + \phi c. \times c + fx^v + gx^{2v} + \phi c.}^{\lambda} \times \frac{k + lx^v + mx^{2v} + \phi c.}^{\mu}$.

COROLL. V.

Et Curva omnis, cujus Ordinata est $\frac{z^{\theta-1}}{a + fz^n + gz^{2n} + \phi c.}^{\lambda}$ Ponendo $\frac{1}{z} = x$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{x^{\theta+1}}{a + fx^{-n} + gx^{-2n} + \phi c.}^{\lambda}$, id est, $\frac{x^{\theta+1+n\lambda}}{f + cx^{n\lambda}}$, si duo sunt nomina in Vinculo Radicis, vel $\frac{x^{\theta+1+2n\lambda}}{g + fx^{n\lambda} + cx^{2n\lambda}}$, si tria sunt nomina; & sic deinceps.

COROLL.

COROLL. VI.

Et Curva omnis, cujus Ordinata est $x^{\theta-1} \sqrt[n]{e + f x^n + g x^{2n} + \phi c.}^\lambda$
 $\times k + l x^n + m x^{2n} + \phi c.^\mu$, ponendo $\frac{1}{z} = x$, migrat in aliam
 sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{1}{x^{\theta+1}} \sqrt[n]{e + f x^{-n} + g x^{-2n} + \phi c.}^\lambda$
 $\times k + l x^{-n} + m x^{-2n} + \phi c.^\mu$, id est, $\frac{1}{x^{\theta+1+n\lambda+n\mu}}$
 $\times \sqrt[n]{f + e x^n}^\lambda \times \sqrt[n]{l + k x^n}^\mu$, si bina sunt nomina in Vinculis Radi-
 cum, vel $\frac{1}{x^{\theta+1+2n\lambda+n\mu}} \sqrt[n]{g + f x^n + e x^{2n}}^\lambda \times \sqrt[n]{l + k x^n}^\mu$,
 si tria sunt nomina in Vinculo Radicis prioris, ac duo in Vinculo
 posterioris; & sic in aliis.

Et nota, quòd Areæ duæ æquales in novissimis hisce duobus Co-
 rollariis jacent ad contrarias partes Ordinatarum. Si Area in alteru-
 trā Curvā adjacet Abscissæ, Area huic æqualis in alterā Curvā adja-
 cet Abscissæ productæ.

COROLL. VII.

Si Relatio inter Curvæ alicujus Ordinatam y & Abscissam x defi-
 niatur per Æquationem quamvis affectam hujus formæ, y^a in e
 $+ f y^n x^d + g y^{2n} x^{2d} + h y^{3n} x^{3d} + \phi c. = x^b$ in $k + l y^n x^d$
 $+ m y^{2n} x^{2d} + \phi c.$, hæc Figura; assumendo $f = \frac{n-d}{n}, x =$
 $\frac{1}{z}, x^d = z^{-d}$, & $\lambda = \frac{n-d}{a\theta + 1 + n\lambda}$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus
 Abscissa x , ex datā Ordinatā z , determinatur per Æquationem non
 affectam $\frac{1}{f} z^{a\lambda} \times e + f z^n + g z^{2n} + h z^{3n} + \phi c.^\lambda \times$
 $k + l z^n + m z^{2n} + \phi c.^\mu = x$.

FF 2

COROLL.

COROLL. X.

Pro $ez^v + fz^{v+n} + gz^{v+2n} + \text{etc.} + ez^{v-1} + \text{etc.} + fz^{v+n-1} + \text{etc.} + gz^{v+2n-1} + \text{etc.} + k + k^n + m z^{2n} + \text{etc.} + n/z^{n-1} + 2nmz^{2n-1} + \text{etc.}$ scribantur R, r, S & \dot{f} respectivè, & Curva omnis, cujus Ordinata est $\pi S \dot{r} + R \dot{f}$ in $R^{\lambda-1} S^{\mu-1} \times a S^{\sigma} + b R^{\tau}$, si fit $\frac{\mu-1}{\lambda} = \frac{v}{\tau} = \frac{\phi}{\pi}, \frac{\tau}{\pi} = \sigma, \frac{\lambda-1}{\pi} = \vartheta$, & $R^{\pi} S^{\phi} = x$, migrat in aliam sibi æqualem, cujus Ordinata est $x^{\vartheta} \times a + b x^{\sigma}$.

Et nota, quòd Ordinata prior evadit simplicior, ponendo Unitates pro τ, v , & λ , vel μ , & faciendo ut Radix Dignitatis extrahi possit cujus Index est ω , vel ponendo $\omega = -1$, vel $\mu = 0$.

PROPOSITIO X.

PROBL. III.

Invenire Figuras simplicissimas, cum quibus Curva quævis geometricè comparari potest, cujus ordinatim Applicata y per Æquationem non affectam ex datâ Abscissâ x determinatur.

CASUS I.

Sit Ordinata $ax^{\theta-1}$, & Area erit $\frac{1}{\theta} ax^{\theta}$, ut ex Propos. V., ponendo $b = a = c = d = f = g = h$, & $e = 1$, facilè colligitur.

Eff. 3

COROLL.

CASUS II.

Sit Ordinata $ax^{\theta-1} \times \sqrt{e + fx^n + gx^{2n} + \phi c.}^{\lambda-1}$. Et, si Curva cum Figuris rectilineis geometricè comparari potest, quadrabitur per Prop. V. ponendo $b = o = c = d$. Sin minus convertetur in aliam Curvam sibi æqualem, cujus Ordinata est $\frac{a}{n}$

$x^{\frac{\theta-n}{n}} \times \sqrt{e + fx + gxx + \phi c.}^{\lambda-1}$ per Corol. II. Prop. IX. Deinde, si de Dignitatum Indicibus $\frac{\theta-n}{n}$, & $\lambda-1$, per Prop. VII., rejiciantur Unitates, donec Dignitates illæ fiant quàm-minimæ, devenietur ad Figuras simplicissimas, quæ hac ratione colligi possunt. Dein harum unaquæque, per Corol. V. Prop. IX. dat aliam, quæ nonnunquam simplicior est. Et ex his per Prop. III. & Coroll. IX. & X. Prop. IX. inter se collatis, Figuræ adhuc simpliciores quandoque prodeunt. Denique, ex Figuris simplicissimis assumptis facto regressu computabitur Area quæsitæ.

CASUS III.

Sit Ordinata $x^{\theta-1} \times \sqrt{a + bx^n + cx^{2n} + \phi c.} \times \sqrt{e + fx^n + gx^{2n} + \phi c.}^{\lambda-1}$, & hæc Figura, si quadrari potest, quadrabitur per Prop. V. Sin minus, distinguenda est Ordinata in partes $x^{\theta-1} \times a \times \sqrt{e + fx^n + gx^{2n} + \phi c.}^{\lambda-1}$, $x^{\theta-1} \times bx^n \times \sqrt{e + fx^n + gx^{2n} + \phi c.}^{\lambda-1}$, $\phi c.$ &, per Cas. II. inveniendæ sunt Figuræ simplicissimæ, cum quibus Figuræ partibus illis respondentes comparari possunt. Nam, Areæ Figurarum partibus illis respondentium sub signis suis + & — conjunctæ component Aream totam quæsitam.

CASUS

C A S U S IV.

Sit Ordinata $x^{\theta-1} \times a + bz^n + cz^{2n} + \phi c.$ \times
 $e + fz^n + gz^{2n} + \phi c.$ $^{\lambda-1} \times k + lx^n + mx^{2n} + \phi c.$ $^{\mu-1} :$
 & , si Curva quadrari potest, quadrabitur per Prop. VI. Sin minus,
 convertetur in simpliciolem, per Corol. IV. Prop. IX. ac deinde
 comparabitur cum Figuris simplicissimis, per Prop. VIII. & Corol.
 VI, IX, & X Prop. IX., ut fit in Casu II, & III.

C A S U S V.

Si Ordinata ex variis partibus constat, partes singulae pro Or-
 dinatis Curvarum totidem habendae sunt, & Curvae illae, quotquot
 quadrari possunt, sigillatim quadrandae sunt, earumque Ordinatae de
 Ordinata tota demendae. Dein Curva, quam Ordinatae pars resi-
 dua designat seorsim, (ut in Casu II, III, & IV.,) cum Fi-
 guris simplicissimis comparanda est, cum quibus comparari potest.
 Et Summa Arearum omnium pro Area Curvae propositae habenda
 est.

C O R O L L. I.

Hinc etiam Curva omnis, cujus Ordinata est Radix quadratica affe-
 cta Aequationis suae, cum Figuris simplicissimis, seu rectilineis, seu
 curvilineis, comparari potest. Nam, Radix illa ex duabus partibus
 semper constat, quae, seorsim spectatae, non sunt Aequationum Ra-
 dices affectae. Proponatur Aequatio $ayy + xzyy = 2a^3y + 2x^3y.$

— z^4 , & extracta Radix erit $y = \frac{a^3 + x^3 + a\sqrt{a^4 + 2az^3} - z^4}{aa + zz}.$

cujus pars rationalis $\frac{a^3 + x^3}{aa + zz}$, & pars irrationalis $\frac{a\sqrt{a^4 + 2az^3} - z^4}{aa + zz}$

sunt Ordinatae Curvarum, quae per hanc Propositionem vel quadrari
 possunt, vel cum Figuris simplicissimis comparari, cum quibus col-
 lationem geometricam admittunt.

C O R O L L.

COROLL. II.

Et Curva omnis, cujus Ordinata per Æquationem quamvis affectam definitur, quæ, per Corol. VII. Prop. IX., in Æquationem non affectam migrat, vel quadratur per hanc Propositionem, si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis, cum quibus comparari potest. Et hac ratione Curva omnis quadratur, cujus Æquatio est trium Terminorum. Nam Æquatio illa, si affecta sit, transmutatur in non affectam, per Corol. VII. Prop. IX., ac deinde per Corol. II., & V. Prop. IX., in simplicissimam migrando, dat vel Quadraturam Figuræ, si quadrari potest, vel Curvam simplicissimam, quâ cum comparatur.

COROLL. III.

Et Curva omnis, cujus Ordinata per Æquationem quamvis affectam definitur, quæ per Corol. VIII. Prop. IX. in Æquationem quadraticam affectam migrat, vel quadratur per hanc Propositionem, & hujus Corol. I., si quadrari potest, vel comparatur cum Figuris simplicissimis, cum quibus collationem geometricam admittit.

SCHOLIUM.

Ubi quadrandæ sunt Figuræ, ad Regulas hæcæ generales semper recurrere nimis molestum esset: præstat Figuras, quæ simpliciores sunt & magis usui esse possunt, semel quadrare, & Quadraturas in Tabulam referre; deinde Tabulam consulere, quoties ejusmodi Curvam aliquam quadrare oportet. Hujus autem generis sunt Tabulæ duæ sequentes, in quibus x denotat Abscissam, y Ordinatam rectangulam, & r Aream Curvæ quadrandæ, & d, e, f, g, h, n , sunt Quantitates datæ cum signis suis $+$ & $-$.

TABULA

T A B U L A

Curvarum simpliciorum, quae quadrari possunt.

Curvarum Formae.		Curvarum Aera.
<i>Forma prima.</i> $dx^{n-1} = y$		$\frac{d}{n} x^n = t$
<i>Forma secunda.</i> $\frac{dz^{n-1}}{ce + 2efz^n + ffz^{2n}} = y$		$\frac{dz^n}{nee + nefz^n} = t$, vel $\frac{-d}{nef + nffz^n} = t$.
1	<i>Forma tertia.</i> $dx^{n-1} \sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{2d}{3nf} R^3 = t$, existente $R = \sqrt{e + fz^n}$
2	$dx^{2n-1} \sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{-4e + 6fz^n}{15nff} dR^3 = t$
3	$dx^{3n-1} \sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{16ee - 24efz^n + 30ffz^{2n}}{105nf^3} dR^3 = t$
4	$dx^{4n-1} \sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{-96e^3 + 144ee fz^n - 180effz^{2n} + 210f^3 z^{3n}}{945nf^4} dR^3 = t$
1	<i>Forma quarta.</i> $\frac{dz^{n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{2d}{nf} R = t$
2	$\frac{dz^{2n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{-4e + 2fz^n}{3nff} dR = t$
3	$\frac{dz^{3n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{16ee - 8efz^n + 6ffz^{2n}}{15nf^3} dR = t$
4	$\frac{dz^{4n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{-96e^3 + 48ee fz^n - 36effz^{2n} + 30f^3 z^{3n}}{105nf^4} dR = t$

T A B U L A

Curvarum simpliciorum quæ cum Ellipsi & Hyperbola comparari possunt.

Sit jam (Fig. 4. 5. 6. 7.) aGD , vel PGD , vel $GD'S$, Sectio conica, cujus Area ad Quadraturam Curvæ propositæ requiritur, sitque ejus Centrum A ; Axis Ka ; Vertex a ; Semiaxis conjugatus AP ; datum Abscissæ principium A , vel a , vel a ; Abscissa AB , vel aB , vel $aB = x$; Ordinata rectangula $BD = y$; & Area $ABDP$, vel $aBDG$, vel $aBDG = f$; existente aG Ordinata ad Punctum a . Jungantur KD , AD , aD . Ducatur Tangens DT occurrens Abscissæ AB in T , & compleatur Parallelogrammum $ABDO$. Et, si quando ad Quadraturam Curvæ propositæ requiruntur Areæ duarum Sectionum conicarum, dicatur posterioris Abscissa ξ , Ordinata r , & Area σ . Sit autem \div differentia duarum Quantitatum, ubi incertum est utrum posterior de priori, an prior de posteriori subduci debeat.



CURVA

CURVARUM FORME.		SECTIONIS CONICE.		CURVARUM AREA.
Forma prima.		Abscissa.	Ordinata.	
FIG. 5.				
1	$\frac{dz^n - 1}{e + f_2^n} = y$	$z^n = x$	$\frac{d}{e + f_2^n} = u$	$\frac{1}{n} s = t = \frac{aGDB}{n}$
2	$\frac{dz^{2n} - 1}{e + f_2^n} = y$	$z^n = x$	$\frac{d}{e + f_2^n} = u$	$\frac{d}{nf} z^n - \frac{e}{nf} s = t$
3	$\frac{dz^{3n} - 1}{e + f_2^n} = y$	$z^n = x$	$\frac{d}{e + f_2^n} = u$	$\frac{d}{2nf} z^{2n} - \frac{de}{nf} z^n + \frac{e^2}{nf} s = t$
Forma secunda.				
FIG. 6.				
1	$\frac{dz^{\frac{1}{2}n} - 1}{e + f_2^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{e + f_2^n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{f}} - \frac{e}{f} xx = u$	$\frac{2xu \div 4s}{n} = t = \frac{4}{n} ADG$
2	$\frac{dz^{\frac{1}{2}n} - 1}{e + f_2^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{e + f_2^n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{f}} - \frac{e}{f} xx = u$	$\frac{2de}{nf} z^{\frac{n}{2}} + \frac{4es - 2exu}{nf} = t$
3	$\frac{dz^{\frac{1}{2}n} - 1}{e + f_2^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{e + f_2^n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{f}} - \frac{e}{f} xx = u$	$\frac{2de}{3nf} z^{\frac{3n}{2}} - \frac{2de}{nf} z^{\frac{n}{2}} + \frac{2exu - 4es}{nf} = t$

Forma tertia

Forma tertia.

FIG. 5. 1	$\frac{d}{2} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{f + exx} = u$	$\frac{4de}{nf} \ln \frac{V^3}{2ex} - s = t = \frac{4de}{nf} \ln \angle GDT, \text{ vel in } \angle PDB - TDB$
6.		$\frac{1}{2} = x$	$\sqrt{fx + exx} = u$	$\frac{8dec}{nff} \ln s - \frac{1}{2} xx - \frac{fu}{4e} + \frac{ffu}{4exx} = t = \frac{8dec}{nff} \ln \angle GDA + \frac{ffu}{4exx}$
7.		$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{f + exx} = u$	$-\frac{2d}{n} s = t = \frac{2d}{n} \angle PDB, \text{ seu } \frac{2d}{n} \angle GDB$
2	$\frac{d}{2^n + 1} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{fx + exx} = u$	$\frac{4de}{nf} \ln s - \frac{1}{2} xx - \frac{fu}{2e} = t = \frac{4de}{nf} \times \angle GDK$
		$\frac{1}{2} = x$	$\sqrt{f + exx} = u$	$-\frac{d}{n} s = t = \frac{d}{n} \times \angle GDB, \text{ vel } \angle BDPK$
3	$\frac{d}{2^{2n} + 1} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{fx + exx} = u$	$\frac{3df}{6ne} - \frac{2du^3}{6ne} = t$
4	$\frac{d}{2^{3n} + 1} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = x$	$\sqrt{fx + exx} = u$	

Forma quarta.

FIG. 5. 1	$\frac{d}{2} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{f + exx} = u$	$\frac{4d}{nf} \ln \frac{1}{2} xx - s = t = \frac{4d}{nf} \ln \angle PAD, \text{ vel in } \angle GDA$
		$\frac{1}{2} = x$	$\sqrt{fx + exx} = u$	$\frac{8de}{nff} \ln s - \frac{1}{2} xx - \frac{fu}{4e} = t = \frac{8de}{nff} \ln \angle GDA$
		$\frac{1}{2} = xx$	$\sqrt{f + exx} = u$	$\frac{2d}{ne} \ln s - xx = t = \frac{2d}{ne} \ln \angle POD, \text{ vel in } \angle ODG$
2	$\frac{d}{2^n + 1} \sqrt{e + f_2^n} = y$	$\frac{1}{2} = x$	$\sqrt{fx + exx} = u$	$\frac{4d}{nf} \ln \frac{1}{2} xx - s = t = \frac{4d}{nf} \ln \angle DGA$

3	$\frac{d}{2^{2n}+1} \sqrt{e+f_2^n}$	$\frac{1}{2^n} = x$	$\sqrt{fx+exx} = u$	$\frac{d}{ne} \text{ in } 3s + 2xu = t = \frac{d}{ne} \text{ in } 3ADGa \div \Delta ADB$
4	$\frac{d}{2^{2n}+1} \sqrt{e+f_2^n}$	$\frac{1}{2^n} = x$	$\sqrt{fx+exx} = u$	$\frac{10dfoxu - 15dfs - 2dexxu}{6nce} = r$
Forma quinta.				
1	$\frac{d}{d_2^{2n}-1} \sqrt{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}$	$\sqrt{\frac{d}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}} = y$	$\frac{d}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{e}} + \frac{ff - 4fg}{4gg} \frac{xx}{xx} = u$ $\frac{2u-2s}{n} = t$
	Vel sic	$\sqrt{\frac{d_2^{2n}}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}} = x$	$\frac{d_2^{2n}}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{e}} + \frac{ff - 4fg}{4ge} \frac{xx}{xx} = u$ $\frac{2s-xu}{n} = t$
2	$\frac{d}{d_2^{2n}-1} \sqrt{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}$	$\sqrt{\frac{d}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}} = y$	$\frac{d}{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}} = x$	$\sqrt{\frac{d}{e}} + \frac{ff - 4fg}{4gg} \frac{xx}{xx} = u$ $\frac{d\sigma + 2fs - fxu}{2ng} = t$
Forma sexta, ubi scribitur p. pro $\sqrt{ff+4eg}$.				
1	$\frac{d}{d_2^{2n}-1} \sqrt{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}$	$\sqrt{\frac{d}{f-p+2g_2^n}} = y$	$\frac{d}{f-p+2g_2^n} = x$	$\sqrt{d} + \frac{f+p}{2g} \frac{xx}{xx} = u$ $\frac{2xu-4s-2\frac{1}{2}r+4\sigma}{np} = t$
		$\sqrt{\frac{2dg}{f+p+2g_2^n}} = y$	$\frac{2dg}{f+p+2g_2^n} = x$	$\sqrt{d} + \frac{f-p}{2g} \frac{\xi\xi}{\xi\xi} = r$
2	$\frac{d}{d_2^{2n}-1} \sqrt{e+f_2^{2n}+g_2^{2n}}$	$\sqrt{\frac{d}{f_2^n-p_2^n+2g_2^n}} = y$	$\frac{d}{f_2^n-p_2^n+2g_2^n} = x$	$\sqrt{d} + \frac{f-p}{2g} \frac{xx}{xx} = u$
		$\sqrt{\frac{2dc_2^n}{f_2^n+p_2^n+2g_2^n}} = y$	$\frac{2dc_2^n}{f_2^n+p_2^n+2g_2^n} = x$	$\sqrt{d} + \frac{f-p}{2g} \frac{\xi\xi}{\xi\xi} = r$ $\frac{4s-2xu-4\sigma+2\frac{1}{2}r}{np} = t$

<p>FIG. 5. 1</p> <p>6.</p>	<p><i>Forma septima</i></p> $\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad \left\{ \begin{array}{l} z^n = x \\ \frac{1}{z^n} = \xi \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{e + fx + gxx} = u \\ \sqrt{g + f\xi + e\xi\xi} = r \end{array} \right.$ $\frac{4degzr + 2dfzr - 2dfu - 8decr + 4dfgs}{4neg - nff} = t$
2	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{d}{n} t = \frac{d}{n} \ln aGDB$
3	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{d}{3ng} u^3 - \frac{df}{2ng} s = t$
4	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{5degx - 5dfu^3}{24nng} + \frac{5dff - 4deg}{16nng} s = t$
FIG. 5. 1	<p><i>Forma octava.</i></p> $\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{8deg - 4dgxu - 2dfu}{4neg - nff} = t \quad \frac{8dg}{4neg - nff} \ln aGDB + \Delta DBA$
2	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{-4dfz + 2dfxu + 4deu}{4neg - nff} = t$
3	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{3dffs - 2dffxu - 2defu}{-4deg + 4deg} = t$
4	$\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} = y \quad z^n = x \quad \sqrt{e + fx + gxx} = u \quad \frac{36degfz + 8degxxu - 28degxu + 10deg}{-15deff - 2dffg + 10deff} = t$

Forma nona.				
1	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{df-eb-fg}{b} + \frac{fg}{b}xx} = u$	$\frac{4fg^2 - 2fg^2xu + \frac{2dfu}{x}}{-4eb^2 + \frac{2eb^2}{nfb}} = t$
2	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{df-eb-fg}{b} + \frac{fg}{b}xx} = u$	$\frac{4egb^2 - 2egb^2xu + \frac{2db^2}{3} \frac{du}{x} - 2dfg^2 \frac{u}{x}}{-4feg^2 + \frac{2feg^2}{nfb}} = t$
Forma decima.				
FIG. 5. 1	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{df-eb-fg}{b} + \frac{fg}{b}xx} = u$	$\frac{2xu - 4t}{nf} = t = \frac{4}{nf} ADGA$
6.	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{df-eb-fg}{b} + \frac{fg}{b}xx} = u$	$\frac{2gs - 2g^2xu + \frac{2du}{x}}{nfb} = t$
Forma undecima.				
1	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{eb-fg}{b} + \frac{f}{b}xx} = u$ $\sqrt{\frac{fg-eb}{b} + \frac{e}{b}xx} = r$	$\frac{dxu^2z^{-n} - 4dfs - 4dec}{nfg - neb} = t$
2	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{eb-fg}{b} + \frac{f}{b}xx} = u$	$\frac{2d}{nb} s = t$
3	$\frac{d^2}{dz} \frac{\sqrt{e+fz^n}}{g+bz^n} = y$	$\sqrt{\frac{d}{g+bz^n}} = x$	$\sqrt{\frac{eb-fg}{b} + \frac{f}{b}xx} = u$	$\frac{d^2xu^2 - 3dfgs}{2nfb} = t$

In Tabulis hifce, Series Curvarum cujusque Formæ utrinque in infinitum continuari potest, Scilicet in Tabulâ primâ, in Numeratoribus Arrearum Formæ tertiæ & quartæ, Numeri coefficientes initialium Terminorum (2, — 4, 16, — 96, 768, &c.) generantur multiplicando Numeros — 2, — 4, — 6, — 8, &c. in se continuò, & subsequentium Terminorum Coefficientes ex initialibus derivantur multiplicando ipsos gradatim, in Formâ quidem

tertiâ, per $-\frac{3}{2}$, $-\frac{5}{4}$, $-\frac{7}{6}$, $-\frac{9}{8}$, $-\frac{11}{10}$, &c.,

in quartâ verò per $-\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{6}$, $-\frac{7}{8}$, $-\frac{9}{10}$, &c.

Et Denominatorum Coefficientes 3, 15, 105, &c. prodeunt multiplicando Numeros 1, 3, 5, 7, 9, &c. in se continuò.

In secundâ verò Tabulâ, Series Curvarum Formæ primæ, secundæ, quintæ, sextæ, nonæ, & decimæ ope solius Divisionis, & Formæ reliquæ ope Propositionis tertiæ, & quartæ, utrinque producantur in infinitum.

Quin-etiam hæ Series mutando signum numeri n variari solent.

Sic enim ex: *gr.* Curva $\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n} = j$, evadit $\frac{d}{z^{\frac{1}{n}+1}} \sqrt{f+ez^n}$.

PROPOSITIO XL

THEOR. VIII

TAB. I.

Sit (Fig. 8.) *ADIC* Curva quævis Abscissam habens $AB = z$, & Ordinatam $BD = y$; & sit *AETC* Curva alia, cujus Ordinata BE æqualis est prioris Areæ ADB ad Unitatem applicatæ; & *AFLC* Curva tertia, cujus Ordinata BF æqualis est secundæ Areæ AEB ad Unitatem applicatæ; & *AGMC* Curva quarta, cujus Ordinata BG æqualis est tertiæ Areæ AFB ad Unitatem applicatæ; & *AHNC* Curva quinta, cujus Ordinata BH æqualis est quartæ Areæ AGB ad Unitatem applicatæ; & sic deinceps in infinitum. Et finto *A, B, C, D, E, &c.* Areæ Curvarum Ordinatas

natas habentium y, xy, x^2y, x^3y, x^4y , & Abfciffam communem x .

Detur Abfciffa quævis $AC = s$, fitque $BC = s - x = x$, & finto P, Q, R, S, T Areæ Curvarum Ordinatas habentium x, xy, x^2y, x^3y, x^4y , & Abfciffam communem x .

Terminentur autem hæ Areæ omnes ad Abfciffam totam datam AC , nec non ad Ordinatatam positione datam & infinite productam CI : Et erit Arearum sub initio positarum prima $ADIC = A = P$; secunda $AEKC = sA - B = Q$; tertia $AFLC = \frac{ssA - 2sB + C}{2} = \frac{1}{2}R$; quarta $AGMC = \frac{s^3A - 3s^2B + 3sC - D}{6} = \frac{1}{6}S$; quinta $AHNC = \frac{s^4A - 4s^3B + 6s^2C - 4sD + E}{24} = \frac{1}{24}T$.

COROLLARIUM.

Unde, si Curvæ, quarum Ordinatæ sunt y, xy, x^2y, x^3y , &c. vel y, xy, x^2y, x^3y , &c. quadrari possunt, quadrabuntur etiam Curvæ $ADIC, AEKC, AFLC, AGMC$, &c. Et habebuntur Ordinatæ BE, BF, BG, BH Areis Curvarum proportionales.

SCHOLIUM.

Quantitatum fluentium Fluxiones esse primas, secundas, tertias, quartas, aliasque diximus supra. Hæ Fluxiones sunt ut Termini Serierum infinitarum convergentium. Ut si x^n sit Quantitas fluens,

& fluendo evadat $x + o$, deinde resolvatur in Seriem convergentem $x^n + noz^{n-1} + \frac{nn-1}{2}ooz^{n-2} + \frac{n^3-3nn+2n}{6}o^3$

$x^{n-3} + \&c.$, Terminus primus hujus Seriei x^n erit Quantitas illa fluens; secundus noz^{n-1} erit ejus Incrementum primum, seu Differentia prima, cui nascenti proportionalis est ejus Fluxio

cf. Newtoni Opuscula, Tom. I.

H h

prima;

prima; tertius $\frac{nn - n}{2} ooz^{-n^2}$, erit ejus Incrementum secundum, seu Differentia secunda, cui nascenti proportionalis est ejus Fluxio secunda; quartus $\frac{n^3 - 3nn + 2n}{6} o^3 z^n$, erit ejus Incrementum tertium, seu Differentia tertia, cui nascenti Fluxio tertia proportionalis est, & sic deinceps in infinitum.

Exponi autem possunt, hæ Fluxiones per Curvarum Ordinatas BD , BE , BF , BG , BH , &c. ut, si Ordinata BE , ($= \frac{ADB}{1}$) fit Quantitas fluens, erit ejus Fluxio prima ut Ordinata BD . Si BF ($= \frac{AEB}{1}$) fit Quantitas fluens, erit ejus Fluxio prima ut Ordinata BE , & Fluxio secunda ut Ordinata BD . Si BH ($= \frac{AGB}{1}$) fit Quantitas fluens, erunt ejus Fluxiones, prima, secunda, tertia, & quarta, ut Ordinatæ BG , BF , BE , BD , respectivè.

Et hinc in Æquationibus, quæ Quantitates tantum duas incognitas involvunt, quarum una est Quantitas uniformiter fluens, & altera est Fluxio quælibet Quantitatis alterius fluentis, inveniri potest fluens illa altera per Quadraturam Curvarum. Exponatur enim Fluxio ejus per Ordinatam BD , & si hæc sit Fluxio prima, quærat Area $ADB = BE \times 1$; si Fluxio secunda, quærat Area $AEB = BF \times 1$; si Fluxio tertia, quærat Area $AFB = BG \times 1$, &c. Et Area inventa erit Exponens Fluëntis quæsitæ.

Sed & in Æquationibus, quæ Fluentem & ejus Fluxionem primam sine alterâ Fluente, vel duas ejusdem Fluëntis Fluxiones, primam & secundam, vel secundam & tertiam, vel tertiam & quartam, &c. sine alterutrâ Fluente involvunt, inveniri possunt Fluëntes per Quadraturam Curvarum.

Sit Æquatio $aa\dot{u} = a\dot{u} + u\dot{u}$, existente $u = BE$, $\dot{u} = BD$, $z = AB$, & $z = 1$, & Æquatio illa, complendo Dimensiones Fluxionum, evadit $aa\dot{u} = a\dot{u}z$.

$\div u\dot{u}z$, seu $\frac{aa\dot{u}}{a\dot{u} + u\dot{u}} = z$. Jam fluat u uniformiter, &

& fit ejus fluxio $\dot{u} = 1$, & erit $\frac{\dot{u} \dot{u}}{uu + uu} = \dot{e}$; & quadrando

Curvam cujus Ordinata est $\frac{\dot{u} \dot{u}}{uu + uu}$ & Abscissa u , habebitur Fluens

z . Adhuc fit Aequatio $aa\ddot{u} = a\dot{u} + u\ddot{u}$, existente $u = BF$, $\dot{u} = BE$, $\ddot{u} = BD$, & $z = AB$; & per Relationem inter \dot{u} & \ddot{u} , seu BD , & BE , invenietur Relatio inter AB , & BE ut in Exemplo superiore. Deinde, per hanc Relationem, invenietur Relatio inter AB , & BF , quadrando Curvam AEB .

Aequationes, quæ tres incognitas involvunt, aliquando reduci possunt ad Aequationes, quæ duas tantum involvunt, & in his Casibus Fluents invenientur ex Fluxionibus, ut supra.

Sit Aequatio $a - bx^m = exy^n + dy^{2n}$. Ponatur $y^n \dot{y} = \dot{u}$, & erit $a - bx^m = ex\dot{u} + d\ddot{u}u$: hæc Aequatio, quadrando Curvam cujus Abscissa est x & Ordinata \dot{u} , dat Aream u , & Aequatio altera $y^n \dot{y} = \dot{u}$, regrediendo ad Fluents, dat $\frac{1}{n+1} y^{n+1} = u$. Unde habetur Fluens y .

Quin etiam in Aequationibus, quæ tres incognitas involvunt, & ad Aequationes, quæ duas tantum involvunt, reduci non possunt, Fluents quandoque prodeunt per Quadraturam Curvarum.

Sit Aequatio $\frac{ax^m + bx^n}{x^r} = rex^{r-1}y^s + sex^{r-1}y^s - f\dot{y}y^t$, existente $\dot{x} = 1$. Et pars posterior $rex^{r-1}y^s + sex^{r-1}y^s - f\dot{y}y^t$, regrediendo ad Fluents, fit $ex^r y^s = \frac{f}{t+1} y^{t+1}$, quæ proinde est ut Area Curvæ, cujus Abscissa est x & Ordinata $\frac{ax^m + bx^n}{x^r}$, & inde datur Fluens y .

H h 2

Sit

Sit Aequatio $x \times \sqrt[n]{ax^m + bx^n} = \frac{dy y^{n-1}}{\sqrt{e + fy^n}}$ Et Fluens, cu-

jus Fluxio est $x \times \sqrt[n]{ax^m + bx^n}$ erit ut Area Curvæ, cujus Abscissa est x & Ordinata est $\sqrt[n]{ax^m + bx^n}$. Item, Fluens, cujus Fluxio est $\frac{dy y^{n-1}}{\sqrt{e + fy^n}}$ erit ut Area Curvæ; cujus Abscissa est y & Ordinata est $\frac{dy y^{n-1}}{\sqrt{e + fy^n}}$, id est, (per Casum primum Formæ quartæ Tabulæ I.) ut Area $\frac{2d}{nf} \sqrt{e + fy^n}$. Pone ergo $\frac{2d}{nf} \sqrt{e + fy^n}$ æqualem Aræ

Curvæ, cujus Abscissa est x & Ordinata $\sqrt[n]{ax^m + bx^n}$, & habebitur Fluens y .

Et nota, quòd Fluens omnis, quæ ex Fluxione primâ colligitur, augeri potest vel minui Quantitate quâvis non Fluente. Quæ ex Fluxione secundâ colligitur, augeri potest vel minui Quantitate quâvis, cujus Fluxio secunda nulla est. Quæ ex Fluxione tertiâ colligitur, augeri potest vel minui Quantitate quâvis, cujus Fluxio tertia nulla est; & sic deinceps in infinitum.

Postquàm verò Fluents ex Fluxionibus collectæ sunt, si de veritate conclusionis dubitatur, Fluxiones Fluentium inventarum vicissim colligendæ sunt, & cum Fluxionibus sub initio propositis comparandæ. Nam, si prodeunt æquales, conclusio rectè se habet: sin minus, corrigendæ sunt Fluents sic, ut earum Fluxiones Fluxionibus sub initio propositis æquantur. Nam, & Fluens pro lubitu assumi potest, & assumptio corrigi, ponendo Fluxionem Fluentis assumptæ æqualem Fluxioni propositæ, & Terminos homologos inter se comparando.

Et his principiis via ad majora sternitur.


OPUS

OPUSCULUM IV.
ISAACI NEWTONI
ENUMERATIO
LINEARUM
TERTII ORDINIS.

Edita LONDINI: 1706.

H. B. 3

ISAACI



I S A A C I
N E W T O N I
E N U M E R A T I O
L I N E A R U M
T E R T I I O R D I N I S.

I.

Linearum Ordines.



IN *Æ* Geometricæ secundum numerum Dimensionum *Æ*quationis, quæ Relatio inter Ordinatas & Abscissas definitur, vel (quod perinde est) secundum numerum Punctorum, in quibus à Lineâ recta secari possunt, optimè distinguntur in ordines. Quæ ratione Linea primi Ordinis erit Recta sola; ex secundi sive quadratici Ordinis erunt Sectiones conicæ & Circulus; & ex tertii sive cubici Ordinis Parabola cubica, Parabola *Neiliana*.

liana, Cissois Veterum, & reliquæ, quas hic enumerare suscepimus. Curva autem primi Generis, (siquidem Recta inter Curvas non est numeranda,) eadem est cum Lineâ secundi Ordinis; & Curva secundi Generis eadem cum Lineâ Ordinis tertii. Et Linea Ordinis infinitesimi ea est, quam Recta in Punctis infinitis secare potest, qualis est Spiralis, Cyclois, Quadratrix, & Linea omnis, quæ per Radii vel Rotæ revolutiones infinitas generatur.

I L

Proprietates Sectionum conicarum competunt Curvis superiorum Generum.

Sectionum conicarum proprietates præcipuæ à Geometris passim traduntur. Et consimiles sunt proprietates Curvarum secundi Generis, & reliquarum, ut ex sequenti proprietatum præcipuarum enumeratione constabit.

1. *De Curvarum secundi Generis Ordinatis, Diametris, Verticibus, Centris, Axibus.*

Si Rectæ plures parallelæ, & ad conicam Sectionem utrinque terminatæ ducantur, Recta duas earum bisecans bisecabit alias omnes, ideòque dicitur *Diameter* Figuræ; & Rectæ bisectæ dicuntur *Ordinatim applicata* ad Diametrum; & concursus omnium Diametrorum est *Centrum* Figuræ; & intersectio Curvæ & Diametri *Vertex* nominatur; & Diameter illa *Axis* est, cui Ordinatim applicatæ insunt ad Angulos rectos. Et ad eundem modum in Curvis secundi Generis, si Rectæ duæ quævis parallelæ ducantur occurrentes Curvæ in tribus Punctis: Recta, quæ ita secat has parallelas, ut summa duarum partium ex uno secantis Latere ad Curvam terminatarum æquetur parti tertiæ ex altero Latere ad Curvam terminatæ, eodem modo secabit omnes alias his parallelas, Curvæque in tribus Punctis occurrentes Rectas, hoc est, ita ut summa partium duarum ex uno ipsius Latere semper æquetur parti tertiæ ex altero Latere. Has itaque tres partes, quæ hinc inde æquantur, *Ordinatim applicatas*;

applicatas; & Rectam secantem, cui Ordinatum applicantur, *Diametrum*; & interfectionem Diametri, & Curvæ, *Verticem*; & concursum duarum Diametrorum *Centrum* nominare licet. Diameter autem ad Ordinatæ rectangula, si modò aliqua sit, etiam *Axis* dici potest; & ubi omnes Diametri in eodem Puncto concurrunt, istud erit *Centrum generale*.

2. De *Asymptotis*, & earum proprietatibus.

Hyperbola primi generis duas *Asymptotos*, ea secundi tres, ea tertii quatuor, & non plures habere potest, & sic in reliquis. Et quemadmodum partes Linæ cujuscvis rectæ inter Hyperbolam conicam & duas ejus *Asymptotos* sunt hinc inde æquales: sic, in Hyperbolis secundi Generis, si ducatur Recta quævis secans tam Curvam, quàm tres ejus *Asymptotos* in tribus Punctis, summa duarum partium istius Rectæ, quæ à duobus quibuscvis *Asymptotis* in eandem plagam ad duo Puncta Curvæ extenduntur, æqualis erit parti tertiæ, quæ à tertiâ *Asymptoto* in plagam contrariam ad tertium Curvæ Punctum extenditur.

3. De *Lateralibus rectis* & *transversis*.

Et, quemadmodum in conicis Sectionibus non Parabolicis Quadratum Ordinatum applicatæ, hoc est, Rectangulum Ordinarum, quæ ad contrarias partes Diametri ducuntur, est ad Rectangulum partium Diametri, quæ ad Vertices Ellipseos, vel Hyperbolæ terminantur, ut data quædam Linea, quæ dicitur *Latus rectum*, ad partem Diametri, quæ inter Vertices jacet & dicitur *Latus transversum*: sic in Curvis non Parabolicis secundi Generis Parallelepipedum sub tribus Ordinatum applicatis est ad Parallelepipedum sub partibus Diametri ad Ordinatæ & tres Vertices Figuræ abscissis, in Ratione quadam datâ: in quâ Ratione si sumantur tres Rectæ ad tres partes Diametri inter Vertices Figuræ fitas, singulæ ad singulas, tunc illæ tres Rectæ dici possunt *Latera recta* Figuræ; & illæ partes Diametri inter Vertices *Latera transversa*. Et, sicut in Parabola conicâ, quæ ad unam & eandem Diametrum unicum tantum

J. Newtoni Opuscula, Tom. I.

II

habet

habet Verticem, Rectangulum sub Ordinatis æquatur Rectangulo sub parte Diametri, quæ ad Ordinatæ, & Verticem abscinditur & Rectâ quadam datâ, quæ *Latius rectum* dicitur: sic in Curvis secundi Generis, quæ non-nisi duos habent Vertices ad eandem Diametrum, Parallelepipedum sub Ordinatis tribus æquatur Parallelepipedo sub duabus partibus Diametri ad Ordinatæ & Vertices illos duos abscissis, & Rectâ quadam datâ, quæ proinde *Latius rectum* dici potest.

4. De Ratione contentorum sub Parallelarum segmentis.

Denique, sicut in conicis Sectionibus, ubi duæ parallelæ, ad Curvam utrinque terminatæ, secantur à duabus parallelis ad Curvam utrinque terminatis, prima à tertiâ, & secunda à quartâ, Rectangulum partium primæ est ad Rectangulum partium tertiæ, ut Rectangulum partium secundæ ad Rectangulum partium quartæ: sic, ubi quatuor tales Rectæ occurrunt Curvæ secundi Generis, singulæ in tribus Punctis, Parallelepipedum partium primæ Rectæ erit ad Parallelepipedum partium tertiæ, ut Parallelepipedum partium secundæ ad Parallelepipedum partium quartæ.

5. De Cruribus Hyperbolicis, & Parabolicis, & eorum plagis.

Curvarum secundi, & superiorum Generum, æquè atque primi, crura omnia in infinitum progredientia, vel *Hyperbolici* sunt generis, vel *Parabolici*. Crus *Hyperbolicum* voco, quod ad Asymptotum aliquam in infinitum appropinquat; *Parabolicum* quod Asymptoto destituitur. Hæc crura ex Tangentibus optimè dignoscuntur. Nam, si Punctum contactus in infinitum abeat, Tangens cruris Hyperbolici cum Asymptoto coincidat, & Tangens cruris Parabolici in infinitum recedat, evanescet, & nullibi reperietur. Invenitur igitur Asymptotos cruris cujuscvis quærendo Tangentem cruris illius ad Punctum infinite distans. Plaga autem cruris infiniti invenitur quærendo positionem Rectæ cujuscvis, quæ Tangenti parallela est ubi Punctum contactus in infinitum abit. Nam hæc Recta in eandem plagam cum crure infinito dirigitur.

III. Re.

Reductio Curvarum omnium Generis secundi ad Æquationum casus quatuor.

Lineæ omnes Ordinis primi, tertii, quinti, septimi, & imparia-
cusque, duo habent, ad minimum, crura in infinitum versùs
plagas oppositas progredientia. Et Lineæ omnes tertii Ordinis duo
habent ejusmodi crura in plagas oppositas progredientia, in quas nulla
alia earum crura infinita (præterquam in Parabolâ *Cartesianâ*) ten-
dunt.

C A S. I

Si crura illa sint Hyperbolici Generis, sit (Fig. 1.) GAS eo-
rum Asymptotos, & huic parallela agatur Recta quævis CBc ad TAB. I
Curvam utrinque, (si fieri potest,) terminata, eadèmq; bisece-
tur in Puncto X, & locus Puncti illius X erit Hyperbola conica,
(puta X φ,) cujus una Asymptotos est AG. Sit ejus altera A-
symptotos AB, & Æquatio, quâ Relatio inter Ordinatum BC, &
Abscissam AB definitur, si AB dicatur x , & BC y , semper induet
hanc formam $xy + ey = ax^3 + bxx + cx + d$. Ubi Termi-
ni, e, a, b, c, d , designant Quantitates datas signis suis +, &
— affectas, quarum quælibet deesse possunt, modò ex earum de-
fectu Figura in Sectionem conicam non vertatur. Potest autem
Hyperbola illa conica cum Asymptotis suis coincidere, id est Punc-
tum X in Rectâ AB locari: & tunc Terminus $+ ey$ deest.

C A S. II

At si (Fig. 2.) Recta illa CBc non potest utrinque ad Curvam
terminari, sed Curvæ in unico tantùm Puncto occurrit: age quam- TAB. II
vis Positione datam Rectam AB Asymptoto AS currentem in A,
ut & aliam quamvis BC Asymptoto illi parallelam, Curvæque oc-
currentem in Puncto C, & Æquatio, quâ Relatio inter Ordina-
tam BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,

$$xy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

CAS. III.

Quòd si crura illa opposita Parabolici sint Generis, Recta (Fig. 3.) CBc ad Curvam utrinque, si fieri potest, terminata in plagam crurum ducatur, & biseetur in B, & locus Puncti B erit Linea recta. Sit ista AB, terminata ad datum quodvis Punctum A, & Æquatio, quâ Relatio inter Ordinatum BC & Abscissam AB definitur, semper induet hanc formam,

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

CAS. IV.

TAB. I At verò si (Fig. 4.) Recta illa CBc in unico tantum Puncto occurrat Curvæ, ideòque ad Curvam utrinque terminari non possit; sit Punctum illud C, & incidat Recta illa ad Punctum B in Rectam quamvis aliam, Positione datam, & ad datum quodvis Punctum A terminatam, AB: & Æquatio, quâ Relatio inter Ordinatum BC & Abscissam AC definitur, semper induet hanc formam,

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Nomina formarum.

Enumerando Curvas horum Casuum, Hyperbolam vocabimus, *Inscriptam*, quæ tota jacet in Asymptoton Angulo ad-instar Hyperbolæ conicæ; *Circumscriptam*, quæ Asymptotos, secatur, & partes Abscissas in sinu suo amplectitur; *Ambigenam*, quæ uno crure infinito inscribitur & altero circumscribitur; *Convergentem*, cujus crura concavitate suâ se invicem respiciunt, & in plagam eandem diriguntur; *Divergentem*, cujus crura convexitate suâ se invicem respiciunt & in plagas contrarias diriguntur; *Cruribus Contrariis pradiam*, cujus crura in partes contrarias convexa sunt, & in plagas contrarias infinita; *Conchoidalem*, quæ Vertice concavo & cruribus divergentibus ad Asymptoton applicatur; *Anguineam*, quæ Flexibus contrariis Asymptoton secatur, & utrinque in crura contraria producit; *Cruciformem*, quæ conjugatam decussat; *Nodasam*, quæ

quæ seipsam decussat in orbem redeundo; *Cuspidatam*, cujus partes duæ in Angulo contactûs concurrunt & ibi terminantur; *Punctatam*, quæ conjugatam habet Ovalem infinitè parvam, id est, Punctum; & *Puram*, quæ, per impossibilitatem duarum Radicum, Ovali, Nodo, Cuspide & Puncto conjugato privatur. Eodem sensu Parabolam quoque *convergentem*, *divergentem*, *cruribus contrariis pradam*, *cruciformem*, *nodatam*, *cuspidatam*, *punctatam* & *puram* nominabimus.

In Casu primo si Terminus ax^3 affirmativus est, Figura erit (Fig. 5.) Hyperbola triplex cum sex cruribus Hyperbolicis, quæ TAB. I. juxta tres Asymptotos, quarum nullæ sunt parallelæ, in infinitum progrediuntur, binæ juxta unamquamque in plagas contrarias. Et hæ Asymptoti, si Terminus bx^2 non deest, se mutuò secabunt in tribus Punctis Triangulum (D d δ) inter se continentes, sin terminus bx^2 deest, convergent omnes ad idem Punctum. In priori Casu cape $AD = \frac{b}{2a}$, & $Ad = A\delta = \frac{b}{2\sqrt{a}}$, ac junge Dd, D δ , & erunt Ad, Dd, D δ tres Asymptoti. In posteriori (Fig. 6.) duc Ordinatam quamvis BC, Ordinatz principali AG parallelam, & in eâ utrinque productâ cape hinc inde BF, & Bf sibi mutuò æquales, & in eâ Ratione ad AB, quam habet \sqrt{a} ad 1, jungéque AF, Af; & erunt AG, AF, Af tres Asymptoti. Hanc Hyperbolam vocamus *Redundantem*, quia numero crurum Hyperbolicorum Sectiones Conicas superat.

In Hyperbolâ omni redundante, si neque Terminus cy desit, neque sit $bb - 4ac$ æquale $+ ac\sqrt{a}$, Curva nullam habebit Diametrum; sin eorum alterutrum accidit, Curva habebit unicam Diametrum, & tres si utrumque. Diameter autem semper transit per intersectionem duarum Asymptotôn, & bifecat Rectas omnes, quæ ad Asymptotos illas utrinque terminantur & parallelæ sunt Asymptoto tertiz. Estque Abscissa AB Diameter Figuræ quoties Terminus cy deest. *Diametrum* verò absolutè dictam hic & in sequentibus in vulgari significato usurpo, nempe pro Abscissâ, quæ passim habet Ordinatas binas æquales ad idem Punctum hinc inde insistentes.

I V.

Enumeratio Curvarum.

1. *De Hyperbolis novem redundantibus, quæ Diametro destituuntur, & tres habent Asymptotos Triangulum capientes.*

Si Hyperbola redundans nullam habet Diametrum, quærantur Equationis hujus $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + \frac{1}{4}ee = 0$ Radices quatuor seu valores ipsius x . Eæ sunt (Fig. 5. & c.) AP , $A\pi$, $A\varpi$, Ap . Erigantur Ordinatæ PT , $\varpi\tau$, $\pi\eta$, pt , & hæ tangent Curvam in Punctis totidem T , τ , η , t , & tangendo dabunt Limites Curvæ, per quos Species ejus innotescet.

TAB. I.
& seq.

Nam, si Radices omnes AP , $A\pi$, Ap , (Fig. 5. 7.) sunt reales, ejusdem signi, & inæquales, Curva constat ex tribus Hyperbolicis, (inscriptâ, circumscriptâ, & ambigenâ) cum Ovali. Hyperbolarum una jacet versus D , altera versus d , tertia versus δ , & Ovalis semper jacet intra Triangulum $Dd\delta$, atque etiam inter medios Limites η & τ , in quibus utique tangitur ab Ordinatis $\pi\eta$ & $\varpi\tau$. Et hæc est *Species prima*.

TAB. I.
& II.

Si è Radicibus duæ maximæ $A\pi$, Ap , (Fig. 8.) vel duæ minimæ AP , $A\varpi$ (Fig. 9.) æquantur inter se, & ejusdem sunt signi cum alteris duobus, Ovalis & Hyperbola circumscripta sibi invicem junguntur, coeuntibus earum Punctis contactûs η , & t , vel T , & τ , & crura Hyperbolæ sese decussando in Ovalem continuantur, Figuram *Nodatam* efficientia. Quæ Species est *secunda*.

TAB. II.

Si è Radicibus tres maximæ Ap , $A\pi$, $A\varpi$, (Fig. 10.,) vel tres minimæ $A\pi$, $A\varpi$, AP (Fig. 11.) æquantur inter se, Nodus in *Cuspidem* acutissimum convertetur. Nam, crura duo Hyperbolæ circumscriptæ ibi in Angulo contactûs concurrent, & non ultra producentur. Et hæc est *Species tertia*.

Si è Radicibus duæ mediæ $A\varpi$ & $A\pi$ (Fig. 12.,) æquantur inter se, Puncta contactûs τ , & η coincidunt, & propterea Ovalis interjecta in Punctum evanuit, & constat Figura ex tribus Hyperbolicis

100

100

bolis, inscriptâ, circumscriptâ, & ambigenâ cum *Puncto* conjugato. Quæ est *Species quarta*.

Si duæ ex Radicibus sunt impossibiles & reliquæ duæ inæquales, & ejusdem signi (nam signa contraria habere nequeunt,) *Pura* habebuntur Hyperbolæ tres sine Ovali, vel Nodo, vel Cuspide, vel Puncto conjugato, & hæ Hyperbolæ, vel ad latera Trianguli ab Asymptotis comprehensi, vel ad Angulos ejus jacebunt; & perinde *Speciem*, vel *quintam* (*Fig. 12. 13.*), vel *sextam* (*Fig. 14. 15.*) TAB. II. constituent.

Si è Radicibus duæ sunt æquales, & alteræ duæ, vel impossibiles sunt (*Fig. 16. 18.*), vel reales (*Fig. 17. 19.*) cum signis, quæ TAB. III. & signis æqualium Radicum diversa sunt, Figura *Cruciformis* habebitur, nempe duæ ex Hyperbolis se invicem decussabunt, idque, TAB. IV. vel ad Verticem Trianguli ab Asymptotis comprehensi (*Fig. 18. 19.*), vel ad ejus Basem (*Fig. 16. 17.*) Quæ duæ *Species* sunt *septima* & *octava*.

Si denique Radices omnes sunt impossibiles (*Fig. 20.*), vel si omnes sunt reales, & inæquales (*Fig. 21.*), & earum duæ sunt affirmativæ, & alteræ duæ negativæ, tunc duæ habebuntur Hyperbolæ ad Angulos oppositos duarum Asymptoton cum Hyperbolâ *Anguinâ* circa Asymptoton tertiam. Quæ *Species* est *nona*.

Et hi sunt omnes Radicum casus possibiles. Nam, si duæ Radices sunt æquales inter se, & aliæ duæ sunt etiam inter se æquales, Figura evadet Sectio conica cum Lineâ rectâ.

2. De Hyperbolis duodecim redundantibus unicam tantum Diametrum habentibus.

Si Hyperbola redundans habet unicam tantum Diametrum, sit ejus Diameter Abscissa AB, & Equationis hujus $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ quære tres Radices seu valores x .

Si Radices illæ sunt omnes reales, & ejusdem signi, Figura constabit ex *Ovali* intra Triangulum Ddδ (*Fig. 22.*) jacente, & tribus Hyperbolis ad Angulos ejus, nempe Circumscriptâ ad Angulum D, & TAB. IV.

D, & Inscriptis duabus ad Angulos d, & d'. Et hæc est *Species decima*.

Si Radices duæ majores sunt æquales, & tertia ejusdem signi, crura Hyperbolæ jacentis versùs D (Fig. 23.) sese decussabunt in formâ *Nodi* propter contactum Ovalis. Quæ *Species* est *undecima*.

Si tres Radices sunt æquales, Hyperbola ista fit *Cuspidata* sine TAB. VI. Ovali (Fig. 24.) Quæ *Species* est *duodecima*.

Si Radices duæ minores sunt æquales, & tertia ejusdem signi; TAB. V. Ovalis in *Punctum* evanuit, (Fig. 25.) Quæ *Species* est *decima tertia*.

In Speciebus quatuor novissimis Hyperbola, quæ jacet versùs D, Asymptotos in sinu suo amplectitur, reliquæ duæ in sinu Asymptotón jacent.

Si duæ ex Radicibus sunt impossibiles, habebuntur tres Hyperbolæ *Pura*, sine Ovali, Decussatione, vel Cuspide. Et hujus Casûs *Species* sunt quatuor: nempe *decima quarta*, si Hyperbola Circumscripta jacet versùs D, (Fig. 25.) & *decima quinta*, si Hyperbola Inscripta jacet versùs D, (Fig. 26.) & *decima sexta*, si Hyperbola Circumscripta jacet sub Basi d d' Trianguli D d d', (Fig. 27.) & *decima septima*, (Fig. 28.), si Hyperbola Inscripta jacet sub eadem Basi.

Si duæ Radices sunt æquales, & tertia signi diversi, Figura erit *Cruciformis*. Nempe, duæ ex tribus Hyperbolis se invicem decussabunt; idque, vel ad Verticem Trianguli ab Asymptotis comprehensi, (Fig. 29.), vel ad ejus Basem, (Fig. 30.) Quæ duæ *Species* sunt *decima octava*, & *decima nona*.

Si duæ Radices sunt inæquales, & ejusdem signi, & tertia est signi diversi, duæ habebuntur Hyperbolæ in oppositis Angulis duarum Asymptotón cum *Conchoidali* intermediâ. *Conchoidalis* autem, vel jacebit ad easdem partes Asymptoti suæ cum Triangulo ab Asymptotis constituto, (Fig. 31.) vel ad partes contrarias; (Fig. 32.)

TAB. VI. Et hi duo Casus constituunt *Speciem vigesimam*, & *vigesimam primam*.

3 De Hyperbolis duabus redundantibus cum tribus Diametris.

Hyperbola redundans, quæ habet tres Diametros, constat ex tribus Hyperbolis in sinibus Asymptotón jacentibus; idque, vel ad Angulos Trianguli ab Asymptotis comprehensi, (Fig. 33.), vel ad TAB. VI. ejus Latera, (Fig. 34.). Casus prior dat Speciem vigesimam secundam, & posterior Speciem vigesimam tertiam.

4. De Hyperbolis novem redundantibus cum Asymptotis tribus ad commune Punctum convergentibus.

Si tres Asymptoti in Puncto communi se mutuo decussant, vertuntur Species quinta, & sexta in vigesimam quartam; (Fig. 6.) TAB. I. septima, & octava in vigesimam quintam, (Fig. 35.) & nona in TAB. VI. vigesimam sextam, (Fig. 36.) ubi Anguinea non transit per concursum Asymptotón; & in vigesimam septimam, ubi transit per concursum illum, (Fig. 37.), quo Casu Termini *b*, ac *d* desunt, & TAB. VII. concursus Asymptotón est Centrum Figuræ ab omnibus ejus partibus oppositis æqualiter distans. Et hæ quatuor Species Diametrum non habent.

Vertuntur etiam Species decima quarta, ac decima sexta in vigesimam octavam; (Fig. 38.) decima quinta, ac decima septima in vigesimam nonam; (Fig. 39.) decima octava, & decima nona in tricesimam; (Fig. 40.) & vigesima cum vigesima primâ in tricesimam primam, (Fig. 41.) Et hæ Species unicam habent Diametrum.

Ac denique Species vigesima secunda, & vigesima tertia vertuntur in Speciem tricesimam secundam, cujus tres sunt Diametri per concursum Asymptotón transeuntes (Fig. 42.).

Quæ omnes conversiones facillimè intelliguntur faciendo, ut Triangulum ab Asymptotis comprehensum diminuatur, donec in Punctum evanescat.

5. De Hyperbolis sex defectivis Diametrum non habentibus.

Si in primo Æquationum Casu Terminus ax^3 negativus est, Figura erit Hyperbola defectiva unicam habens Asymptoton, & duo tantum crura Hyperbolica juxta Asymptoton illam in plagas contrarias infinitè progredientia. Et Asymptotos illa est Ordinata prima, & principalis AG. Si Terminus cy non deest, Figura nullam habebit Diametrum, si deest habebit unicam. In priori Casu Species sic enumerantur.

TAB.VIII. Si Æquationis hujus $ax^4 = bx^3 + cx^2 + dx + \frac{1}{4} ee$ Radices omnes $A\pi$, AP , Ap , $A\pi$, (Fig. 43.) sunt reales, & inæquales, Figura erit Hyperbola Anguinea Asymptoton Flexu contrario amplexa, cum Ovali conjugatâ. Quæ Species est tricesima tertia. Si Radices duæ mediæ AP , & Ap , (Fig. 44.) æquantur inter se, Ovalis, & Anguinea junguntur sese decussantes in forma Nodi. Quæ est Species tricesima quarta.

Si tres Radices sunt æquales, Nodus vertetur in Cuspide acutissimum in vertice Anguineæ; (Fig. 45.) Et hæc est Species tricesima quinta.

Si è tribus Radicibus ejusdem signi, duæ maximæ, Ap & $A\pi$ (Fig. 47.) sibi mutuo æquantur, Ovalis in Punctum evanuit. Quæ Species est tricesima sexta.

Si Radices duæ quævis imaginariæ sunt, sola manebit Anguinea Pura sine Ovali, Decussatione, Cuspide, vel Puncto conjugato. Si Anguinea illa non transit per Punctum A, (Fig. 46.) Species est tricesima septima; sin transit per Punctum illud A (id quod contingit, ubi Termini b , ac d defunt,) Punctum illud A erit Centrum Figuræ Rectas omnes per ipsum ductas, & ad Curvam intrinsece terminatas, bisecans (Fig. 47.) Et hæc est Species tricesima octava.

6. De Hyperbolis septem defectivis Diametrum habentibus.

In altero Casu, ubi Terminus cy deest, & propterea Figura Diame-

44



၁၅











24

Diametrum habet, si *Æquationis* hujus $ax^3 = bx^2 + cx + d$ Radices omnes AT , At , $A\tau$, (*Fig. 48.*) sunt reales, inæquales, & ejusdem signi, Figura erit Hyperbola Conchoidalis cum *Ovali* ad convexitatem. Quæ est *Species tricesima nona.* TAB. VII.

Si duæ Radices sunt inæquales, & ejusdem signi, & tertia est signi contrarii, *Ovalis* jacebit ad concavitatem Conchoidalis; (*Fig. 49.*) Estque *Species quadragesima.*

Si Radices duæ minores AT , At , (*Fig. 50.*) sunt æquales, & tertia $A\tau$, est ejusdem signi; *Ovalis*, & Conchoidalis jungentur sese decussando in modum *Nodi*. Quæ *Species* est *quadragesima prima.*

Si tres Radices sunt æquales, Nodus mutabitur in *Cuspidem*, & Figura erit *Cissois Veterum*, (*Fig. 51.*) Et hæc est *Species quadragesima secunda.*

Si Radices duæ majores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi; Conchoidalis habebit *Punctum* conjugatum ad convexitatem suam, (*Fig. 52.*) Estque *Species quadragesima tertia.*

Si Radices duæ sunt æquales, & tertia est signi contrarii, Conchoidalis habebit *Punctum* conjugatum ad concavitatem suam, (*Fig. 53.*) Estque *Species quadragesima quarta.*

Si Radices duæ sunt impossibiles habebitur Conchoidalis *Pura* sine *Ovali*, *Nodo*, *Cuspide*, vel *Puncto* conjugato (*Fig. 52. & 53.*). Quæ *Species* est *quadragesima quinta.*

7. De Hyperbolis septem Parabolicis Diametrum non habentibus.

Si quando in primo *Æquationum* Casu Terminus ax^3 deest, & Terminus bx^2 non deest, Figura erit Hyperbola Parabolica duo habens crura Hyperbolica ad unam *Asymptoton* SAG & duo Parabolica in plagam unam & eandem convergentia. Si Terminus cy non deest, Figura nullam habebit Diametrum; sin deest, habebit unicam. In Priori Casu Species sunt hæ.

Si tres Radices AP , $A\varpi$, $A\pi$ (*Fig. 54.*) *Æquationis* hujus $bx^3 + cxx + dx + \frac{1}{4}cc = 0$ sunt inæquales & ejusdem signi, TAB. IX.

K k 2

Figura

Figura constabit ex *Ovali*, & aliis duabus Curvis, quæ partim Hyperbolicæ sunt, & partim Parabolicæ. Nempe crura Parabolica continuo ductu junguntur cruribus Hyperbolicis sibi proximis. Et hæc est *Species quadragesima sexta*.

Si Radices duæ minores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi; *Ovalis*, & una Curvarum illarum Hyperbolo-Parabolicarum junguntur & se decussant in formam *Nodi* (Fig. 55.) Quæ *Species* est *quadragesima septima*.

Si tres Radices sunt æquales, Nodus ille in Cuspide vertitur (Fig. 56.) Estque *Species quadragesima octava*.

Si Radices duæ majores sunt æquales, & tertia est ejusdem signi; *Ovalis* in *Punctum* conjugatum evannit (Fig. 57.) Quæ *Species* est *quadragesima nona*.

Si duæ Radices sunt impossibiles, manebunt *Pura* illæ duæ Curvæ Hyperbolo-Parabolicæ sine *Ovali*, Decussatione, Cuspide, vel Puncto conjugato; & *Speciem quinquagesimam* constituent. (Fig. 57. & 58.)

Si Radices duæ sunt æquales, & tertia est signi contrarii; Curvæ illæ Hyperbolo-Parabolicæ junguntur sese decussando in morem crucis (Fig. 59.) Estque *Species quinquagesima prima*.

Si Radices duæ sunt inæquales, & ejusdem signi, & tertia est signi contrarii; Figura evadet Hyperbola Anguinea circa Asymptoton AG, (Fig. 60.) cum Parabola conjugata. Et hæc est *Species quinquagesima secunda*.

8. De Hyperbolis quatuor Parabolicis Diametrum habentibus.

In altero Casu, ubi Terminus *cy* deest, & Figura Diametrum habet, si duæ Radices Æquationis hujus $bx^2 + cx + d = 0$ sunt impossibiles; duæ habentur Figuræ Hyperbolo-Parabolicæ à Diametro AB (Fig. 61.) hinc inde æqualiter distantes. Quæ *Species* est *quinquagesima tertia*.

Si Æquationis illius Radices duæ sunt impossibiles; Figuræ Hyperbolo-Parabolicæ junguntur sese decussantes in morem crucis; & *Speciem quinquagesimam quartam* constituunt. (Fig. 62.)

Si

Si Radices illæ sunt inæquales & ejusdem signi; habetur Hyperbola Conchoidalis cum Parabolâ ex eodem latere Asymptoti. (Fig. 63.) TAB. X. Estque Species quinquagesima quinta.

Si Radices illæ sunt signi contrarii; habetur Conchoidalis cum Parabolâ ad alteras partes Asymptoti (Fig. 64.). Quæ Species est quinquagesima sexta.

9. De Quatuor Hyperbolismis Hyperbolæ.

Si quando, in primo Æquationum casu, Terminus uterque ax^2 , & bxx deest; Figura erit Hyperbolismus Sectionis alicujus conicæ. *Hyperbolismus* Figuræ voco, cujus Ordinata prodit applicando contentum sub Ordinatâ Figuræ illius & Rectâ datâ ad Abscissam communem. Hac ratione Linea recta vertitur in Hyperbolam conicam, & Sectio omnis conica vertitur in aliquam Figurarum, quas hic Hyperbolismos Sectionum conicarum voco. Nam, Æquatio ad Figuras, de quibus agimus, nempe $xyy + ey = cx + d$, dat $y = \frac{e \pm \sqrt{ee + 4dx + 4cxx}}{2x}$; quæ generatur applicando contentum

sub Ordinatâ Sectionis conicæ $\frac{e \pm \sqrt{ee + 4dx + 4cxx}}{2m}$, & Rectâ datâ m , ad Curvarum Abscissam communem x . Unde liquet, quod Figura genita Hyperbolismus erit Hyperbolæ, Ellipseos, vel Parabolæ, perinde ut Terminus cx affirmativus est, vel negativus, vel nullus.

Hyperbolismus Hyperbolæ tres habet Asymptotos, quarum una est Ordinata prima & principalis Ad , alteræ duæ sunt parallelæ Abscissæ AB , ab eadem hinc inde æqualiter distant. In Ordinatâ principali Ad , cape Ad , $A\delta$, hinc inde æquales Quantitati \sqrt{c} ; & per Puncta d , ac δ age dg , δy Asymptotos Abscissæ AB parallelas.

Ubi Terminus ey non deest, Figura nullam habet Diametrum. In hoc Casu, si Æquationis hujus $cxx + dx + \frac{1}{4}ee = 0$ Radices duæ AP , Ap (Fig. 65.) sunt reales & inæquales, (nam æquales esse nequeunt nisi Figura sit conica Sectio, Figura constabit ex tri-

bus Hyperbolis sibi oppositis, quarum una jacet inter Asymptotos parallelas, & alteræ duæ jacent extra. Et hæc est *Species quinquagesima septima*.

TAB. X. Si Radices illæ duæ sunt impossibiles, habentur Hyperbolæ duæ oppositæ extra Asymptotos parallelas & Anguinea Hyperbolica intra eandem. Hæc Figura duarum est specierum. Nam, Centrum non habet, ubi Terminus d non deest: (Fig. 66.) sed si Terminus ille deest, Punctum A est ejus centrum (Fig. 67.) Prior *Species* est *quinquagesima octava*, posterior *quinquagesima nona*.

Quòd si Terminus ey deest, Figura constabit ex tribus Hyperbolis oppositis, quarum una jacet inter Asymptotos parallelas, & alteræ duæ jacent extra, ut in Specie quinquagesimâ quartâ, & præterea Diametrum habet, quæ est Abscissa AB (Fig. 68.) Et hæc est *Species sexagesima*.

10. De tribus Hyperbolismis Ellipseos.

TAB. XI. Hyperbolismus Ellipseos per hanc Æquationem definitur $xyy + ey = cx + d$, & unicam habet Asymptoton, quæ est Ordinata principalis Ad (Fig. 69.) Si Terminus ey non deest, Figura est Hyperbola Anguinea sine Diametro; atque etiam sine Centro, si Terminus d non deest. Quæ *Species* est *sexagesima prima*.

At si Terminus d deest, Figura habet Centrum sine Diametro, & Centrum ejus est Punctum A (Fig. 70.) *Species* verò est *sexagesima secunda*.

Et, si Terminus ey deest & Terminus d non deest, Figura est Conchoidalis ad Asymptoton AG (Fig. 71.,) habetque Diametrum sine Centro, & Diameter ejus est Abscissa AB. Quæ *Species* est *sexagesima tertia*.

11. De duobus Hyperbolismis Parabola.

Hyperbolismus Parabolæ per hanc Æquationem definitur $xyy + ey = d$; & duas habet Asymptotos, Abscissam AB, & Ordinatam pri-

primam & principalem A G. Hyperbolæ verò in hac Figurâ sunt duæ, non in Asymptotôn Angulis oppositis, sed in Angulis qui sunt deinceps jacentes, idque ad utrumque Latus Abscissæ A B, &, vel sine Diametro, si Terminus cy habetur, (Fig. 72.) vel cum Dia- TAB.XI.
metro, si Terminus ille deest, (Fig. 73.) Quæ duæ Species sunt *sexagesima quarta*, & *sexagesima quinta*.

12. De Tridente.

In secundo Æquationum Casu habebatur Æquatio $xy = ax^2 + bxx + cx + d$. Et Figura in hoc Casu habet quatuor crura infinita, quorum duo sunt Hyperbolica circa Asymptoton A G (Fig. 76.) in contrarias partes tendentia, & duo Parabolica convergentia, & cum prioribus speciem Tridentis ferè efformantia. Estque hæc Figura Parabola illa, per quam CARTESIUS Æquationes sex Dimensionum construxit. Hæc est igitur Species *sexagesima sexta*.

13. De Parabolis quinque divergentibus.

In Tertio Casu Æquatio erat $yy = ax^3 + bxx + cx + d$, & TAB.XII.
Parabolam designat, cujus crura divergunt ab invicem, & in contrarias partes infinitè progrediuntur. Abscissa A B est ejus Diameter, & Species ejus sunt quinque sequentes.

Si Æquationis $ax^3 + bxx + cx + d = 0$, Radices omnes A τ , A T, A t sunt reales & inæquales, Figura est Parabola divergens Campaniformis cum Ovali ad verticem (Fig. 74. 75.). Et Species est *sexagesima septima*.

Si Radices duæ sunt æquales, Parabola prodit, vel *Nodata* contingendo Ovalem (Fig. 77.), vel *Punctata*, ob Ovalem infinitè parvam (Fig. 78.). Quæ duæ Species sunt *sexagesima octava*, & *sexagesima nona*.

Si tres Radices sunt æquales, Parabola erit *Cuspidata* in Vertice (Fig. 80.

TAB. XI. (Fig. 80.) Et hæc est Parabola *Neiliana*, quæ vulgo *Semicubica* dicitur. Et est *Species septuagesima*.

Si Radices duæ sunt impossibiles, habetur Parabola *Pura* campaniformis (Fig. 78. 79.) *Speciem septuagesimam primam* constituens.

14. De Parabola Cubicâ.

In quarto Casu Æquatio erat $y = ax^3 + bxx + cx + d$, & hæc Æquatio Parabolam designat, quæ crura habet contraria, & *Cubica* dici solet (Fig. 81.) Et sic *Species* omnino sunt *septuagesima dua*.

V.

Genesis Curvarum per Umbras.

Si in Planum infinitum à Puncto lucido illuminatum Umbræ Figurarum projiciantur, Umbræ Sectionum conicarum semper erunt Sectiones conicæ; eæ Curvarum secundi Generis semper erunt Curvæ secundi Generis; eæ Curvarum tertii Generis semper erunt Curvæ tertii Generis, & sic deinceps in infinitum.

Et, quemadmodum Circulus, Umbram projiciendo, generat Sectiones omnes conicas, sic Parabolæ quinque divergentes Umbris suis generant & exhibent alias omnes secundi Generis Curvas; & sic Curvæ quædam simpliciores aliorum Generum inveniri possunt, quæ alias omnes eorundem Generum Curvas Umbris suis à Puncto lucido in Planum projectis formabunt.

De Curvarum Punctis duplicibus.

Diximus Curvas secundi Generis à Lineâ rectâ in Punctis tribus secari posse. Horum duo nonnunquam coincidunt. Ut, cum Recta per Ovalem infinitè parvam transit; vel per concursum duarum partium Curvæ se mutuò secantium, vel in Cuspitem coeuntium, duci-

ducitur. Et, si quando Rectæ omnes in plagam cruris alicujus infiniti tendentes Curvam in unico tantum Puncto secant, (ut fit in Ordinatis Parabolæ *Cartesiana*, & Parabolæ cubicæ, nec non in Rectis Abscissæ Hyperbolicorum Hyperbolæ, & Parabolæ parallelis) concipiendum est, quòd Rectæ illæ per alia duo Curvæ Puncta ad infinitam distantiam sita (ut ita dicam) transeunt. Hujusmodi intersectiones duas coincidentes, sive ad finitam sint distantiam sive ad infinitam, vocabimus *Punctum Duplex*. Curvæ autem, quæ habent Punctum Duplex describi possunt per sequentia Theoremata

V I.

De Curvarum Descriptione Organica.

THEOR. I.

Si (*Fig. 82.*) Anguli duo magnitudine dati PAD, PBD, circa TAB. XII
Polos positione datos A, B, rotentur, & eorum crura AP, BP, concursu suo P percurrant Lineam rectam; crura duo reliqua AD, BD concursu suo D describent Sectionem conicam per Polos A, B, transeuntem: præterquàm ubi Linea illa recta transit per Polorum alterutrum A vel B, vel Anguli BAD, ABD simul evanescunt, quibus in casibus Punctum D describet Lineam rectam.

THEOR. II.

Si (*Fig. 83.*) crura AP, BP concursu suo P percurrant Sectionem conicam per Polum alterutrum A transeuntem, crura duo reliqua AD, BD concursu suo D describent Curvam secundi Generis per Polum alterum B transeuntem, & Punctum duplex habentem in Polo primo A, per quem Sectio conica transit: præterquàm ubi Anguli BAD, ABD simul evanescunt, quo casu Punctum D describet aliam Sectionem conicam per Polum A transeuntem.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I

L I

THEOR.

THEOR. III.

At, si Sectio Conica, quam Punctum P percurrit transeat per punctum Polorum A, B, (Fig. 84.) Punctum D describet Curvam secundi, vel tertii generis Punctum duplex habentem. Et Punctum illud duplex in concursu crurum describentium, AD, BD invenietur, ubi Anguli BAP, ABP simul evanescunt. Curva autem descripta secundi erit Generis, si Anguli BAD, ABD simul evanescunt, alia erit tertii Generis, & alia duo habebit Puncta duplicia in Polis A & B.

Sectionum Conicarum descriptio per data quinque Puncta.

Jam Sectio conica determinatur ex datis ejus Punctis quinque, & per eadem sic describi potest. Dentur (Fig. 85.) ejus Puncta quinque A, B, C, D, E. Jungantur eorum tria quævis A, B, C, & Trianguli ABC rotentur Anguli duo quivis CAB, CBA circa Vertices suos A, & B; &, ubi crurum AC, BC intersectio C successivè applicatur ad Puncta duo reliqua D, E, incidat intersectio crurum reliquorum AB & BA in Puncta P & Q. Agatur & infinitè producat Recta PQ, & Anguli mobiles ita rotentur, ut intersectio crurum AB, BA percurrat Rectam PQ, & crurum reliquorum intersectio C describet propositam Sectionem conicam per Theorema primum.

Curvarum secundi Generis Punctum duplex habentium Descriptio per data septem Puncta.

Curvæ omnes secundi Generis Punctum Duplex habentes determinantur ex datis earum Punctis septem, quorum unum est Punctum illud duplex, & per eadem Puncta sic describi possunt. Dentur (Fig. 86.) Curvæ describendæ Puncta quælibet septem A, B, C, D, E, F, G, quorum A est Punctum Duplex. Jungantur Punctum A, & alia duo quævis è Punctis, puta B, & C; & Trianguli



14

guli ABC rotetur tum Angulus CAB circa Verticem suum A, tum Angulorum reliquorum alteruter ABC circa Verticem suum B. Et, ubi crurum AC, BC concursus C successivè applicatur ad Puncta quatuor reliqua D, E, F, G, incidat concursus crurum reliquorum AB, & BA in Puncta quatuor P, Q, R, S. Per Puncta illa quatuor & quintum A describatur Sectio conica; & Anguli præfati CAB, CBA ita rotentur, ut crurum AB, BA concursus percurrat Sectionem illam conicam, & concursus reliquorum crurum AC, BC describet Curvam propositam per Theorema secundum.

Si, vice Puncti C datur positione Recta BC, quæ Curvam describendam tangit in B. Lineæ AD, AP coincident, & vice Anguli DAP habebitur Linea recta circa Polum A rotanda.

Si Punctum duplex A infinitè distat debeat Recta ad plagam Puncti illius perpetuò dirigi, & motu parallelo ferri interea dum Angulus ABC circa Polum B rotatur.

Describi etiam possunt hæ Curvæ paulò aliter per Theorema tertium, sed Descriptionem simpliciorum posuisse sufficit.

Eadem Methodo Curvas tertii, quarti, & superiorum Generum describere licet, non omnes quidem, sed quotquot ratione aliquâ commodâ per motum localem describi possunt. Nam, Curvam aliquam secundi, vel superioris, generis Punctum duplex non habentem commodè describere Problema est inter difficiliora numerandum.

V I I.

Constructio Aëquationum per Descriptionem Curvarum.

Curvarum usus in Geometria est, ut per earum intersectiones

Ll 2

Pro-

Problemata solvantur. Proponatur Æquatio construenda Dimensionum novem.

$$x^9 + bx^7 + cx^6 + dx^5 + ex^4 + fx^3 + gxx + hx + k = 0. \\ + m$$

Ubi b, c, d , &c. significant Quantitates quasvis datas signis $+$ & $-$ affectas. Assumatur Æquatio ad Parabolam cubicam $x^3 = y$, & Æquatio prior, scribendo y pro x^3 , evadet

$$x^3 + bxy + cy + dxy + exy + my + fx^3 + gxx + hx + k = 0.$$

Æquatio ad Curvam aliam secundi Generis. Ubi m , vel f deesse potest, vel pro lubitu assumi. Et per harum Curvarum descriptiones, & intersectiones dabuntur Radices Æquationis construendæ. Parabolam cubicam semel describere sufficit.

Si Æquatio construenda per defectum duorum Terminorum ultimorum bx , & k reducatur ad septem Dimensiones, Curva altera, delendo m , habebit Punctum Duplex in principio Abscissæ, & inde facile describi potest, ut supra.

Si Æquatio construenda per defectum Terminorum trium ultimorum $gxx + bx + k$ reducatur ad sex Dimensiones, Curva altera, delendo f , evadet Sectio conica.

Et, si per defectum sex ultimorum Terminorum, Æquatio construenda reducatur ad tres Dimensiones, incidetur in constructionem *Wallisianam* per Parabolam cubicam & Lineam rectam.

Construi etiam possunt Æquationes per Hyperbolismum Parabolæ cum Diametro. Ut, si construenda sit hæc Æquatio Dimensionum novem. Terminò penultimo carens,

+

$$a + cxx + dx^3 + ex^4 + fx^5 + gx^6 + hx^7 + kx^8 + lx^9 = 0;$$

Assumatur Aequatio ad Hyperbolismum illum $xy = 1$, & scribendo y pro $\frac{1}{xx}$, Aequatio construenda vertetur in hanc

$$ay^3 + cyy + dxyy + ey + fxy + m + g + hx + kxx + lx^2 = 0,$$

quæ Curvam secundi Generis designat, cujus descriptione Problema solvetur. Et Quantitatum m , ac g alterutra hic deesse potest, vel pro libitu assumi.

Per Parabolam cubicam & Curvas tertii Generis construuntur etiam Aequationes omnes Dimensionum non plusquam duodecim, & per eandem Parabolam & Curvas quarti Generis construuntur omnes Dimensionum non plusquam quindecim; Et sic deinceps in infinitum. Et Curvæ illæ tertii, quarti, & superiorum Generum describi semper possunt inveniendò eorum Puncta per Geometriam planam. Ut si construenda sit Aequatio

$$x^{12} + ax^{10} + bx^8 + cx^6 + dx^4 + ex^2 + fx^0$$

$$+ gx^4 + hx^3 + ixx + kx + l = 0,$$

& descripta habeatur Parabola cubica; sit Aequatio ad Parabolam illam cubicam $x^3 = y$, & scribendo y pro x^3 , Aequatio construenda vertetur in hanc

$$y^4 + axy^3 + cxyy + fxy + ixx = 0,$$

$$+ b \quad + dx^2 + gx + kx$$

$$+ e \quad + h \quad + l$$

LI 3

quæ

quæ est *Æquatio* ad *Curvâ* tertii Generis, cujus descriptione *Problema* solvetur. Describi autem potest hæc *Curva* inveniendò ejus *Puncta* per *Geometriam planam*, propterea quod indeterminata *Quantitas* x non nisi ad duas *Dimensiones* ascendit.



O P U S

OPUSCULUM V.
I S A A C I
N E W T O N I
M E T H O D U S
D I F F E R E N T I A L I S

Edita LONDINI 1711.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1967



I S A A C I
N E W T O N I
M E T H O D U S
D I F F E R E N T I A L I S.

P R O P. I.



I Figura curvilinea Abscissa componatur ex Quantitate quavis datâ A, & Quantitate indeterminatâ x , & Ordinata constet ex datis quoscunque Quantitatibus b, c, d, e , &c. in totidem Terminos hujus Progressionis geometrica x, x^2, x^3, x^4 , &c. respectivè ductis, & ad Abscissa Puncta totidem data erigantur Ordinatum applicata: dico quod Ordinarum Differentia prima dividendi possint per earum Intervalla, & Differentiarum sic divisarum Differentia dividi possint per Ordinarum binarum Intervalla, &

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

M m harum

harum Differentiarum sic divisarum Differentia dividi possunt per Ordinarum ternarum Intervalla, & sic deinceps in infinitum.

Etenim, si pro Abscissæ parte indeterminatâ x ponantur Quantitates quævis datæ p, q, r, s, t , &c. successivè, & ad Abscissarum sic datarum Terminos erigantur Ordinatæ $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$, &c. Hæ Abscissæ, & Ordinatæ, & Ordinarum Differentiæ divisæ per Abscissarum Differentias, (quæ utique sunt Ordinarum Intervalla,) & Quotorum Differentiæ divisæ per Ordinarum alternarum Differentias, & sic deinceps, exhibentur per Tabulam sequentem.

Abcissæ	Ordinatæ
$A+p$	$A+bp+cp^2+dp^3+cp^4=a$
$A+q$	$A+bq+cq^2+dq^3+eq^4=\beta$
$A+r$	$A+br+cr^2+dr^3+er^4=\gamma$
$A+s$	$A+bs+cs^2+ds^3+es^4=\delta$
$A+t$	$A+bt+ct^2+dt^3+et^4=\epsilon$
Divisor. Diff. Ord.	Quoti per Divisionem prodeuntes
$p-q) \alpha-\beta$	$b+c \times p+q+d \times pp+pq+qq+c \times p^3+p^2q+pq^2+q^3=\zeta$
$q-r) \beta-\gamma$	$b+c \times q+r+d \times qq+qr+rr+c \times q^3+q^2r+qr^2+r^3=\eta$
$r-s) \gamma-\delta$	$b+c \times r+s+d \times rr+rs+ss+c \times r^3+r^2s+rs^2+s^3=\theta$
$s-t) \delta-\epsilon$	$b+c \times s+t+d \times ss+st+tt+c \times s^3+s^2t+st^2+t^3=x$
$p-r) \zeta-\eta$	$c+d \times p+q+r+c \times pp+pq+qq+pr+qr+rr=\lambda$
$q-s) \eta-\theta$	$c+d \times q+r+s+c \times qq+qr+rr+qs+rs+ss=\mu$
$r-t) \theta-x$	$c+d \times r+s+t+c \times rr+rs+ss+rt+st+tt=r$
$p-s) \lambda-\mu$	$d+c \times p+q+r+s=\xi$
$q-t) \mu-v$	$d+c \times q+r+s+t=\pi$
$p-t) \xi-\pi$	$c=\sigma$

P R O P. I I.

Isdem positis, & quod numerus Terminorum b, c, d, e , &c. sit finitus, dico quod Quotorum ultimus equalis erit ultimo Terminorum b, c, d, e , &c., & quod per Quotos reliquos dabuntur Termini reliqui b, c, d, e , &c. & his datis dabitur Linea cur-

va.

ua generis Parabolici, quæ per Ordinatarum omnium Terminos transibit.

Etenim in Tabulâ superiore Quotus ultimus σ æqualis erat Termino ultimo e . Et hic Terminus ductus in Summam datam $p+q+r+s$, & ablatas de Quoto ξ relinquit Terminum penultimum d . Et Quantitates jam datæ $d \times p+q+r+s + e \times pp+pq+qq+pr+qr+rr$, si auferantur de Quoto λ , relinquunt Terminorum antepenultimum c . Et Quantitates jam datæ $c \times p+q+r+s + d \times pp+pq+qq+pr+qr+rr + e \times p^3+ppq+ppq+q^3$, si auferantur de Quoto ζ , relinquunt Terminum b . Et simili computo si plures essent Termini, colligerentur omnes per Quotorum Ordines totidem. Deinde Quantitates datæ $bp+cpp+dp^3+ep^4$, si subducantur de Ordinata primâ a , relinquunt Abscissæ Terminum primum A . Et Quantitas $A+bx+cx^2+dx^3+ex^4+\&c.$ est Ordinata Curvæ generis Parabolici, quæ per Ordinatarum omnium datarum Terminos transibit, existente Abscissâ $A+x$.

Ex his Propositionibus, quæ sequuntur facile colligi possunt.

P R O P. III.

Si (Fig. 1.) Recta aliqua AA_9 in æquales quotcunque partes $AA_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5, \&c.$ dividatur, & ad Puncta Divisionum erigantur parallele $AB, A_2B_2, A_3B_3, \&c.$ Invenire Curvam geometricam generis Parabolici, quæ per omnium erectarum Terminos $B, B_2, B_3, \&c.$ transibit.

Erectarum $AB, A_2B_2, A_3B_3, \&c.$ quære Differentias primas, $b, b_2, b_3, \&c.$; secundas $c, c_2, c_3, \&c.$; tertias $d, d_2, d_3, \&c.$; & sic deinceps usquedum veneris ad ultimam Differentiam, quæ hic sit i .

Tunc, incipiendo ab ultimâ Differentiâ, excerpe medias Differentias in alternis Columnis, vel Ordinibus Differentiarum, & arithmetica Media inter duas medias reliquarum, Ordine pergendo usque ad Seriem primorum Terminorum $AB, A_2B_2, A_3B_3, \&c.$ sint hæc $k, l, m, n, o, p, q, r, s, \&c.$ quorum ultimus si,

M m a

gni.

gnificet ultimam Differentiam; penultimus Medium arithmeticum inter duas penultimas differentias; antepenultimus mediam trium antepenultimarum Differentiarum, & sic deinceps, usque ad primum, quod erit vel medius Terminorum A, A_2, A_3 , &c. vel arithmeticus medius inter duos medios. Prius accidit, ubi numerum Terminorum A, A_2, A_3 , &c. est impar; posterius ubi par.

C A S. I.

In Casu priori, sit A_5B_5 iste medius Terminus, hoc est, $A_5B_5 = k$; $\frac{b_4 + b_5}{2} = l$; $c_4 = m$; $\frac{d_3 + d_4}{2} = n$; $e_3 = o$, $\frac{f_2 + f_3}{2} = p$; $g_2 = q$; $\frac{h + h_2}{2} = r$; $i = s$: Et, erecta Ordinatio applicata PQ, dic $A_5P = x$; & duc Terminos hujus Progressionis $1 \times \frac{x}{1} \times \frac{x}{2} \times \frac{xx - 1}{3x} \times \frac{x}{4} \times \frac{xx - 4}{5x} \times \frac{x}{6} \times \frac{xx - 9}{7x} \times \frac{x}{8} \times \frac{xx - 16}{9x} \times \frac{x}{10} \times \frac{xx - 25}{11x} \times \frac{x}{12} \times \frac{xx - 36}{13x}$ &c. in se continuo; & orientur Termini $1, x, \frac{xx}{2}, \frac{x^3 - x}{6}, \frac{x^4 - xx}{24}, \frac{x^5 - 5x^3 + 4x}{120}, \frac{x^6 - 5x^4 + 4xx}{720}, \frac{x^7 - 14x^5 + 49x^3 - 36x}{5040}$, &c., per quos si Termini Seriei k, l, m, n, o, p , &c. respectivè multiplicentur, Aggregatum Factorum $k + xl + \frac{xx}{2}m + \frac{x^3 - x}{6}n + \frac{x^4 - xx}{24}o + \frac{x^5 - 5x^3 + 4x}{120}p + \text{&c.}$ erit longitudo Ordinatim applicatæ PQ.

C A S. II.

In Casu posteriori, sint A_4B_4, A_5B_5 duo medii Termini, hoc est, sit $\frac{A_4B_4 + A_5B_5}{2} = k$; $b_4 = l$; $\frac{c_3 + c_4}{2} = m$; $d_3 = n$; $e_2 + e_3 = o$; $f_2 = p$; $\frac{g + g_2}{2} = q$; & $h = r$. Et erecta Ordinatio applicata PQ, biseca A_4A_5 in O, & dicto $OP = x$, duc:

duc Terminos hujus Progressionis $1 \times \frac{x}{1} \times \frac{xx - 1}{2x} \times \frac{x}{3} \times \frac{xx - 4}{4x}$
 $\times \frac{x}{5} \times \frac{xx - 9}{6x} \times \frac{x}{7} \times \frac{xx - 16}{8x}$, &c. in se continuò; & orientur
 Termini 1. x. $\frac{4xx - 1}{8}$ $\frac{4x^3 - x}{24}$ $\frac{16x^4 - 40xx + 9}{384}$ &c., per
 quos si Termini Seriei k, l, m, n, o, p, q , &c. respectivè mul-
 tiplicentur; Aggregatum Factorum $k + x + \frac{4xx - 1}{8}$ $m + \frac{4x^3 - x}{24}$ \times
 $n + \frac{16x^4 - 40xx + 9}{384}$ $o +$ &c. erit longitudo Ordinatum applica-
 tæ P Q.

Sed hic notandum est, quòd Intervalla AA_2, A_2A_3, A_3A_4 ,
 &c. hic supponantur esse Unitates, & quòd Differentiæ colligi de-
 bent auferendo inferiores Quantitates de superioribus, A_2B_2 de AB;
 A_3B_3 de A_2B_2 ; b_2 de b , &c., & faciendo, ut sint $AB - A_2B_2$
 $= b$; $A_2B_2 - A_3B_3 = b_2$; $b - b_2 = c$; &c., adeoque,
 quando Differentiæ illæ hoc modo prodeunt negativæ, signa ea-
 rum mutanda sunt.

P R O P. IV.

Si (Fig. 2.) Recta aliqua in partes quotcunque inæquales AA_2 ,
 A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5 , &c. dividatur, & ad Puncta Divisionum
 erigantur parallela AB, A_2B_2, A_3B_3 , &c. Invenire Curvam geo-
 metricam generis Parabolici, quæ per omnium erectarum Terminos
 B, B_2, B_3 , &c. transibit.

Sunto Puncta data B, $B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, B_7$, &c. & ad
 Abscissam quamvis AA_7 demitte Ordinatæ perpendiculariter BA,
 B_2A_2 , &c.,

$$\text{Fit fac. } \frac{AB - A_2B_2}{AA_2} = b; \frac{A_2B_2 - A_3B_3}{A_2A_3} = b_2; \frac{A_3B_3 - A_4B_4}{A_3A_4} = b_3;$$

M m. 3.

$$= b_3; \frac{A_4B_4 - A_5B_5}{A_4A_5} = b_4; \frac{A_5B_5 - A_6B_6}{A_5A_6} = b_5; \frac{A_6B_6 - A_7B_7}{A_6A_7} \\ = b_6; \frac{A_7B_7 - A_8B_8}{A_7A_8} = b_7.$$

$$\text{Deinde, } \frac{b - b_2}{A A_3} = c; \frac{b_2 - b_3}{A_2 A_4} = c_2; \frac{b_3 - b_4}{A_3 A_5} = c_3; \&c.$$

$$\text{Tunc, } \frac{c - c_2}{A A_4} = d; \frac{c_2 - c_3}{A_2 A_5} = d_2; \frac{c_3 - c_4}{A_3 A_6} = d_3; \&c.$$

$$\text{Et, } \frac{d - d_2}{A A_5} = e; \frac{d_2 - d_3}{A_2 A_6} = e_2; \frac{d_3 - d_4}{A_3 A_7} = e_3; \&c.$$

Sic pergendum est ad ultimam Differentiam.

Differentiis sic collectis, & divisis per Intervalla Ordinatum applicatarum; in alternis earum Columnis, five Seriebus, vel Ordinibus, excerpe medias, incipiendo ab ultima, & in reliquis Columnis excerpe Media arithmetica inter duas medias, pergendo usque ad Seriem primorum Terminorum, AB, A₂B₂, &c. Sinto hæc *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, *r*, &c., quorum ultimus Terminus significet ultimam Differentiam; penultimus Medium arithmeticum inter duas penultimas; antepenultimus mediam trium antepenultimarum, &c. Et primus *k* erit media Ordinatum applicata, si numerus datorum Punctorum est impar; vel medium arithmeticum inter duas medias, si numerus eorum est par.

C A S. I

In Casu priori, fit A₄B₄ ista media Ordinatum applicata, hoc est fit A₄B₄ = *k*; $\frac{b_3 + b_4}{2} = l$; $c_3 = m$; $\frac{d_2 + d_3}{2} = n$; $e_2 = o$; $\frac{f + f_2}{2} = p$; $g = q$. Et erecta Ordinatum applicata PQ, & in Basi AA₅ sumpto quovis Puncto O, dic OP = *x*, & duc in se gradatim Terminos hujus Progreffionis

$$1 \times x - OA_4 \times x - \frac{OA_3 + OA_5}{2} \times \frac{x - OA_3 \times x - OA_5}{x - \frac{1}{2} OA_3 + OA_5} \times \\ x - \frac{OA_2 + OA_6}{2} \times \&c. \& \text{ ortam Progreffionem asserva; vel,} \\ \text{quod}$$

quod perinde est, duc Terminos hujus Progreſſionis

$1 \times x - OA_4 \times x - OA_3 \times x - OA_5 \times x - OA_2 \times x - OA_6 \times$
 $x - OA \times x - OA_7 \times \&c.$ in ſe gradatim, & Terminos exinde
 ortos duc reſpective in Terminos hujus Progreſſionis.

$1 \times x - \frac{+OA_3 + OA_5}{2} \cdot x - \frac{+OA_2 + OA_6}{2} \cdot x - \frac{+OA + OA_7}{2},$

&c., & orientur Termini intermedii, tota Progreſſione exiſtente

$1 \times x - OA_4 \cdot xx - \frac{+OA_3 + 2OA_4 + OA_5}{2} x + \frac{+OA_3 + OA_5}{2}$

$\times OA_4$, &c.

Vel dic $OA = a$; $OA_2 = \beta$; $OA_3 = \gamma$; $OA_4 = \delta$;
 $OA_5 = \epsilon$; $OA_6 = \zeta$; $OA_7 = \eta$; $\frac{OA_3 + OA_5}{2} = \theta$; $\frac{OA_2 + OA_6}{2}$
 $= \chi$; $\frac{OA + OA_7}{2} = \lambda$. Et ex Progreſſione:

$1 \times x - \delta \times x - \gamma \times x - \epsilon \times x - \beta \times x - \zeta \times x - a \times x - \eta$ &c.
 collige Terminos, quibus multiplicatis per $1 \cdot x - \theta$, $x - \chi$,
 $x - \lambda$, &c. collige alios Terminos intermedios, tota Serie prodeunte

$1 \cdot x - \delta$, $xx - \delta + \theta x + \delta \theta$, $x^3 - \delta + 2\theta xx + \gamma + 2\delta \theta x - \gamma \delta$, &c.,
 per cujus Terminos multiplica Series k , l , m , n , o , &c. Et Aggrega-
 tum Productorum $k + x - \delta \times l + xx - \delta + \theta x + \delta \theta \times m + \&c.$
 erit longitudo Ordinatum applicatae P.Q.

C. A. S. II.

In Caſu poſteriori; ſint A_4B_4 , A_5B_5 duæ mediæ Ordinatum
 applicatae, hoc eſt, $\frac{A_4B_4 + A_5B_5}{2} = k$; $b_4 = l$; $\frac{c_3 + c_4}{2} = m$;
 $a_3 = n$; $\frac{e_2 + e_3}{2} = o$; $f_2 = p$, &c. Et alternorum k , m ,
 a , q , &c. Coefficientes orientur ex Multiplicatione Terminorum

hujus Progreſſionis in ſe $1 \times x - OA_4 \times x - OA_5 \times$
 $x - OA_3 \times x - OA_6 \times x - OA_2 \times x - OA_7 \times$

$x - OA \times x - OA_8$, &c. Et reliquorum Coefficientes ex Multiplicatione horum per Terminos hujus Progressionis

$$x - \frac{+OA_4 + OA_5}{2}, x - \frac{+OA_3 + OA_6}{2}, x - \frac{+OA_2 + OA_7}{2},$$

$$x - \frac{+OA + OA_8}{2}, \text{ \&c. Hoc est, erit } k + x - \frac{+OA_4 + OA_5}{2} \times$$

$l + x x - OA_4 + OA_5 x + OA_4 \times OA_5 \times m$, &c. Ordinationem applicata PQ, vel PQ

$$= k + x \times l + x \times + m \times m + x \times + x \times + x \times n, \text{ \&c.}$$

$$- \frac{1}{2} OA_4 - OA_4 - OA_5 - OA_4 - OA_5 - \frac{1}{2} OA_3$$

$$- \frac{1}{2} OA_5 \quad \quad \quad - \frac{1}{2} OA_6$$

$$\text{Sive dic } x - \frac{+OA_4 + OA_5}{2} = \pi, \quad x - OA_4 \times x - OA_5 = \rho,$$

$$\rho \times x - \frac{+OA_3 + OA_6}{2} = \tau, \quad \tau \times x - OA_3 \times x - OA_6 = \nu,$$

$$\tau \times x - \frac{+OA_2 + OA_7}{2} = \upsilon, \quad \upsilon \times x - OA_2 \times x - OA_7 = \phi,$$

$$\phi \times x - \frac{+OA + OA_8}{2} = \chi, \quad \chi \times x - OA \times x - OA_8 = \psi.$$

$$\text{Et erit } k + \pi l + \rho m + \tau n + \upsilon p + \phi q + \chi r + \psi s = PQ.$$

P R O P. V.

Datis aliquot Terminis Series cujusunque ad data Intervalla dispositis, invenire Terminum quemvis intermedium quamproximè.

Ad Rectam positione datam erigantur Termini dati in dato Angulo, interpositis datis Intervallis, & per eorum Puncta extrema, per Propositiones præcedentes, ducatur Linea curva generis Parabolici. Hæc enim continget Terminos omnes intermedios per Seriem totam.

PROP.

P R O P. V I.

Figuram quancunque curvilineam quadrare quamproximè, cujus Ordinata aliquot inveniri possunt.

Per Terminos Ordinatarum ducatur Linea curva generis Parabolici ope Propositionum præcedentium. Hæc enim Figuram terminabit, quæ semper quadrari potest, & cujus Area æquabitur Areæ Figuræ propositæ quamproximè,

S C H O L I U M.

Utiles sunt hæ Propositiones ad Tabulas construendas per Interpolationem Serierum, ut & ad solutiones Problematum, quæ à Quadraturis Curvarum dependent, præsertim si Ordinatarum Intervals, & parva sint, & æqualia inter se, & Regulæ computentur, & in usum referrentur pro dato quocunque numero Ordinatarum. Ut, si quatuor sint Ordinatæ ad æqualia Intervals sitæ, sit A summa primæ, & quartæ; B summa secundæ, & tertiæ; & R Intervals inter primam, & quartam; & Ordinata nova in medio omnium erit $\frac{9B - A}{16}$, & Area tota inter primam & quartam erit $\frac{A + 3B}{8} R$.

Et nota, quòd ubi Ordinatæ stant ad æquales ab invicem distancias, sumendo Summas Ordinatarum, quæ ab Ordinatâ mediâ hinc inde æqualiter distant, & duplum Ordinatæ mediæ, componitur Curva nova, cujus Area per pauciores Ordinatas determinatur, & æqualis est Areæ Curvæ prioris, quam invenire oportuit. Quinetiam, si pro Ordinatis novis sumantur Summa Ordinatæ primæ, & secundæ; & summa tertiæ, & quartæ; & summa quintæ, & sextæ; & sic deinceps; vel si sumantur Summa trium primarum Ordinatarum, & Summa trium proximarum, & Summa trium, quæ sunt deinceps; vel si sumantur Summæ quaternarum Ordinatarum, vel Summæ quinarum: Area Curvæ novæ æqualis erit Areæ Curvæ

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I. N n primò

primò propositæ. Et sic, habitis Curvæ quadrandæ Ordinatis quocunque, Quadratura ejus ad Quadraturam Curvæ alterius per pauciores Ordinatâs reducetur.

Per data verò Puncta quocunque non solùm curvæ Linæ generis Parabolici, sed etiam Curvæ aliæ innumeræ diversorum generum duci possunt.

Sunto (*Fig. 3.*) CDE, FGH Curvæ duæ Abscissam habentes communem AB, & Ordinatâs in eadem Rectâ jacentes BD, BG; & Relatio inter has Ordinatâs definiatur per Æquationem quamcunque. Dentur Puncta quocunque, per quæ Curva CDE transire debet, & per Æquationem illam dabuntur Puncta totidem nova, per quæ Curva FGH transibit. Per Propositiones superiores describatur Curva FGH generis Parabolici, quæ per Puncta illa omnia nova transeat, & per Æquationem eandem dabitur Curva CDE, quæ per Puncta omnia primò data transibit.



O P U S C U L U M

OPUSCULA VI. & VII.
ISAACI NEWTONI
SOLUTIONES
PROBLEMATUM QUORUNDAM,
EDITÆ
IN TRANSAC. PHILOSOPH.
Mens. Jan. &c., Ann. 1697.

Num. 224. pag. 384.

Num. 225. pag. 424.

& Ann. 1716.

Num. 347. 399.

N^o 2



ART. I

ISAACI NEWTONI EPISTOLA

MISSA AD

PRÆNOBILEM VIRUM

D. CAROLUM MONTAGUE

*Armigerum, Scacarum Regii apud Anglos Cancellarii, &
Societatis Regia Præsidentem, ubi solvuntur duo Problemata
Mathematica.*

A

JOHANNI BERNOULLIO

Math. Celeber. proposita.

Accepi, Vir Amplissime, hesterno die duo Problematum à Jo-
HANNI BERNOULLIO Mathematicorum acutissimo exemplaria,,
Groninga edita. in hæc verba

Acutissimis qui toto Orbe florent Mathematicis S. P. D.

JOHANNES BERNOULLI

MATH. P. P.

CUM compertum habeamus, vix quicquam esse, quod magis
excitet generosa ingenia ad moliendum quod conducit augen-
dis Scientiis, quàm difficilium pariter & utilium Quæstionum pro-
positio-

N. n. 3

positionem; quarum enodatione, tanquam singulari, si qua alia via, ad nominis claritatem perveniant, sibi que apud Posteritatem æterna extruant monumenta: Sic me nihil gratius Orbi Mathematico facturum speravi, quàm si, imitando exemplum tantorum Virorum MERSENNI, PASCALII, FERMATII, præsertim recentis illius Anonymi Ænigmatistæ *Florentini*, * aliorumque, qui idem ante me fecerunt, præstantissimis hujus ævi Analystis proponerem aliquod Problema, quo, quasi lapide Lydio, suas Methodos examinare, vires intendere, &, si quid invenirent, nobiscum communicare possent; ut quisque suas exinde promeritas laudes à nobis, publicè id profitentibus, consequeretur.

Factum autem illud est ante semestre in *Actis Lips. m. Jun.* pag. 269, ubi tale Problema proposui, cujus utilitatem cum jucunditate conjunctam videbunt omnes, qui cum successu ei se applicabunt. Sex mensium spatium à primâ publicationis die Geometris concessum est, intra quod, si nulla Solutio prodiret in lucem, me meam exhibiturum promisi. Sed ecce elapsus est terminus, & nihil Solutionis comparuit; nisi quod Celeb. LEIBNITIUS, de profundiore Geometriâ præclarè meritis, me per litteras certiorum fecerit, se jam feliciter dissolvissè nodum pulcherrimi hujus, uti vocabat, & inauditi antea Problematis; insimulque humaniter rogavit, ut præstitutum limitem ad proximum Pascha extendi paterer; quo interea apud Gallos, Italosque, idem illud publicari posset, nullusque adeò superesset locus ulli de angustia termini querelæ. Quam honestam petitionem non solum indulsi, sed ipse hanc prorogationem promulgare decrevi; visurus num qui sint, qui nobilem hanc & arduam Quæstionem aggressuri, post longum temporis intervallum, tandem Enodationis compotes fierent. Illorum interim in gratiam, ad quorum manus *Acta Lipsiensia* non perveniunt, propositionem hic repeto.

P R O.

* *Vincenzus VIVIANI* Ann. 1692. Ænigma Geometricum proposuit, de miro opificio Testudinis quadrabilis Hemisphericæ; Videantur *Acta Eruditorum* hujus anni, mense Junio, pag. 274. vel *Vita VIVIANI* in *Hist. Acad. Reg. Scient. Paris.* Ann. 1703.

P R O B L E M A

M E C H A N I C O - G E O M E T R I C U M

De Lineâ celerrimi descensûs.

Determinare Lineam curvam data duo Puncta, in diversis ab Horizonte distantis & non in eâdem Rectâ verticali posita, connectentem, super quâ mobile, propriâ gravitate decurrens & à superiori Puncto moveri incipiens, citissimè descendat ad Punctum inferius.

SENSUS Problematis hic est: Ex infinitis Lineis, quæ duo illa data Puncta conjungunt, vel ab uno ad alterum duci possunt, eligatur illa, juxta quam, si incurvetur lamina tubi canalifve formam habens, ut ipsi impositus globulus & liberè dimissus, iter suum ab uno Puncto ad alterum emetiatur tempore brevissimo.

Ut verò omnem ambiguitatis ansam præcaveamus; scire B. E. volumus, nos hic admittere GALILEI hypothesein, de cujus veritate, sepositâ resistantiâ, jam nemo est saniorum Geometrarum qui ambigat, *Velocitates, scilicet, acquisitas, Graviarum cadentium esse in subduplicatâ Ratione Altitudinum emensarum*; quamquam aliâ nostra solvendi Methodus universaliter ad quamvis aliam hypothesein sese extendat.

Cum itaque nihil obscuritatis supersit, obnixè rogamus omnes & singulos hujus ævi Geometras, accingant se promptè, tentent, discutiant quicquid in extremo suarum Methodorum recessu absconditum tenent. Rapiat qui potest præmium, quod Solutori paravimus; non quidem auri, non argenti summam, quo abjecta tantùm & mercenaria conducuntur ingenia, à quibus ut nihil laudabile, sic nihil, quod Scientiis fructuosum, expectamus; sed cum Virtus sibi ipsi sit merces pulcherrima, atque Gloria immensum habeat calcar, offerimus præmium, quale convenit ingenui sanguinis Viro, con-

sertum.

festum ex honore, laude, & plausu; quibus magni nostri Apollinis perspicacitatem, publicè & privatim, scriptis & dictis coronabimus, condecorabimus, & celebrabimus.

Quòd si verò festum Paschatis præterierit, nemine deprehenso, qui Quæsitum nostrum solverit; nos quæ ipsi invenimus publico non invidemus: Incomparabilis enim LEIBNITIUS Solutiones tum suam, tum nostram, ipsi jam pridem commissam, protinus, ut spero, in lucem emittet; quas si Geometrae, ex penitiori quodam fonte petitas perspexerint, nulli dubitamus, quin angustos vulgaris Geometriæ limites agnoscant, nostræque proin inventa tanto pluris faciant, quanto pauciores eximiam nostram Quæstionem soluturi extiterint, etiam inter illos ipsos, qui per singulares, quas tantoperè commendant, Methodos, interioris Geometriæ latibula non solum intimè penetrasse, sed etiam ejus pomœria, Theorematis suis aureis, nemini, ut putabant, cognitis, ab aliis tamen jam longè priùs editis, mirum in modum extendisse gloriantur.

PROBLEMA ALTERUM

PURE GEOMETRICUM

Quod priori subnectimus, & Strena loco Eruditis proponimus.

AB EUCLIDIS tempore vel Tyronibus notum est, ductam utcunque à Puncto dato rectam Lineam, à Circuli Peripheriâ ita secari, ut Rectangulum duorum Segmentorum, inter Punctum datum & utramque Peripheriæ partem interceptorum, sit eidem constanti perpetuò æquale. Primus ego ostendi, in eodem *Actorum Jun.* pag. 265, hanc proprietatem infinitis aliis Curvis convenire, illamque adeò Circulo non esse essentialem: Arreptâ hinc occasione, proposui Geometris determinandam Curvam, vel Curvas, in quibus non Rectangulum, sed Solidum sub uno & Quadrato alterius Segmentorum æquetur semper eidem: sed à nemine hætenus solvendi modus prodiit; exhibebimus eum, quandocumque desiderabitur. Quoniam autem non nisi per Curvas transcendentes Quæsito

satisfacimus;

satisfacimus ; en aliud , cujus Solutio per merè algebraicas in nostra est potestate.

Queritur Curva ejus proprietatis , ut duo illa Segmenta , ad quamcunque Potentiam datam elevata & simul sumta , faciant ubique unam eandemque Summam.

Casum simplicissimum , existente scilicet numero Potentiæ 1 , ibidem in *Actis* , pag. 266. jam solutum dedimus ; generalem verò Solutionem , quam etiamnum premimus , Analystis eruendam relinquimus.

Dabam Groningæ , ipsis Cal. Jan. 1697.

Hactenus BERNOULLIUS ; Problematum verò Solutiones sunt hujus modi.

A dato Puncto A (*Fig. 1.*) ducatur Recta infinita APCZ Horizonti parallela & super eadem Rectâ describatur , tum Cyclois quæcunque AQP Rectæ ABC ductæ , & si opus sit , (productæ) occurrens in Puncto Q , tum Cyclois alia ABC , cujus Basis , & Altitudo sit ad prioris Basem & Altitudinem respectivè , ut AB ad A Q. Et hæc Cyclois novissima transibit per Punctum B , & erit curva illa Linea , in quâ Grave à Puncto A ad Punctum B vi Gravitatis suæ citissime perveniet. Q. E. I.

P R O B L E M A II.

Problema alterum , si rectè intellexi , (nam , quæ in *Actis Lips.* ab Auctore citantur ad id spectantia nondum vidi ,) sic proponi potest. Quæritur (*Fig. 2.*) Curva KIL eâ lege , ut si Recta PKL à dato quodam Puncto P , ceu Polo , utcunque ducatur , & eidem Curvæ in Punctis duobus K , & L occurrat , Potestates duorum ejus Segmentorum PK , & PL à dato illo Puncto P ad occursum illos ductorum , si sint æquè altæ , [id est , vel Quadrata , vel Cubi , vel Quadrato-quadrata , &c :] datam Summam $PK^q + PL^q$ vel $PK^{sub.} + PL^{sub.}$, &c : (in omni Rectæ illius positione) conficiant.

S O L U T I O.

Per datum quodvis Punctum A ducatur Recta quævis infinita positione
H. Newtoni *Opuscula* , Tom. I. O o

sitione data ADB Rectæ mobili PKL occurrens in D, & nominentur AD, x ; & PK, vel PL, y ; sintque Q, & R Quantitates ex Quantitatibus quibuscunque datis, & Quantitate x quomodocunque constantes, & Relatio inter x , & y , definiatur per hanc Æquationem $yy + Qy + R = 0$. Et si R sit Quantitas data, Rectangulum sub Segmentis PK & PL dabitur. Si Q sit Quantitas data, Summa Segmentorum illorum (sub signis propriis conjunctorum) dabitur. Si $QQ - 2R$ datur, Summa Quadratorum, (PK q + PL q ,) dabitur. Si $Q^3 - 3QR$ data sit Quantitas, Summa Cuborum (PK $cub.$ + PL $cub.$) dabitur. Si $Q^4 - 4QQR + 2RR$ data sit Quantitas, Summa Quadrato-quadratorum (PK qq + PL qq ,) dabitur. Et sic deinceps in infinitum. Efficiatur itaque ut R, Q, $QQ - 2R$, $Q^3 - 3QR$, &c. datæ sint Quantitates, & Problema solvetur. Q. E. F.

Ad eundem modum Curvæ inveniri possunt, quæ tria, vel plura abscindent Segmenta, similes proprietates habentia. Sit Æquatio $y^3 + Qyy + Ry + S = 0$, ubi Q, R, & S, Quantitates significant ex Quantitatibus quibuscunque datis, & Quantitate x utcunque constantes, & Curva abscindet Segmenta tria. Et si S data sit Quantitas contentum Solidorum illorum trium dabitur. Si Q sit Quantitas data Summa trium illorum dabitur. Si $QQ - 2R$ sit data Quantitas, Summa Quadratorum ex tribus illis dabitur.

OPUS.



OPUSCULUM VI.

ART. II.

De Ratione Temporis, quo Grave labitur per Rectam data duo Puncta conjungentem ad Tempus brevissimum, quo, vi Gravitatis, transit ab horum uno ad alterum per Arcum Cycloidis.

THEOREMA.

SI (Fig. 3. hujus Opusculi) in Cycloide A VD, cujus Basis AD est Horizonti parallela, Vertice V deorsum spectante, ex A ducatur utcumque Recta AB Cycloidi occurrens in B, ex quo ducatur Recta BC Curvæ Cycloidis BD in B normalis, ad quam ex A demittatur perpendicularis Recta AC. Dico Tempus, quo Grave è quiete cadens ex A, vi suæ Gravitatis, decurrit Rectam AB, esse ad Tempus, quo percurrit Curvam AVB, sicut Recta AB ad Rectam AC.

Trans. Phil.
los. Mens.
Februar.
Ann. 1697.
Num. 225.
pag. 434

Per B ducatur BL parallela Cycloidis Axi VE; & BK, Basi AD parallela occurrens Axi in G, & Circulo super Diametrum EV descripto, in F & H; Cycloidi denique in K. Ducatur Recta EF, quæ, ex Cycloidis naturâ, parallela est Rectæ BC. Unde BM est æqualis EF, & EM æqualis BF; quæ, propter Cycloidem, æquatur Arcui VF; & proinde AM est æqualis Arcui EHV F.

Per Prop. XXV. Part. II. Horologii Oscillatorii HUGENII, Tempus, quo Grave è quiete cadens percurrit AV, est ad Tempus Casûs per EV, ut Semicircumferentia ad Diametrum; & per dictæ Partis Propositionem ultimam, Tempus, quo Grave percurrit VB, post decursam AV, (nempe æquale Tempori, quo Grave percurrit KV, post decursam AK,) est ad Tempus Lapsûs per AV, sicut Arcus VF ad semicircumferentiam; adeoque ad

Tempus Casus per EV, sicut FV ad Diametrum, Quare Tempus, quo Grave percurrit Curvam AVB, est ad Tempus Casus per EV, sicut Arcus EHVF, ad Diametrum EV. Sed, Tempus Casus per EV, est ad Tempus Casus per LB, (sive EG,) sicut EV ad EF. Igitur, ex æquo, Tempus, quo Grave percurrit AVB, est ad Tempus Casus per LB, sicut Arcus EHVF ad Subtensam EF; hoc est ut Recta AM, ad Rectam MB. Rursus, Tempus Casus per LB est ad Tempus Lapsus per AB, ut LB ad AB. Ergo, Ratio Temporis, quo Grave percurrit AVB, ad Tempus, quo percurrit AB, componitur ex Ratione AM ad MB, & Ratione LB ad BA; adeoque æqualis est Rationi $AM \times LB$ ad $MB \times BA$. Sed $AM \times LB$ est æquale $MB \times AC$; quia utrumque æquatur duplo Trianguli ABM. Et igitur, Tempus, quo Grave è quiete cadens percurrit Curvam *Cycloidis* AVB, est ad Tempus, quo percurrit Rectam AB, sicut $MB \times AC$, ad $MB \times BA$; id est, sicut AC ad AB. Q. E. D.

Similitérque procedet Demonstratio, si Punctum B, sit inter A & V.





OPUSCULUM VII.
PROBLEMATIS

Olim in Actis Eruditorum Lipsiæ propositi

SOLUTIO GENERALIS.

IN *Actis Eruditorum* pro mense *Octobri* Anni 1698 pag. 471: *Transact. Philos.*
D. *Johannes* BERNOULLIUS hæc scripsit. Methodum, quam 1716.
optaveram generalem secandi Curvas ordinatim positione datas, sive Janu. Febr.
algebraicas, sive transcendentales, in Angulo recto, sive obliquo, & Mart.
invariabili, sive datâ lege variabili, tandem ex voto erui: cui N^o. 347:
LEIBNITIO approbatore, ne $\gamma\mu$ addi potest ad ulteriorem per pag. 399
fectionem, & vel ideo tantum quod perpetuò ad *Æquationem* deduc-
cat: in quâ si interdum indeterminatæ sunt inseparabiles, Methodus
non ideo imperfectior est, non enim hujus sed aliûs est Methodi
indeterminatas separare: Rogamus igitur Fratrem ut velit suas quo-
que vires exercere in re tanti momenti. Suscepti laboris non poeni-
tebit, si felix successus fructu jucundo compensaverit. Scio relictu-
rum suum, quem nunc fovet, modum, qui in paucissimis tantum
exemplis adhiberi potest.

Hi tres Viri Celeberrimi sese, jam ab annis quatuor vel quin-
que, circiter, in solvendis hujusmodi Problematibus exercuerant.
Absque spiritu divinandi eandem Solutionem cum *Bernoullianâ* tra-
dere difficile fuerit. Sufficit quod Solutio sequens sit generalis, &
ad *Æquationem* semper deducat.

P R O B L E M A.

Quæritur Methodus generalis inveniendi Seriem Curvarum, quæ Curvas in Serie aliâ quâcumque datâ constitutas, ad Angulum, vel datum, vel datâ lege variabilem secabunt.

S O L U T I O.

Natura Curvarum secundarum dat Tangentes earundem ad intersectionum Puncta quæcumque : & Anguli intersectionum dant Perpendiculara Curvarum secantium ; & Perpendiculara duo coeuntia, per concursum suum ultimum, dant Centrum Curvaminis Curvæ secantis ad Punctum intersectionis cujuscunque. Ducatur Abscissa in situ quocumque commodo, & sit ejus Fluxio Unitas ; & positio Perpendiculari dabit Fluxionem primam Ordinatæ ad Curvam quæsitam pertinentis ; & Curvamen hujus Curvæ dabit Fluxionem secundam ejusdem Ordinatæ. Et sic Problema semper deducetur ad Aequationes. Quod erat faciendum.

S C H O L I U M.

Non hujus, sed alius est Methodi Aequationes reducere, & indeterminatas separare, absolute, si fieri possit, sin minus, per Series infinitas. Problema hocce, cum nullius fere sit usus, in *Actis Eruditorum* annos plures neglectum & insolutum mansit. Et eadem de causâ Solutionem ejus non ulterius prosequor.

OPUSCU-

OPUSCULA VIII. & IX.
E X C E R P T A
E X E P I S T O L I S
A U T
I S A A C I N E W T O N I
A U T
A D E U M S P E C T A N T I B U S.
Editis in
C O M M E R C I O E P I S T O L A R I.
C O L L I N S I I & C.

OPUSCU-



OPUSCULUM VIII.

EXCERPTUM EX EPISTOLA
ISAACI NEWTONI

A D

COLLINSIUM

A. D. 10. Decemb. Ann. 1672.

EX animo gaudeo D. BAROVII amici nostri Reverendi Lectiones Mathematicis exteris adeò placuisse, neque parum me juvat intelligere eos [SLUSIUM & GREGORIUM] in eandem mecum incidisse ducendi Tangentes Methodum. Qualem eam esse conjiciam ex hoc exemplo percipies. Pone (*Vide Figuram hujus Opusculi*) CB Applicatam ad AB in quovis Angulo dato terminari ad quamvis Curvam AC; & dicatur $AB = x$, & $BC = y$; habitu-
dóque inter x & y exprimatur qualibet Æquatione, puta, $x^3 - 2xxy + bxx - bby - y^3 = 0$, quæ ipsa determinatur Curva. Regula ducendi Tangentem hæc est; multiplica Æquationis Terminos per quamlibet Progreffionem arithmeticam juxta Dimensiones y , puta $x^3 - 2xxy + bxx - bby - y^3$, ut & juxta Dimensiones x , puta, $x^3 - 2xxy + bxx - bby - y^3$.

Prius Productum erit Numerator, & posterius, divisum per x , Denominator Fractionis, quæ exprimet Longitudinem BD, ad cujus extremitatem D ducenda est Tangens CD: est ergo Longitudo BD

$$= \frac{-2xxy + 2byy - 3y^3}{3xx - 4xy + 2bx - bb}$$

Is. Newtoni Opuscula Tom. I.

P p

Hoc

Com.
Epistol. se-
cund. Edit.
pag. 104.
& seq.
Num.
XXVI.

Hoc est unum particulare, vel Corollarium potius Methodi generalis, quæ extendit se, citra molestum ullum Calculum, non modò ad ducendum Tangentes ad quasvis Curvas, five Geometricas, five Mechanicas, vel quomodocunque rectas Lineas, aliàsve Curvas respicientes; verùm etiam ad resolvendum alia abstrusiora Problematum genera de Curvitatibus, Arcis, Longitudinibus, Centris Gravitatis Curvarum, &c. Neque, (quemadmodum HUDDENII Methodus de *Maximis*, & *Minimis*,) ad solas restringitur Æquationes illas, quæ Quantitatibus furdis sunt immunes.

Hanc Methodum intertexui alteri isti, quâ Æquationum Exegesis instituo, reducendo eas ad Series infinitas. Memini me ex occasione aliquando narrasse D. BARROVIO, edendis Lectionibus suis occupato, instructum me esse hujusmodi Methodo Tangentes ducendi: Sed nescio quo diverticulo ab eâ ipsi describendâ fuerim avocatus.

SLUSII Methodum Tangentes ducendi brevî publicè proditura confido: quamprimum advenerit, exemplar ejus ad me transmittere ne grave ducas.

OPUS



OPUSCULUM IX.

ART. I

EXCERPTUM

Ex Epistolâ OLDEMBURGII ad SLUSIUM.

In quâ continetur

PARS EPISTOLÆ

A B

ISAACO NEWTONO

A D

Eundem OLDEMBURGIIUM datæ.

A. D. 10. Julii 1673.

EN tibi, Vir illustrissime, impressum modum tuum demonstrandi Methodum tuam ducendi Tangentes ad quolibet Curvas, quemadmodum postremis tuis litteris eum mihi communicaveras: subticui viri nomen, offensionis evitandi causa. scripsit mihi D. NEWTONUS in hanc sententiam.

Ex priori tuâ Epistolâ subdubitabam, existimarétne celeberrimus SLUSIUS per ea, quæ ipsi de me scripseras, me mihi tribuere Methodum ipsius ducendi Tangentes; donec intelligerem à D.

P p 2 COL

Ibidem
pag. 107.
Num.
XXIX.

COLLINSIO, te ipsi significasse, eam, ex opinione tuâ, seriùs hîc inventam fuisse. Tibi quippe videtur, eam D. SLUSIO perspectam fuisse aliquot annis priusquàm ederet Mesolabum suum, proîndèque antequàm ego eam intelligerem. At, si res secus se haberet, cùm tamen eam primus communicaverit Amicis suis & litterato Orbi, jure merito ipsi debetur. Quoad Methodos illas, eadem sunt, quanquam, crediderim, ex principiis diversis derivatæ. Nescio tamen num ipsius principia eam largiantur adeò generalem ac mea; quæ ad Æquationes Terminis furdis affectas se extendunt, absque eorum ad aliam formam Reductione.

Hæc ille, quæ in bonam partem à te acceptum iri confido.

A R T. II.

E X C E R P T U M

Ex Epistolâ LEIBNITII ad OLDEMBURGIIUM

A. D. 30. Martii An. 1675.

Ibidem
pag. 117.
Num.
XXXV.

Scribis, clarissimum NEWTONUM vestrum habere Methodum exhibendi Quadraturas omnes, omniùmque curvarum Superficierum & Solidorum ex revolutione genitorum Dimensiones, & Centrorum Gravitatis inventiones, per appropinquationes scilicet, ita enim interpretor. Quæ Methodus si est universalis & commodâ, meretur æstimari; nec dubito fore ingeniosissimo Auctore dignam. Addis tale quid GREGORIO innotuisse.

A R T.



A R T. III.

E X C E R P T U M

Ex Epistolâ OLDEMBURGII ad LEIBNITIVM, quâ superiori
respondetur.

A. D. 15. Aprilis An. 1675.

D. COLLINSIUS, præmissâ salute, quæ sequuntur remittit.
Primo Clarissimum GREGORIUM in postremâ suâ ad Il-
lustrem HUGENIVM responsione, Seriem suppeditasse ad Semicir-
cumferentiam Circuli inveniendam, quæ talis.

Ibidem
pag. 112.
Num.
XXXVI.

Pone Radium $= r$, dimidium Latus Quadrati inscripti Circulo
 $= d$, & Differentiam inter Radium & Latus Quadrati $= e$,
Semicircumferentia æqualis est.

$$2d - \frac{e}{3} - \frac{ee}{90d} - \frac{e^3}{756dd} - \frac{2e^4}{113400d^3} - \frac{260e^5}{7484400d^5} - \&c.$$

in infinitum; quæ Series adeò produci potest, ut à Semicircumfe-
rentiâ minùs differat, quàm ulla Quantitas assignabilis.

Editum hoc fuit à D. GREGORIO postquam D. MERCATORIS
Logarithmotechnia jam extabat, quæ, quàm primùm viderat lucem,
ad D. BARROVIUM à me fuit transmissâ; qui observato in eâ
infinitæ Seriei usu ad Logarithmos construendos, rescribebat Me-
thodum illam jam aliquandiu excogitatam fuisse à Successore suo
NEWTONO, omnibûsque Curvis, earûmque portionibus geome-
tricis, æquè ac mechanicis, universim applicatam, cuius rei spê-
cimina quædam subjecit, videlicet.

Positâ pro Radio Unitate, datoque x pro Sinu, ad inveniendum x
Arcum Series hæc est $x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9$
 x^9 &c. in infinitum. Et, extractâ Radice hujus Æquationis, Me-

P. p. 3. tho-

thodo symbolica, si dederis z pro Arcu, ad inveniendum x Sinum
 Series hæc est $x = z - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 - \frac{1}{5040}z^7 + \frac{1}{362880}z^9$
 $z^9 - \&c.$ Atque hæc series facillè continuatur in infinitum. Prioris
 beneficio ex Sinu triginta Graduum CEULENII numeri facillè stru-
 untur. &c.

Consimiliter, si ponas Radium R, & B Sinum Arcûs: Zona (*vi-
 de Figuram hujus Opusculi*), inter Diametrum & Chordam illi pa-
 rallelam est $= 2RB - \frac{B^3}{3R} - \frac{B^5}{20R^3} - \frac{B^7}{56R^5} - \frac{5B^9}{576R^7} - \frac{7B^{11}}{1408R^9}$
 $—, \&c.$ Atque eadem Series, mutatis signis Termini secundi,
 quarti, & sexti, &c., inservit assignandæ Areæ zonæ æquilateris Hy-
 perbolæ, videlicet $AFGB = 2RB + \frac{B^3}{3R} - \frac{B^5}{20R^3} + \frac{B^7}{56R^5}$
 $- \frac{5B^9}{576R^7} + \frac{7B^{11}}{1408R^9} - \&c.$

ART. IV.

EXCERPTUM

Ex Epistolâ OLDEMBURGII ad LEIBNITIUM

A. D. 24. Junii 1675.

Ibidem
 pag. 123.
 Num. XL.

DOMINUS NEWTONUS, beneficio Logarithmorum gradua-
 torum in Scalis *παράλληλως* locandis ad distantias æquales,
 vel Circulorum concentricorum eo modo graduatorum adminiculo,
 invenit Radices Æquationum. Tres Regulæ rem conficiunt pro
 Cubicis, quatuor pro Biquadraticis. In harum dispositione respec-
 tivi Coefficientes omnes jacent in eadem Lineâ rectâ; à cujus Punc-
 to tam remoto à primâ Regulâ ac Scalæ graduatæ sunt ab invicem,
 Linea recta iis superextenditur, unâ cum præscriptis conformibus
 genio Æquationis, quâ in Regularum unâ datur Potestas pura Ra-
 dicis quæsitæ.

ART. V.



ART. V.

EXCERPTUM

Ex Epistolâ LEIBNITII ad OLDEMBURGIIUM

Paris. A. D. 12. Maii 1676.

CUM *Georgius MOHR DANNUS*, in Geometria & Analyfi verfatissimus, nobis attulerit communicatam sibi à Doctissimo COLLINSIO vestro expressionem Relationis inter Arcum & Sinum per infinitas Series sequentes:

Posito Sinu $= x$, Arcu $= z$, Radio $= r$.

$$z = x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{3}{40} x^5 + \frac{5}{112} x^7 + \frac{35}{1152} x^9, \text{ \&c.}$$

$$x = z - \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{120} z^5 - \frac{1}{40} z^7 + \frac{1}{362880} z^9, \text{ \&c.}$$

Hæc, * inquam, cum nobis attulerit ille, quæ mihi valde ingeniosa videntur, & posterior inprimis Series elegantiam quandam singularem habeat, ideo rem gratam mihi feceris, Vir Clarissime, si Demonstrationem transmiseris, . . . Oro, ut Clarissimo COLLINSIO multam à me salutem dicas: is facillè tibi materiam suppeditabit satisfaciendi desiderio meo.

* Hæ Series NEWTONI sunt. Vide Articulum superiorem, & Opusc. I. pag. 22. hujus &c. & ratio inveniendorum Coefficientium, quæ infra traditur, item NEWTONIANA est. Opusc. I. pag. 23. hujus.

OPUS

OPUSCULUM IX.

ART. VI.

EXCERPTUM

Ex Epistola COLLINSII ad OLDEMBURGIIUM, quâ superiori
respondetur.

A. D. 14. Junii 1676

Ibidem
pag. 126.
227.
Num.
XLV.

RESPONDEAS, si placet, ad ea quæ quærit D. LEIBNITIUS
in Litteris ejus 12 Maii datis, Seriei primæ numeros Coeffi-
cientes $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{40}$, $\frac{5}{112}$, $\frac{35}{1152}$, hoc modo compositos esse. $\frac{1 \times 1}{2 \times 3}$
 $= \frac{1}{6}$, & $\frac{1}{6} \times \frac{3 \times 3}{4 \times 5} = \frac{3}{40}$, & $\frac{3}{40} \times \frac{5 \times 5}{6 \times 7} = \frac{5}{112}$, & $\frac{5}{112} \times \frac{7 \times 7}{8 \times 9}$
 $= \frac{35}{1152}$, & $\frac{35}{1152} \times \frac{9 \times 9}{10 \times 11} = \frac{63}{2816}$, atque ita deinceps in infini-
tum: unde intelligi possit hanc Seriem elegantia minimè cedere
conversæ ejusdem, quæ tamen illi magis arridet. Meditata ejus de
eodem Argumento, cum fundamentis planè diversis innitantur,
non possunt nobis non esse acceptissima; atque exoptamus ea fidem
nostram exsuperare posse. Hujus autem Methodi ea est præstantia,
ut, cum tam latè pateat, ad nullam hæreat difficultatem. GRE-
GORIUM autem alióque in eâ fuisse opinione arbitror, ut quic-
quid uspiam antea de hac re innotuit, quasi dubia diluculi lux fuit,
si cum meridianâ claritate conferatur.

OPUS

OPUSCULUM X.
ISAACI NEWTONI
EPISTOLA PRIOR

A D

OLDEMBURGII

Edita in COMMERCIO EPISTOLICO. &c.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I

Qq

O P U S C U L U M X.

Epistola prior ISAACI NEWTONI Matheſeos Profeſſoris in Celeberrimâ Academiâ CANTABRIGIENSI; ad HENRICUM OLDEMBURGIIUM, Regalis SOCIETATIS LONDINI Secretarium; 13. Junii 1676. cum Illuſtriſſimò Viro GODOFREDO GUILLIELMO LEIBNITIO (eo mediante) communicanda. Literis OLDEMBURGII, (26. Junii) ad LEIBNITIUM miſſa.

QUanquam D. LEIBNITII modestia, in Excerptis, quæ ex Epistolâ ejus ad me nuper miſiſti, Noſtratibus multum tribuat circa speculationem quandam *Inſinitarum Serierum*, de quâ jam cæpit eſſe rumor; nullus dubito tamen, quin ille, non tantum, (quod aſſerit,) Methodum reducendi Quantitates quascunque in ejuſmodi Series, ſed & varia Compendia, fortè noſtris ſimilia, ſi non & meliora, adinvenerit.

Comm.
Epist. Secun.
Edit.
pag. 131.
Num.
XLVIII.

Quoniam tamen ea ſcire pervelit, quæ ab Anglis hac in re inventa ſunt, & ipſe ante annos aliquot in hanc Speculationem inciderim; ut votis ejus aliquâ ſaltem ex parte ſatiſfacerem, nonnulla eorum, quæ mihi occurrerunt, ad te tranſmiſi.

Fractiones in infinitas Series reducuntur per Diviſionem; & Quantitates Radicales per Extractionem Radicum: perinde inſtituendo Operationes iſtas in Speciebus, ac inſtitui ſolent in Decimalibus Numeris. Hæc ſunt Fundamenta harum Reductionum.

Sed Extractions Radicum multum abbreviantur per hoc *Theorema*.

Qq 2

P +

$$\overline{P+PQ} \left| \frac{m}{n} = P \frac{m}{n} + \frac{m}{n} A Q + \frac{m-n}{2n} B Q + \frac{m-2n}{3n} C Q \right.$$

$$\left. + \frac{m-3n}{4n} D Q + \&c. \right.$$

Ubi $P+PQ$ significat Quantitatem, cujus Radix, vel etiam Dimensio quævis, vel Radix Dimensionis, investiganda est. P , primum Terminum Quantitatis ejus; Q reliquos Terminos divisos per primum. Et $\frac{m}{n}$ numeralem Indicem Dimensionis ipsius $P+PQ$; five Dimensio illa sit integra; five, (ut ita loquar,) fracta; five affirmativa, five negativa. Nam, sicut Analytæ, pro aa , aaa , &c. scribere solent a^2 , a^3 , &c. sic ego, pro \sqrt{a} , $\sqrt[3]{a}$, $\sqrt[5]{a}$, &c. scribo $a^{\frac{1}{2}}$, $a^{\frac{1}{3}}$, $a^{\frac{1}{5}}$; & pro $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{aa}$, $\frac{1}{aaa}$, scribo a^{-1} , a^{-2} , a^{-3} . Et sic pro $\frac{aa}{\sqrt{C: a^3+bbx}}$, scribo $aa \times \overline{a^3+bbx}^{-\frac{1}{2}}$; & pro $\frac{aab}{\sqrt{C: a^3+bbx \times a^3+bbx}}$ scribo $aab \times \overline{a^3+bbx}^{-\frac{2}{2}}$. In quo ultimo casu, si $\overline{a^3+bbx}^{-\frac{2}{2}}$ concipiatur esse $\overline{P+PQ} \left| \frac{m}{n}$ in Regulâ: erit $P=a^3$, $Q=\frac{bbx}{a^3}$, $m=-2$, & $n=3$. Denique, pro Terminis inter operandum inventis in Quoto, usurpo A , B , C , D , &c. Nempe A pro primo Terminum $P \frac{m}{n}$; B pro secundo $\frac{m}{n} A Q$; & sic deinceps.

Ceterum usus Regulæ patebit Exemplis.

E X E M P L U M I.

Est $\sqrt{cc+xx}$, (seu $\overline{cc+xx}^{\frac{1}{2}}$), $= c + \frac{xx}{2c} - \frac{x^4}{8c^3} + \frac{x^6}{16c^5}$

$$- \frac{5x^8}{128c^7} + \frac{7x^{10}}{256c^9} - \&c. \text{ Nam, in hoc casu, est } P=cc;$$

$$Q=\frac{xx}{cc}; m=1; n=2; A (=P \frac{m}{n} = \overline{c}^{\frac{1}{2}}) = c; B (=$$

$\frac{m}{n}$
12

$\frac{m}{n} A Q) = \frac{x^x}{2c}$; $C (= \frac{m-n}{2n} B Q) = \frac{-x^4}{8c^3}$. Et sic deinceps.

EXEMPLUM II.

Eft $\sqrt[5]{c^5 + c^4 x - x^5}$; (id eft, $\sqrt[5]{c^5 + c^4 x - x^5 |^5}$) $= c + \frac{c^4 x - x^5}{5c^4} - \frac{2c^3 x x + 4c^4 x^6 - 2x^{10}}{25c^9} + \&c.$ Ut patebit fubftituendo in allatam Regulam, 1 pro m , 5 pro n , c^5 pro P , & $\frac{c^4 x - x^5}{c^5}$ pro Q . Poteft etiam $-x^5$ fubftitui pro P , & $\frac{c^4 x + c^5}{-x^5}$ pro Q ; & tunc evadet $\sqrt[5]{c^5 + c^4 x - x^5} = -x + \frac{c^4 x + c^5}{5x^4} + \frac{2c^3 x x + 4c^4 x + c^{10}}{25x^9} + \&c.$

Prior modus eligendus eft, fi x valde parvum fit; pofterior, fi valde magnum.

EXEMPLUM III.

Eft $\frac{N}{\sqrt[3]{y^3 - aay}}$, (hoc eft, $N \times \sqrt[3]{y^3 - a^2 y}^{-\frac{1}{3}}$) $= N \times \frac{1}{y} + \frac{a a}{3y^3} + \frac{a^4}{9y^5} + \frac{7a^6}{81y^7} + \&c.$ Nam, $P = y^3$; $Q = \frac{-aa}{yy}$; $m = -1$; $n = 3$; $A (= P^{\frac{m}{n}} = y^{3 \times -\frac{1}{3}}) = y^{-1}$, hoc eft, $\frac{1}{y}$; $B (= \frac{m}{n} \times A Q = \frac{-1}{3} \times \frac{1}{y} \times \frac{-aa}{yy}) = \frac{aa}{3y^3}$; &c.

EXEMPLUM IV.

Radix cubica ex Quadrato-Quadrato ipfius $d+e$, (hoc eft, $\sqrt[3]{d+e^4}$) eft $d^{\frac{4}{3}} + \frac{4e d^{\frac{1}{3}}}{3} + \frac{2ee}{9d^{\frac{2}{3}}} - \frac{4e^3}{81d^{\frac{5}{3}}} + \&c.$ Nam, $P = d$; $Q = \frac{e}{d}$; $m = 4$; $n = 3$; $A (= P^{\frac{m}{n}}) = d^{\frac{4}{3}}$ &c.

Qq 3

EXEM

E X E M P L U M V.

Eodem modo simplices etiam Potestates eliciuntur. Ut, si Quadrato-cubus ipsius $d+e$, (hoc est, $\overline{d+e}^3$, seu $\overline{d+e}^{\frac{1}{1}}$) desideretur: erit, juxta Regulam, $P=d$; $Q=\frac{e}{d}$; $m=5$; & $n=1$;

Adeòque $A(=P^{\frac{m}{n}})=d^5$; $B(=\frac{m}{n}AQ)=5d^4e$; & sic $C=10d^3ee$; $D=10dde^3$; $E=5de^4$; $F=e^5$; & $G(=\frac{m-\frac{5n}{6n}}{6n}FQ)=0$, Hoc est, $\overline{d+e}^3=d^5+5d^4e+10d^3ee+10dde^3+5de^4+e^5$.

E X E M P L U M VI.

Quinetiana Divisio, (five simplex fit, five repetita,) per eandem Regulam perficitur. Ut, si $\frac{1}{d+e}$, (hoc est, $\overline{d+e}^{-1}$; five $\overline{d+e}^{-\frac{1}{1}}$) in Seriem simplicium Terminorum resolvendum fit: Erit, juxta Regulam, $P=d$; $Q=\frac{e}{d}$; $m=-1$; $n=1$; & $A(P^{\frac{m}{n}}=d^{-1})=d^{-1}$, seu $\frac{1}{d}$; $B(=\frac{m}{n} \times AQ=-1 \times \frac{1}{d} \times \frac{e}{d}=-\frac{e}{d^2})$; & sic $C=\frac{ee}{d^3}$; $D=-\frac{e^3}{d^4}$, &c., Hoc est, $\frac{1}{d+e}=\frac{1}{d}-\frac{e}{d^2}+\frac{ee}{d^3}-\frac{e^3}{d^4}+\&c.$

E X E M P L U M VII.

Sic & $\overline{d+e}^{-3}$, (hoc est, Unitas ter divisa per $d+e$, vel semel per Cubum ejus,) evadit $\frac{1}{d^3}-\frac{3e}{d^4}+\frac{6ee}{d^5}-\frac{10e^3}{d^6}+\&c.$

E X E M-

EXEMPLUM VIII.

Et $N \times \sqrt[3]{d+e}$, (hoc est, N divisum per Radicem cubicam ipsius $d+e$) evadit $N \times \frac{1}{d^{\frac{1}{3}}} - \frac{e}{3d^{\frac{4}{3}}} + \frac{2ee}{9d^{\frac{7}{3}}} - \frac{14e^3}{81d^{\frac{10}{3}}} + \&c.$

EXEMPLUM IX.

Et $N \times \sqrt[3]{d+e}$, hoc est, N divisum per Radicem Quadrato-Cubicam ex Cubo ipsius $d+e$, five $\frac{N}{\sqrt[3]{d^3 + 3dde + 3dee + e^3}}$ evadit $N \times \frac{1}{d^{\frac{3}{3}}} - \frac{3e}{5d^{\frac{8}{3}}} + \frac{12ee}{25d^{\frac{11}{3}}} - \frac{52e^3}{125d^{\frac{14}{3}}} + \&c.$

Per eandem Regulam Geneses Potestatum, Divisiones per Potestates, aut per Quantitates radicales, & Extractions Radicum altiorum in Numeris etiam commodè instituuntur.

Extractiones Radicum Æquationum affectarum in Speciebus imitantur earum Extractionem in Numeris; Sed Methodus VIETÆ, & OUGHTREDI nostri huic negotio minùs idonea est: Quapropter aliam excogitare adactus sum, cujus specimen exhibent sequentia Diagrammata. Ubi dextra Columna prodit substituendo in mediâ Columnâ Valores $y; p; q; r; \&c.$ in sinistrâ Columnâ expressos.

Prius Diagramma exhibet Resolutionem hujus numeralis Æquationis $y^3 - 2y - 5 = 0$. Et hîc in supremis Numeris Pars negativa Radicis, subducta de Parte affirmativâ, relinquit absolutam Radicem 2,09455148.

Et posterius Diagramma exhibet Resolutionem hujus litterariæ Æquationis $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$.

$y^3 -$

$y^3 - 2y - .5 = 0$		$+ 2, 10000000 \&c.$ $- 0, 00544852$
$+ 2 + p = y$		$+ 2, 09455148; \&c. = y$ $+ 8 + 12p + 6pp + p^3$ $- 2y - 4 - 2p$ $- 5 - 5$
		Summa $- 1 + 10p + 6pp + p^3$
$+ 0, 1 + q = p$		$+ p^3 + 0, 001 + 0, 03q + 0, 3qq + q^3$ $+ 6pp + 0, 06 + 1, 2 + 6,$ $+ 10p + 1, + 10,$ $- 1 - 1$
		Summa $+ 0, 061 + 11, 23q + 6, 3qq + q^3$
$- 0, 0054 + r = q$		$+ q^3 - 0, 0000001 + 0, 000r; \&c.$ $+ 6, 3qq + 0, 0001837 - 0, 068$ $+ 11, 23q - 0, 060642 + 11, 23$ $+ 0, 061 + 0, 061$
		Summa $+ 0, 0005416 + 11, 162r$
$- 0, 00004852 + s = r$		

r +

$y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0 \left(a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^4}{16384a^3} ; \&c. \right)$		
$+ a + p = y$	y^3 $+ axy$ $+ aay$ $- x^3$ $- 2a^3$	$a^3 + 3aap + 3app + p^3$ $+ aax + axp$ $+ a^3 + aap$ $- x^3$ $- 2a^3$
$-\frac{1}{4}x + q = p$	p^3 $+ 3app$ $+ axp$ $+ 4aap$ $+ aax$ $- x^3$	$-\frac{1}{64}x^3 + \frac{3}{16}xxq; \&c.$ $+ \frac{3}{16}axx - \frac{3}{2}axq + 3aqg$ $-\frac{1}{4}axx + axq$ $- aax + 4aaq$ $+ aax$ $- x^3$
$+ \frac{xx}{64a} + r = q$	$+ 3aqq$ $+ \frac{3}{16}xxq$ $-\frac{1}{2}axq$ $+ 4aaq$ $-\frac{65}{64}x^3$ $-\frac{1}{16}axx$	$+ \frac{3x^4}{4096a}; \&c.$ $+ \frac{3x^4}{1024a}; \&c.$ $-\frac{1}{128}x^3 - \frac{1}{2}axr$ $+ \frac{1}{16}axx + 4aar$ $-\frac{65}{64}x^3$ $-\frac{1}{16}axx$
$+ 4aa - \frac{1}{2}ax$	$+ \frac{131}{128}x^3 - \frac{15x^4}{4096a} \left(+ \frac{131x^3}{512aa} + \frac{509x^4}{16384a^3} \right)$	

In priori Diagrammate, primus Terminus Valoris ipsorum $p; q; r$, in primâ Columnâ, invenitur dividendo primum Terminum Summæ proximè superioris, per Coefficientem secundi Termini ejusdem Summæ, (ut — 1 per 10, aut 0,061 per 11,23,) & mutando signum Quoti.

Et idem Terminus eodem ferè modo invenitur in secundo Diagrammate. Sed hîc præcipua difficultas est in inventionem primi Termini Radicis. Id quod Methodo generali perficitur: sed hoc, brevitatîs gratiâ, jam prætereo; ut & alia quædam, quæ ad concinnandam Operationem spectant: neque enim hîc compendia tradere vacat. Sed dicam tantum in genere, Quod Radix cujusvis Æquationis semel extracta, pro Regulâ resolvendi consimiles Æquationes asservari possit: quoddam ex pluribus ejusmodi Regulis, Regulam generaliore plerumque efformare liceat; & quod Radices omnes, sive simplices sint, sive affectæ, modis infinitis extrahi possint; de quorum simplicioribus itaque semper consulendum est.

Quomodo ex Æquationibus, sic ad infinitas Series reductis, Aræ, & Longitudines Curvarum, Contenta, & Superficies Solidorum, vel quorumlibet Segmentorum Figurarum quarumvis, eorumque Centra Gravitatis determinantur; & quomodo etiam Curvæ omnes mechanicæ ad ejusmodi Æquationes infinitarum Serierum reduci possint, indeque Problemata circa illas resolveri, perinde ac si geometricæ essent; nimis longum foret describere; sufficiat specimina quædam talium Problematum recensuisse: Inque iis, brevitatîs gratiâ, litteras A; B; C; D, &c. pro Terminis Seriei, sicut sub initio, nonnunquam usurpabo.

E X E M P L U M I.

Si ex dato Sinu recto, vel Sinu verso, Arcus desideretur: Sit Radius = r , & Sinus rectus = x . Eritque Arcus = $x + \frac{x^3}{6rr}$
 $+ \frac{3x^5}{40r^5} + \frac{5x^7}{112r^7}$; &c., hoc est, = $x + \frac{1 \times 1 \times x x}{2 \times 3 \times r r} A + \frac{3 \times 3 \times x x}{4 \times 5 \times r r} \times$
 $B + \frac{4 \times 4 \times x x}{6 \times 7 \times r r} C + \frac{7 \times 7 \times x x}{8 \times 9 \times r r} D +$; &c.

Vel,

Vel, sit d Diameter, ac x Sinus versus; & erit Arcus æqualis

$$d^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6d^{\frac{1}{2}}} + \frac{3x^{\frac{5}{2}}}{40d^{\frac{3}{2}}} + \frac{5x^{\frac{7}{2}}}{112d^{\frac{5}{2}}} + ; \&c.; \text{ hoc est, } = \sqrt{dx} \text{ in}$$

$$1 + \frac{x}{6d} + \frac{3xx}{40dd} + \frac{5x^3}{112d^3}; \&c.$$

Si vicissim, ex dato Arcu desideretur Sinus: Sit Radius $= r$ &

$$\text{Arcus} = z; \text{ eritque Sinus rectus} = z - \frac{z^3}{6rr} + \frac{z^5}{120r^3} -$$

$$\frac{z^7}{5040r^5} + \frac{z^9}{362880r^7} - ; \&c.; \text{ hoc est, } = z - \frac{z^3}{2 \times 3rr} A - \frac{z^5}{4 \times 5rr} \times$$

$$B - \frac{z^7}{6 \times 7rr} C - ; \&c. \text{ Et Sinus versus} = \frac{z^2}{2r} - \frac{z^4}{24r^3} + \frac{z^6}{720r^5}$$

$$- \frac{z^8}{40320r^7} + ; \&c.; \text{ hoc est, } = \frac{z^2}{1 \times 2r} - \frac{z^4}{3 \times 4rr} A - \frac{z^6}{5 \times 6rr} \times$$

$$B - \frac{z^8}{7 \times 8rr} C - ; \&c.$$

EXEMPLUM II.

Si Arcus capiendus sit in ratione datâ ad alium Arcum: Esto Diameter $= d$, Chorda Arcus dati $= x$, & Arcus quæsitus ad Arcum illum datum, ut n ad 1; Erítque Arcus quæsití Chorda

$$= nx + \frac{1 - nn}{2 \times 3 dd} xx A + \frac{9 - nn}{4 \times 5 dd} xx B + \frac{25 - nn}{6 \times 7 dd} xx C + \frac{49 - nn}{8 \times 9 dd} xx D + \frac{81 - nn}{10 \times 11 dd} xx E + ; \&c.$$

Ubi nota, quòd, cùm n est Numerus impar, Series desinet esse infinita, & evadet eadem quæ prodit per vulgarem Algebram, ad multiplicandum datum Angulum per istum Numerum n .

EXEMPLUM III.

Si in Axe alterutro (*Fig. 1.*) AB Ellipseos ABD, (cujus Centrum C, TAB. I. & Axis alter DH,) detur Punctum aliquod E, circa quod Recta EG occurrens Ellipsi in G, motu angulari feratur; & ex datâ Arcû Sectoris elliptici BEG, quærat Recta GF, quæ à Puncto G ad

R r 2

Axem

Axem normaliter demittitur: Esto $BC = q$; $DC = r$; $EB = t$; ac duplum Areae $BEG = x$; & erit $GF = \frac{1}{t} x - \frac{q}{6rrt^2} x^2 + \frac{10qq - 9qt}{120r^4t^3} x^3 - \frac{280q^3 + 504qqt - 225qt^2}{5040r^6t^4} x^4 +$; &c. Sic itaque astronomicum illud KEPLERI Problema resolvi potest.

In eadem Ellipfi, si statuatur $CD = r$; $\frac{CB}{CD} = c$; & $CF = x$; erit Arcus ellipticus DG

$$= x + \frac{1}{6c} x^3 + \frac{1}{10rc^3} x^5 + \frac{1}{14rrc^5} x^7 + \frac{8}{18r^3c^7} x^9 + \frac{1}{22r^5c^9} x^{11} + \&c.$$

$$- \frac{1}{40c^4} - \frac{1}{28rc^6} - \frac{1}{24rrc^8} - \frac{1}{22r^3c^{10}} + \frac{1}{112c^8} + \frac{1}{48rc^{10}} + \frac{3}{88rrc^{12}} - \frac{5}{1152c^{10}} - \frac{5}{352rc^{12}} + \frac{7}{2816c^{14}}$$

Hic numerales Coefficientes supremorum Terminorum ($\frac{1}{6}$; $\frac{1}{10}$; $\frac{1}{14}$; &c.) sunt in musica Progreffione. Et numerales Coefficientes omnium inferiorum in unaquaque Columna prodeunt multiplicando continuo numeralem Coefficientem supremi Termini per Terminos hujus Progreffionis $\frac{1}{2}n-1$; $\frac{1}{4}n-3$; $\frac{1}{6}n-5$; $\frac{1}{8}n-7$; $\frac{1}{10}n-9$; &c. Ubi n significat Numerum Dimensionum ipsius c in Denominatore istius supremi Termini. Ex.gr. ut Terminum infra $\frac{1}{22r^5c^9}$ Numerales Coefficientes inveniantur, pono $n=6$, ducóque $\frac{1}{22}$, (numeralem Coefficientem ipsius $\frac{1}{22r^5c^9}$) in $\frac{1}{2}n-1$; hoc est, in 1; & prodit $\frac{1}{22}$, numeralis Coefficientis Termini proximi.

rimè inferioris: Dein duco. hunc $\frac{1}{22}$ in $\frac{\frac{1}{2}n-3}{4}$; five in $\frac{n-3}{4}$; hoc est, in $\frac{3}{4}$; & prodit $\frac{3}{88}$ numeralis Coefficientens tertii Termini in istà Columnà. Atque ita $\frac{3}{88} \times \frac{\frac{1}{2}n-5}{6}$ facit $\frac{5}{352}$, numeralem Coefficientem quarti Termini; & $\frac{5}{352} \times \frac{\frac{1}{2}n-7}{8}$ facit $\frac{7}{2816}$, numeralem Coefficientem infimi Termini. Idem in aliis ad infinitum usque Columnis præstari potest. Adeoque valor ipsius. DG per hanc Regulam pro lubitu produci.

Ad hæc, si BF dicatur = x , fitque r latus rectum Ellipseos. & $e = \frac{r}{AB}$; Erit Arcus ellipticus BG = $\sqrt{r} x$ in.

$$\left. \begin{array}{r} +2 \\ -\frac{3}{2}e \\ \hline 3r \end{array} \right\} x \quad \left. \begin{array}{r} -2 \\ +3e \\ -\frac{5}{8}ee \\ \hline 5rr \end{array} \right\} xx \quad \left. \begin{array}{r} +4 \\ -9e \\ +\frac{27}{4}ee \\ -\frac{7}{16}e^3 \\ \hline 7r^3 \end{array} \right\} x^3 \quad \left. \begin{array}{r} -10 \\ +30e \\ -\frac{123}{4}ee \\ +\frac{91}{8}e^3 \\ -\frac{45}{128}e^4 \\ \hline 9r^4 \end{array} \right\} x^4 ;$$

Quare, si ambitus totius Ellipseos desideretur; biseca CB in F, & quære Arcum DG, per prius Theorema, & Arcum BG per posterius.

Si, vice versâ, ex dato Arcu Elliptico DG, quæratursinus ejus CF; tum dicto CD = r , $\frac{CB}{CD} = e$, & Arcu illo DG = x ; Erit

$$CF = z - \frac{1}{6ec} z^3 - \frac{1}{10rc^3} z^5 - \frac{1}{14rrc^4} z^7 - ; \&c. \\ + \frac{13}{120c^4} + \frac{71}{420rc^5} - \frac{493}{5040c^6}$$

Quæ autem de Ellipsi dicta sunt, omnia facile accommodantur
R. r 3 ad

ad Hyperbolam, mutatis tantum signis ipsorum c , & e , ubi sunt imparium Dimensionum.

EXEMPLUM IV.

TAB. I. Præterea, (Fig. 2.) si sit CE Hyperbola, cujus Asymptoti AD, AF, rectum Angulum FAD constituent; & ad AD erigantur utcumque Perpendiculara BC, DE, occurrentia Hyperbolæ in C, & E; & AB dicatur $= a$; BC $= b$; & Area BCED $= x$; Erit $BD = \frac{x}{b} + \frac{x^2}{2abb} + \frac{x^3}{6aab^2} + \frac{x^4}{24a^2b^3} + \frac{x^5}{120a^3b^4} +$; &c. Ubi Coefficientes Denominatorum prodeunt multiplicando Terminos hujus arithmetice Progressionis, 1; 2; 3; 4; 5; &c. in se continuo.

Et hinc ex Logarithmo dato potest Numerus ei competens inveniri.

EXEMPLUM V.

TAB. II. Esto (Fig. 3.) VDE Quadratrix, cujus Vertex est V, existente A Centro, & AE Semi-diametro Circuli, ad quem aptatur, & Angulo VAE recto: Demissioque ad AE Perpendicularo quovis DB, & acta Quadratricis Tangente DT occurrente Axi ejus AV in T: Dic AV $= a$; & AB $= x$.

$$\text{Eritque } BD = a - \frac{x^2}{3a} - \frac{x^4}{45a^3} - \frac{2x^6}{945a^5} - ; \&c.$$

$$\text{Et } VT = \frac{xx}{3a} + \frac{x^4}{15a^3} + \frac{2x^6}{189a^5} + ; \&c.$$

$$\text{Et Area AVDB} = ax - \frac{x^3}{9a} - \frac{x^5}{225a^3} - \frac{2x^7}{6615a^5} - ; \&c.$$

$$\text{Et Arcus VD} = x + \frac{2x^3}{27aa} + \frac{14x^5}{2025a^3} + \frac{604x^7}{893025a^5} + ; \&c.$$

Unde vicissim, ex dato BD, vel VT, aut Area AVDB, Arcus VD, per Resolutionem affectarum Equationum erui potest x seu AB.

EXEM-



11

EXEMPLUM VI.

Esto denique (Fig. 4.) AEB Sphaeroides revolutione Ellipseos AEB TAB. II
circa Axem AB genita, & secta Planis quatuor, AB per Axem transe-
unte, DG parallelo AB, CDE perpendiculariter bisecante Axem,
& FG parallelo CE: sitque Recta CB = a ; CE = c ; CF = x ;
& FG = y .

Et sphaeroideos segmentum CDGF, dictis quatuor Planis com-
prehensum, erit

$$\begin{aligned}
 &+ 2cxy - \frac{x}{3c} y^3 - \frac{x}{20c^3} y^5 - \frac{x}{56c^5} y^7 - \frac{5x}{576c^7} y^9 - ; \&c. \\
 &- \frac{cx^3}{3aa} - \frac{x^3}{18caa} - \frac{x^3}{40c^3aa} - \frac{5x^3}{336c^5aa} - ; \&c. \\
 &- \frac{cx^5}{20a^4} - \frac{x^5}{40ca^4} - \frac{3x^5}{160c^3a^4} - ; \&c. \\
 &- \frac{cx^7}{56a^6} - \frac{5x^7}{336ca^6} - ; \&c. \\
 &- \frac{5cx^9}{576a^8} - ; \&c. \\
 &- ; \&c.
 \end{aligned}$$

Ubi numerales Coefficientes supremorum Terminorum (2 ; $-\frac{1}{3}$;

$-\frac{1}{20}$; $-\frac{1}{56}$; $-\frac{5}{576}$; &c.) in infinitum producantur mul-
tiplicando primum Coefficientem 2 continuò per Terminos hujus

Progressionis $-\frac{1 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{1 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{2 \times 5}{6 \times 7}$; $\frac{5 \times 7}{8 \times 9}$; $\frac{7 \times 9}{10 \times 11}$; &c. Et numera-

les Coefficientes Terminorum in unaquaque Columnâ descenden-
tium in infinitum producantur, multiplicando continuò Coefficien-
tem supremi Termini in primâ Columnâ per eandem Progressio-

nem; in secundâ autem per Terminos hujus $\frac{1 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{3 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{5 \times 5}{6 \times 7}$;

$\frac{7 \times 7}{8 \times 9}$; &c., in tertiâ per Terminos hujus $\frac{3 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{5 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{7 \times 5}{6 \times 7}$; $\frac{9 \times 7}{8 \times 9}$;

&c.; in quartâ per Terminos hujus $\frac{5 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{7 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{9 \times 5}{6 \times 7}$; &c.; in quin-

tà per Terminos hujus $\frac{7 \times 1}{2 \times 3}$; $\frac{9 \times 3}{4 \times 5}$; $\frac{11 \times 5}{6 \times 7}$; &c. Et sic in infinitum.

Et eodem modo Segmenta aliorum Solidorum designari, & valores eorum aliquando commodè per Series quasdam numerales in infinitum produci possunt.

Ex his videre est, quantum fines Analyseos per hujusmodi infinitas Aequationes ampliantur: Quippe, quæ, earum beneficio, ad omnia, penè dixerim, Problemata, (si numeralia DIOPHANTI, & similia excipias,) sese extendit.

Non tamen omninò universalis evadit, nisi per ultiores quasdam Methodos eliciendi Series infinitas. Sunt enim quædam Problemata, in quibus non liceat ad Series infinitas per Divisionem, vel Extractionem Radicum simplicium, affectarumve, pervenire. Sed quomodo in istis casibus procedendum sit, jam non vacat dicere; ut neque alia quædam tradere, quæ circa Reductionem infinitarum Serierum in finitas, ubi rei Natura tulerit, excogitavi. Nam, parcius scribo, quòd hæ speculationes diu mihi fastidio esse cæperint, adeo ut ab iisdem jam per quinque ferè annos abstinerim.

Unum tamen addam: quòd postquàm Problema aliquod ad infinitam Aequationem deducitur, possint inde variz approximationes in usum Mechanicæ, nullo ferè negotio, formari; quæ, per alias Methodos quæsitæ, multo labore, temporisque dispendio, constare solent.

Cujus rei exemplo esse possunt Tractatus HUGENII, aliorumque de Quadraturâ Circuli. Nam, ut ex datâ Arcûs Chordâ A, & dimidii Arcûs Chordâ B, Arcum illum proximè assequaris; finge Arcum illum esse $= z$, & Circuli Radium $= r$; juxtaque superiora, erit A (nempe duplum Sinûs dimidii z) $= z - \frac{z^3}{4 \times 6rr}$

$+ \frac{z^5}{4 \times 4 \times 120r^4} -$; &c.

Et B $= \frac{1}{2} z - \frac{z^3}{2 \times 16 \times 6rr} + \frac{z^5}{2 \times 16 \times 16 \times 120r^4} -$; &c.

Duc jam B in Numerum fictitium n , & à Producto aufer A, & residui secundum Terminum, (nempe $-\frac{n z^3}{2 \times 16 \times 6r} + \frac{z^5}{4 \times 6rr}$), eo ut evanescat, pone $= 0$; indeque emerget $n = 8$, & erit 8B

8B — A = 3z * — $\frac{3z^3}{64 \times 120r^4} +$; &c., hoc est, $\frac{8B - A}{3} = z$;
 errore tantum existente $\frac{z^3}{7680r^4} -$; &c., in excessu. Quod est
 Theorema *Hugenianum*.

Insuper, si (Fig. 5.) in Arcus Bb Sagittà AD indefinitè pro- TAB. II.
 ducta, quærat Punctum G, à quo actæ Rectæ GB, Gb, abf-
 cindant Tangentem Ee quamproximè æqualem Arcui isti: Esto Cir-
 culi Centrum C, Diameter AK = d'; & Sagittà AD = x: Et erit

$$DB (= \sqrt{dx - xx}) = d' x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2d^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{8d^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{16d^{\frac{5}{2}}} - ; \&c.$$

$$\text{Et AE (= AB)} = d^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{6d^{\frac{1}{2}}} + \frac{3x^{\frac{7}{2}}}{40d^{\frac{3}{2}}} + \frac{5x^{\frac{9}{2}}}{112d^{\frac{5}{2}}} + \&c.$$

$$\text{Et AE — DB : AD :: AE : AG ; Quare AG} = \frac{3}{2} d - \frac{1}{5} x \\
x - \frac{12xx}{175d} - , \text{vel} + ; \&c.$$

$$\text{Finge ergo AG} = \frac{3}{2} d - \frac{1}{5} x ; \& \text{ vicissim erit DG (} \frac{3}{2} d - \frac{6}{5} x) : DB :: DA : AE - DB. \text{ Quare AE — DB} = \\
\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3d^{\frac{1}{2}}} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{5d^{\frac{3}{2}}} + \frac{23x^{\frac{7}{2}}}{300d^{\frac{5}{2}}} + ; \&c. \text{ Adde DB ; \& prodit AE} = d^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} \\
+ \frac{x^{\frac{5}{2}}}{6d^{\frac{1}{2}}} + \frac{3x^{\frac{7}{2}}}{40d^{\frac{3}{2}}} + \frac{17x^{\frac{9}{2}}}{1200d^{\frac{5}{2}}} + ; \&c. \text{ Hoc aufer de valore ipsius AE}$$

$$\text{supra habito, \& restabit error } \frac{16x^{\frac{7}{2}}}{525d^{\frac{5}{2}}} + , \text{vel} - ; \&c. \text{ Quare, in}$$

AG, cape AH quintam partem DA, & KG = HC, & actæ
 GBE, Gbe, abscindant Tangentem Ee quamproximè æqualem
 Arcui BAb; errore tantum existente $\frac{16x^3}{525d^3} \sqrt{dx} + , \text{vel} - ; \&c.$
 multò minore scilicet, quàm in Theoremate HUGENII. Quod
 si fiat 7AK : 3AH :: DH : n; & capiatur KG = CH — n, erit
 error adhuc multò minor.

If. Newtoni Opuscula, Tom. I.

S :

Atque

Atque ita, si Circuli Segmentum aliquod $B\hat{b}A$ per Mechanicam designandum esset: primò reducerem Aream istam in Infinitam Seriem, puta, hanc, $B\hat{b}A = \frac{4}{3} d^{\frac{1}{2}} x^{\frac{5}{2}} - \frac{2x^{\frac{7}{2}}}{5d^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{9}{2}}}{14d^{\frac{3}{2}}} - \frac{x^{\frac{11}{2}}}{36d^{\frac{5}{2}}}$

—; &c. Dein quærerem Constructiones mechanicas, quibus hanc Seriem proximè assequeretur: cujusmodi sunt hæ: Age Rectam AB , & erit Segmentum $B\hat{b}A = \frac{2}{3} \overline{AB + BD} \times \frac{4}{5} AD$; proximè; existente scilicet errore tantum $\frac{x^3}{70dd} \sqrt{dx} +$; &c. in defectu: Vel proximius, erit Segmentum illud, (bisecto AD in F , & actâ Rectâ BF ,) $= \frac{4BF + BA}{15} \times \overline{4AD}$; existente errore solummodò $\frac{x^3}{560dd} \times \sqrt{dx} +$; &c., qui semper minor erit quàm $\frac{1}{1500}$ totius Segmenti, etiamsi Segmentum illud ad usque semicirculum augeatur.

TAB. II. Sic, (Fig. 5.) & in Ellipsi $B\hat{b}A$, cujus Vertex A , Axis alteruter AK , & Latus rectum AP ; cape $PG = \frac{1}{2} AP + \frac{19AK - 21AP}{10AK} \times \overline{AD}$. In Hyperbolâ verò, cape $PG = \frac{1}{2} AP + \frac{19AK + 21AP}{10AK} \times \overline{AD}$. Et actâ Rectâ GBE abscindet Tangentem AE quamproximè æqualem Arcui elliptico, vel hyperbolico AB ; dummodò Arcus ille non sit nimis magnus.

Et pro Areâ Segmenti hyperbolici (Fig. 6.) $B\hat{b}A$; in DP cape $M.D = \frac{3\overline{AD}^2}{4AK}$, & ad D , & M erige Perpendiculara $D\beta$, MN , occurrentia Semicirculo super Diametro AP descripto: eritque $\frac{4AN + A\beta}{15} \times \overline{4AD} = B\hat{b}A$ proximè: Vel, proximius, erit $\frac{21AN + 4A\beta}{75} \times \overline{4AD} = B\hat{b}A$; si modò capiatur $DM = \frac{5\overline{AD}^2}{7AK}$.

Cambridge:

Junii. 13. 1676.


Tuus &c.
ISAACUS. NEWTON.
OPUS

OPUSCULA XI. & XII.
I S A A C I
N E W T O N I
EPISTOLA POSTERIOR

A D
O L D E M B U R G I U M
Edita in
C O M M E R C I O E P I S T O L I C O.
E T
E J U S D E M E P I S T O L A A D C O L L I N S I U M

Edita LONDINI Anno 1711.

S s 2



ART. I.

EXCERPTUM

Ex Epistolâ LEIBNITII ad OLDEMBURGIUM

C U M

NEWTONO

COMMUNICANDA.

A. D. 27. Augusti 1676.

CLARISSIMO VIRO

Henrico OLDEMBURGIO Godofredus Guilielmus.

LEIBNITIUS.

Litteræ tuæ die 26. Julii datæ, plura ac memorabiliora circa rem analyticam continent, quam multa Volumina spissa de his rebus edita. Quare tibi pariter ac Clarissimis Viris NEWTONO ac COLLINSIO gratias ago, qui nos participes tot meditationum egregiarum esse voluistis.

Commerc.
Epist. Edit.
secund.
pag. 129.
Nº. LL.

Inventa NEWTONI ejus ingenio digna sunt, quod ex Opticis Experimentis & Tubo Cata-dioptrico abunde eluxit.

Ejusque Methodus inveniendi Radices Æquationum & Areas Figurarum, per Series infinitas, prorsus differt à meâ; ut mirari libeat diversitatem itinerum, per quæ eodem pertingere licet.

S. 3.

MER-

MERCATOR Figuras rationales, seu, in quibus Ordinatarum valor ex datis Abscissis rationaliter exprimi potest, (ut scilicet indeterminata Quantitas in Vinculum non ingrediatur,) quadravit & ad infinitas Series reducere docuit per Divisiones; NEWTONUS autem per Radicum Extractions. Mea Methodus Corollarium est tantum Doctrinæ generalis de Transformationibus; &c.*

Sed desideraverim, ut Clarissimus NEWTONUS nonnulla quoque amplius explicet; ut, originem Theorematis, quod initio ponit; item, modum, quo Quantitates p , q , r , in suis Operationibus invenit; ac denique, quomodo in Methodo Regressuum se gerat; ut, cum ex Logarithmo quærit Numerum. Neque enim explicat quomodo id ex Methodo suâ derivetur.

Nondum mihi licuit ejus litteras, quâ merentur, diligentia legere; quoniam tibi è vestigio respondere volui. Unde non satis nunc quidem affirmare ausim, an nonnulla eorum, quæ suppressit, ex solâ earum lectione consequi possim. Sed optandum tamen foret, ipsum ea potius supplere NEWTONUM; quia credibile est non posse eura scribere, quin aliquid semper præclari nos doceat, Vir (ut apparet,) egregiarum meditationum plenus. &c.

Quod dicere videmini, pleraque difficultates, (exceptis Problematis *Diophantais*,) ad Series Infinitas reduci; id mihi non videtur. Sunt enim multa usque adeò mira & implexa, ut neque ab Æquationibus pendeant, neque ex Quadraturis. Qualia sunt; (ex multis aliis,) Problemata Methodi Tangentium inversæ; quæ etiam CARTESIUS in potestate non esse falsus est.

In Tomo III. Epistolarum, una habetur ad BEAUNIO; in quâ ad propositas à BEAUNIO, Curvas quasdam invenire conatur; quarum una est † Ludus Naturæ, ut intervallum inter Tangentem ad (Axem) Directricem usque productam & Ordinatum applicatam ex Curvâ ad Directricem, sit semper idem; Recta scilicet constans.

Hanc

* Hic LEIBNITIUS explicat Methodum suam, quam explicationem, quia longiuscula est & minimè necessaria, omisi.

† Hic (testante LEIBNITIO, vide infra Opusc. XVI. Art. I.) legendum est *hujus naturæ*, non, *Ludus Naturæ*; sed, cum hic error locum dederit NEWTONO respondendi, *inter Ludos Naturæ vis numeraverim* &c. (vide infra hoc ipso Opusculo Art. III.) illum reliquimus.

Hanc Curvam nec CARTESIUS, nec BEAUNIUS, nec quisquam alius, (quod sciam,) invenit. Ego verò quā primū die, imo horā, cæpi quærere, statim certā Analyfi solvi. Fateor tamen nondum me, quicquid in hoc genere desiderari potest, consecutum :: quanquam maximi momenti esse sciam. Ac de his quidem nunc satis. &c.

A R T. I I.

E X C E R P T U M

Ex Epistolā T S C H Ü R N H A U S I I

ad OLDEMBURGIIUM

Parisiis. A. D. I. Septembris 1679.

A Dmodum oblectatus fui, hisce conspectis, quæ ad LEIBNITHIUM exarasti; maximèque me tibi devinxisti, quod me participem volueris facere tam ingeniosarum inventionum, & promotionis Geometriæ, tam pulchræ, quàm utilis. * * *

Comm.
Epist. Edit.
secundæ
pag. 141.
Num. LIV.

Verum, ut ad specimina perquam ingeniosa NEWTONI revertar, hæc non potuere mihi non placere, tam ob utilitatem, quâ se tam latè ad quarumvis Quantitatum Dimensiones, ac alia difficilia enodanda in Mathematicis extendunt, quàm ob deductionem harum à fundamentis non minùs generalibus, quàm ingeniosis, derivatam :: non obstante quòd existimem, ad Quantitatem quamvis ad infinitam Seriem æquipollentem reducendam, fundamenta adhuc dari & simpliciora & universaliora, quàm sunt Fractionum & Irrationalium reductio ad tales Series, ope Divisionis aut Extractionis, quæ mihi tale quid, non nisi per accidens, præstare videntur; cum hæc successum quoque habeant, licet non adsint Fractiones aut irrationales Quantitates. Similia porrò, quæ in hac re præstitit eximius ille Geometra GREGORIUS, memoranda certè sunt, &c.

A R T.



ART. III

ISAACI NEWTONI EPISTOLA POSTERIOR

A D

OLDEMBURGIIUM

Cum LEIBNITIO communicanda

A. D. 24. Octob. 1676.

VIR DIGNISSIME

Quantà cum voluptate legi Epistolas Clarissimorum vitorum
LEIBNITII & TSCHÜRNHAUSII vix dixerim.

Perelegans sanè est LEIBNITII Methodus perveniendi ad Series
Convergentes : & satis ostendisset ingenium Auctoris, et si nihil
aliud scripsisset. Sed quæ alibi per Epistolam spar sit suo nomine di-
gnissima, efficiunt etiam ut ab eo speremus maxima. Diversitas
modorum, quibus eodem tenditur, eo magis placuit, quòd mihi
tres Methodi perveniendi ad ejusmodi Series innotuerant; adeò ut
novam nobiscum communicandam vix expectarem.

Unam è meis priùs descripsi: jam addo aliam; illam, scilicet;
quà primùm incidi in has Series. Nam, incidi in eas, antequàm
scirem Divisiones, & Extractions Radicum, quibus jam utor. Et
hujus explicatione pandendum est fundamentum Theorematis sub
initio Epistolæ prioris positi, quod LEIBNITIUS à me desi-
derat.

Sub initio studiorum meorum Mathematicorum, ubi incideram
in

in Opera Celeberrimi WALLISII nostri, considerando Series, quarum intercalatione ipse exhibet Aream Circuli, & Hyperbolæ; utpote, quòd in Serie Curvarum, quarum Basis, seu Axis communis fit $= x$, & ordinatim Applicatæ $= \sqrt{1 - xx}$; $\sqrt{1 - xx^2}$; $\sqrt{1 - xxx^2}$; $\sqrt{1 - xxx^3}$; $\sqrt{1 - xxx^4}$; &c. si Areæ alternarum, quæ sunt x ; $x - \frac{1}{3} x^3$; $x - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5$; $x - \frac{3}{3} x^3 + \frac{3}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7$; &c., interpolari possent, haberemus Areas intermediarum, quarum prima $\sqrt{1 - xx}$ est Circulus: ad has interpolandas notabam, quòd in omnibus, primus Terminus esset x , quòdque secundi Terminum $\frac{0}{3} x^3$; $\frac{1}{3} x^3$; $\frac{2}{3} x^3$; $\frac{3}{3} x^3$; &c. essent in arithmetica Progressione; & proinde, quòd duo primi Terminum Serierum intercalandarum deberent esse $x - \frac{\frac{1}{2} x^3}{3}$; $x - \frac{\frac{2}{2} x^3}{3}$; &c.

Ad reliquas intercalandas considerabam, quòd Denominatores 1; 3; 5; 7; &c. erant in arithmetica Progressione; adeoque soli Numeratorum Coefficientes numerales essent investigandæ. Hæ autem in alternis datis Areis erant Figuræ Potestatum Numeri undenarii; nempe 11^0 ; 11^1 ; 11^2 ; 11^3 ; 11^4 ; Hoc est primò 1; deinde 1, 1; tertio, 1, 2, 1; quartò 1, 3, 3, 1; quintò 1, 4, 6, 4, 1; &c.

Quærebam itaque, quomodo, in his Seriebus, ex datis duabus primis Figuris reliquæ derivari possent. Et inveni, quòd positâ secundâ Figurâ m reliquæ producerentur per continuam multiplicationem Terminorum hujus Seriei, $\frac{m-0}{1} \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4} \times \frac{m-4}{5}$; &c.

Exempli gratia; fit, (Terminus secundus), $m = 4$, & erit $4 \times \frac{m-1}{2}$, hoc est 6, tertius Terminus; & $6 \times \frac{m-2}{3}$, hoc est,

If. Newtoni Opuscula, Tom. I. T t (4)

(4) quartus; & $4 \times \frac{m-3}{4}$, hoc est, 1, quintus; & $1 \times \frac{m-4}{5}$, hoc est, 0, sextus; quo Series in hoc casu terminatur.

Hanc Regulam itaque applicui ad Series interferendas. Et, cum, pro Circulo, secundus Terminus esset $\frac{1}{2}x^2$, posui $m = \frac{1}{2}$; & prodierunt Termini $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, five $\frac{1}{8}$; $-\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{16}$, five $+\frac{1}{16}$; $+\frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$, five $-\frac{1}{128}$; & sic in infinitum. Unde cognovi desideratam Aream Segmenti circularis esse $x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^3 + \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{128}x^5 + \frac{1}{128}x^6 - \frac{1}{128}x^7 + \frac{1}{128}x^8$; &c.

Et eadem ratione prodierunt etiam interferendæ Aream reliquarum Curvarum: ut & Area Hyperbolæ, & ceterarum alternarum in hac Serie $\frac{1}{1+xx}^{\frac{1}{2}}$; $\frac{1}{1+xx}^{\frac{1}{3}}$; $\frac{1}{1+xx}^{\frac{1}{4}}$; $\frac{1}{1+xx}^{\frac{1}{5}}$; &c.

Et eadem est ratio intercalandi alias Series; idque per Intervals duorum, plurimumve, Terminorum simul deficientium.

Hic fuit primus meus ingressus in has meditationes, qui è memoriâ fanè exciderat, nisi oculos in adversaria quædam ante paucas septimanas retulissem. Ubi verò hæc didiceram, mox considerabam Terminos $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{3}}$, $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{4}}$, $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{5}}$, &c.; hoc est, 1, $1-xx$, $1-2xx+x^2$, $1-3xx+3x^2-x^3$, &c.; eodem modo interpolari posse ac Areas ab ipsis generatas: & ad hoc nihil aliud requiri, quàm omissionem Denominatorum, 1, 3, 5, 7, &c., in Terminis exprimentibus Areas; hoc est, Coefficientes Terminorum Quantitatis intercalandæ $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{2}}$, vel $\frac{1}{1-xx}^{\frac{1}{3}}$, vel generaliter $\frac{1}{1-xx}^m$, prodire per continuam Multiplicationem Terminorum hujus Seriei $m \times \frac{m-1}{2} \times \frac{m-2}{3} \times \frac{m-3}{4}$ &c.

Adco-

Adeoque (exempli gratia) $\sqrt[3]{1 - xx}$, valeret $1 - \frac{1}{2}xx - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6$, &c.; Et $\sqrt[3]{1 - xx}$ valeret $1 - \frac{3}{2}xx + \frac{3}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6$, &c.; Et $\sqrt[3]{1 - xx}$ valeret $1 - \frac{1}{3}xx - \frac{1}{9}x^4 - \frac{5}{81}x^6$, &c.; Sic itaque innotuit mihi generalis Reductio Radicalium, in infinitas Series, per Regulam, quam posui initio Epistolæ prioris, antequam scirem Extractiones Radicum.

Sed, hac cognitâ, non potuit altera me diu latere. Nam, ut probarem has Operationes, multiplicavi $1 - \frac{1}{2}xx - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6$, &c., in se; & factum est $1 - xx$, Terminis reliquis in infinitum evanescentibus per continuationem Series. Atque ita $1 - \frac{1}{2}xx - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6$, &c., bis in se ductum produxit etiam $1 - xx$. Quod, ut certa fuerit harum conclusionum Demonstratio, sic me manuduxit ad tentandum è converfo, num hæ Series, quas sic constitit esse Radices Quantitatis $1 - xx$, non possent inde extrahi more arithmetico. Et res benè successit. Operationis formam in quadraticis Radicibus hæc erat.

$$\begin{array}{r}
 1 - xx \quad (1 - \frac{1}{2}xx - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6 \text{ \&c.} \\
 \hline
 1 \\
 0 - xx \\
 \hline
 - xx + \frac{1}{4}x^4 \\
 \hline
 - \frac{1}{4}x^4 \\
 \hline
 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{8}x^6 + \frac{1}{64}x^8 \\
 \hline
 - \frac{1}{8}x^6 - \frac{1}{64}x^8
 \end{array}$$

T t 2

His

His perspectis neglexi penitus interpolationem Serierum, & has Operationes tanquam fundamenta magis genuina, solummodo adhibui. Nec latuit Reductio per Divisionem, res utique facilior.

Sed & Resolutionem affectarum Æquationum mox aggressus sum, eamque obtinui. Unde simul ordinatim Applicatæ, Segmenta Axium, aliæque quælibet Rectæ, ex Areis Curvarum, vel Arcubus datis innotuere. Nam, regressio ad hæc nihil indigebat præter Resolutionem Æquationum, quibus Areæ, vel Arcus, ex datis Rectis dabantur.

Eo tempore pestis ingruens, (quæ contigit annis 1665, 1666,) coëgit me hinc fugere, & alia cogitare. Addidi tamen subinde condituram quandam Logarithmorum ex Areâ Hyperbolæ, quam hic subjungo.

Sit (*Fig. 1.*) $\mathcal{A}FD$ Hyperbola, cujus Centrum C , Vertex F , & Quadratum interjectum $CAFE = 1$. In AC cape AB , Ab , hinc inde $= \frac{1}{10}$, seu, $0, 1$: Et, erectis Perpendicularis BD , bd , ad Hyperbolam terminatis, erit semi-Summa spatiorum AD , & $A\mathcal{A} = 0, 1 + \frac{0,001}{3} + \frac{0,00001}{5} + \frac{0,0000001}{7}$, &c.; & semi-differentia $= \frac{0,01}{2} + \frac{0,0001}{4} + \frac{0,0000001}{6} + \frac{0,000000001}{8}$, &c.

Quæ reductæ sic se habent.

0,10000000000000	0,00500000000000
3333333333	250000000
20000000	1666666
142857	1250
1111	100
2	1
<hr/>	
0,1003353477310.	0,0050251679267

Horum Summa $0,1053605156577$ est $A\mathcal{A}$; & Differentia $0,0953101798043$ est AD . Et eadem ratione, positis AB , Ab , hinc inde $= 0, 2$; obtinebitur $A\mathcal{A} = 0,2231435513142$; &
AD

AD = 0, 1823215567939. Habitis sic Logarithmis hyperbolicis Numerorum quatuor decimalium 0, 8; 0, 9; 1, 1; & 1, 2; cùm fit $\frac{1,2}{0,8} \times \frac{1,2}{0,9} = 2$; & 0, 8 & 0, 9 sunt minores Unitate; adde Logarithmos eorum ad duplum Logarithmi 1, 2; & habebis 0, 6931471805597, Logarithmum hyperbolicum Numeri. 2; Cujus triplo adde Logarithmum 0, 8, (siquidem fit $\frac{2 \times 2 \times 2}{0,8} = 10$,) & habebis 2, 3025850929933, Logarithmum Numeri 10: Indéque per Additionem simul, prodeunt Logarithmi Numerorum 9, & 11; Adeòque omnium primorum horum 2, 3, 5, 11, Logarithmi in promptu sunt. Insuper, ex solâ depressione Numerorum superioris computi per loca decimalia, & Additione, obtinentur Logarithmi Decimalium 0, 98; 0, 99; 1, 10; 1, 02; ut, & horum 0, 998; 0, 999; 1, 001; 1, 002. Et inde, per Additionem & Subductionem, prodeunt Logarithmi primorum 7, 13, 17, 37, &c. Qui unâ cum superioribus, per Logarithmum Numeri 10. divisi, evadunt veri Logarithmi in Tabulam inferendi. Sed hos. postea. propius obtinui.

Pudet dicere ad quot Figurarum loca has computationes otiosus eo tempore produxi. Nam, tunc sanè nimis delectabar inventis hîsce. Sed ubi prodiit ingeniosa illa *Nicolai MERCATORIS* Logarithmotechnia, (quem suppono sua primùm invenisse,) cæpi ea minus curare; suspicatus, vel eum nosse Extractionem Radicum æquè ac Divisionem Fractionum; vel alios saltem, Divisione patefactâ, inventuros reliqua, priusquàm ego ætatis essem. maturæ ad scribendum.

Eo ipso tamen tempore, quo Liber iste prodiit, communicatum est per Amicum BARROW (tunc Matheseos Professore Cantabrigiensem) cum COLLINSIO Compendium * quoddam Methodi harum Serierum; in quo significaveram Areas, & Longitudines Curvarum omnium, & Solidorum Superficies, & Contenta, ex datis Rectis; & vice versa, ex his datis Rectas determinari posse, & Methodum ibi indicatam illustraveram diversis Seriebus.

T t 3

Subo-

* Hoc compendium est Analysis per Equationes numero Terminorum infinitas supra impressâ.

Subortâ deinde inter nos Epistolari consuetudine; COLLINSIUS, Vir in rem Mathematicam promovendam natus, non destitit suggerere, ut hæc publici juris facerem. Et ante annos quinque (1671) cùm suadentibus Amicis consilium ceperam edendi Tractatum de Refractione Lucis, & Coloribus, quem tunc in promptu habebam, capi de his Seriebus iterum cogitare, & Tractatum de iis etiam conscripsi, ut utrumque simul ederem.

Sed, ex occasione Telescopii Catadioptrici, Epistola ad te missa, quâ breviter explicui conceptus meos de naturâ Lucis, inopinatum quiddam effecit ut mei interesse sentirem ad te festinanter scribere de impressione istius Epistolæ. Et subortæ statim per diversorum Epistolas (objectionibus aliisque refertas) crebræ interpellationes me prorsus à consilio deterruerunt, & effecerunt ut me arguerem imprudentiæ, quòd, umbram captando, eatenus perdideram quietem meam, rem prorsus substantialem.

Sub eò tempore *Jacobus GREGORIUS*, ex unicâ quâdam Serie è meis, quam COLLINSIUS ad eum transmiserat, post multam considerationem, (ut ad COLLINSIUM rescripsit,) pervenit ad eandem Methodum, & Tractatum de eâ reliquit, quem speramus ab Amicis ejus editum iri. Siquidem, pro ingenio, quo pollebat, non potuit non adjicere de suo novâ multa, quæ rei Mathematicæ interest ut non pereant.

Ipsæ autem Tractatum meum non penitus absolveram, ubi destiti à proposito; neque in hunc diem mens rediit ad reliqua adjicienda. Deerat quippe pars ea, quâ decreveram explicare modum solvendi Problemata, quæ ad Quadraturas reduci nequeunt, licet aliquid de fundamentis ejus posuisssem. Ceterum, in Tractatu isto, Series infinitæ non magnam partem obtinebant.

Alia haud pauca congesti, inter quæ erat Methodus ducendi Tangentes, quam solertissimus *SELIUS* ante annos duos, tresve, tecum communicavit; de quâ tu (suggerente COLLINSIO) rescripsisti eandem mihi etiam innotuisse. Diversâ ratione in eam incidimus. Nam, res non eget Demonstratione, prout ego operor Habito meo fundamento, nemo potuit Tangentes aliter ducere, nisi volens de rectâ viâ deviares.

Qui.

Quinetiam non hic hæretur ad *Æquationes Radicalibus unam*, vel utramque indefinitam *Quantitatem involventibus utcunque affectas*; sed absque aliquâ talium *Æquationum Reductione*, (quæ opus plerumque redderet immensum,) *Tangens confestim ducitur*. Et eodem modo se res habet in quæstionibus de *maximis & minimis*; aliisque quibusdam, de quibus jam non loquor.

Fundamentum harum Operationum, satis obvium quidem, (quoniam jam non possum explicationem ejus profèqui), sic potius celavi *6 a c c d a 1 3 e f f 7 i 3 l 9 n 4 o 4 q r r 4 s 9 t 1 2 v x . **

Hoc fundamento conatus sum etiam reddere speculationes de *Quadraturâ Curvarum simpliciores*; pervenique ad *Theoremata quædam generaliora*. Et, ut candidè agam, ecce primum Theorema.

Ad Curvam aliquam sit $dz^{\theta} \times \sqrt{e + fz^{\eta}}^{\lambda}$ Ordinatim Applicata, Terminò Abscissæ seu Basis z normaliter insistentis: ubi litteræ d, e, f , denotant quaslibet *Quantitates datas*; &, θ, η, λ , Indices Potestatum sive Dignitatum *Quantitatum*, quibus affixæ sunt.

$$\text{Fac } \frac{\theta+1}{\eta} = r, \lambda + \pi = s, \frac{d}{\eta f} \times \sqrt{e + fz^{\eta}}^{\lambda+1} = Q, \text{ \& } r \neq$$

$-\eta = \pi$; Et Area Curvæ erit Q in $\frac{z^{\pi}}{s} - \frac{r-1}{s-1} \times \frac{eA}{fz^{\eta}}$
 $+ \frac{r-2}{s-2} \times \frac{eB}{fz^{\eta}} - \frac{r-3}{s-3} \times \frac{eC}{fz^{\eta}} + \frac{r-4}{s-4} \times \frac{eD}{fz^{\eta}}$, &c., Litteris A, B, C, D , &c., denotantibus Terminos proximè antecessores; nempe.

$$\text{A Terminum } \frac{z^{\pi}}{s}.$$

$$\text{B Terminum } - \frac{r-1}{s-1} \times \frac{eA}{fz^{\eta}}; \text{ \&c. Hæc Series, ubi } r \text{ Frac-}$$

tio est vel Numerus negativus, continuatur in infinitum; ubi verò r integer est & affirmativus, continuatur ad tot Terminos tantum, quot

* Hoc est; *Datâ Æquatione quocunque Eluentes Quantitates involvente, Fluxiones invenire; & vice versa.*

quot sunt Unitates in eodem r , & sic exhibet geometricam Quadraturam Curvæ. Rem exemplis illustro.

EXEMPLUM I.

Proponatur Parabola, cujus ordinatim Applicata fit \sqrt{az} . Hæc, in formam Regulæ reducta, fit $z^0 \times \sqrt{0 + az^1}^{\frac{1}{2}}$. Quare, $d=1$, $\theta=0$, $e=0$, $f=a$, $\eta=1$, $\lambda=\frac{1}{2}$. Adeoque $r=1$, $s=\frac{1}{2}$, $Q=\frac{1}{a} \times az^{\frac{3}{2}}$, $\pi=0$. Et erit Area quæsitæ $\frac{1}{a} \times az^{\frac{3}{2}}$ in $\frac{1}{1\frac{1}{2}}$; hoc est, $\frac{2}{3} z\sqrt{az}$. Et sic in genere, si ez^{η} ponatur ordinatim Applicata, prodibit Area $\frac{c}{\eta+1} z^{\eta+1}$.

EXEMPLUM II.

Sit ordinatim Applicata $\frac{a^4z}{c^4 - 2ccz + z^4}$. Hæc, per Reductionem, fit $a^4z \times \sqrt[4]{\frac{cc - 2z}{c^4 - 2ccz + z^4}}$; vel etiam $a^4z^{-3} \times \sqrt[4]{-1 + ccz^{-2}}$. In priori casu est $d=a^4$, $\theta=1$, $e=cc$, $f=-1$, $\eta=2$, $\lambda=-2$. Adeoque $r=1$, $s=-1$, $Q=-\frac{a^4}{2} \times \sqrt[4]{cc - 2z}$, hoc est, $-\frac{a^4}{2cc - 2zz}$; $\pi=0$. Et Area Curvæ Q in $-\frac{z^0}{1}$, id est, $-\frac{a^4}{2cc - 2zz}$. In secundo autem casu, est $d=a^4$, $\theta=-3$, $e=-1$, $f=cc$, $\eta=-2$, $\lambda=-2$, $r=1$, $s=-1$, $Q=-\frac{a^4}{2cc} \times \sqrt[4]{-1 + ccz^{-2}}$, id est, $-\frac{a^4zz}{2c^4 - 2cczz}$, $\pi=0$. Et Area $=Q$ in $-\frac{z^0}{1}$, hoc est, $\frac{a^4zz}{2c^4 - 2cczz}$. Area his casibus diversimode exhibetur, quatenus

com-

computatur à diversis finibus, quorum assignatio per hos inventos valores Arearum facilis est.

EXEMPLUM III.

Sit ordinatim Applicata $\frac{a^5}{z^5} \sqrt{bz + z^2}$; hoc est, per Reductionem ad debitam formam, vel $a^5 z^{-\frac{5}{2}} \times \sqrt{bz + z^2}^{\frac{1}{2}}$, vel $a^5 z^{-4} \times 1 + bz^{-1}^{\frac{1}{2}}$. Erit in priori casu $d = a^5$, $\theta = -\frac{5}{2}$, $e = b$, $f = 1$, $\eta = 1$, $\lambda = \frac{1}{2}$. Adeoque $r = -\frac{7}{29}$ &c. Quare, cum r non fit Numerus affirmativus, procedo ad alterum casum. Hic est $d = a^5$, $\theta = -4$, $e = 1$, $f = b$, $\eta = -1$, $\lambda = \frac{1}{2}$. Adeoque $r = 3$, $f = 3 \frac{1}{2}$, $Q = -\frac{a^5}{b} \times 1 + bz^{-1}^{\frac{1}{2}}$, seu, $-\frac{a^5 z + a^5 b}{b z z} \times \sqrt{z z + b z}$, $\pi = -2$. Et Area Q in $\frac{z^{-\frac{1}{2}}}{3 \frac{1}{2}}$ $-\frac{2}{2 \frac{1}{2}} \times \frac{z^{-1}}{3 \frac{1}{2} b} + \frac{1}{1 \frac{1}{2}} \times \frac{z}{2 \frac{1}{2}} \times \frac{z^0}{3 \frac{1}{2} b b}$, hoc est, $= \frac{-30bb + 24bz - 16zz}{105bbz}$, in $\frac{a^5 z + a^5 b}{b z z} \times \sqrt{z z + b z}$.

EXEMPLUM IV.

Sit denique ordinatim Applicata $\frac{b z^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[5]{c^5 - 3accz^{\frac{2}{3}} + 3aacz^{\frac{4}{3}} - a^5 z z}}$. Hæc, ad formam Regulæ reducta, fit $b z^{\frac{2}{3}} \times c - a z^{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{5}}$. Indéque est $d = b$, $\theta = \frac{1}{3}$, $e = c$, $f = -a$, $\eta = \frac{2}{3}$, $\lambda = -\frac{3}{5}$, $r = 2$, $f = \frac{7}{5}$, $Q = -\frac{3b}{2a} \times c - a z^{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{5}}$, $\pi = \frac{2}{3}$. Et Area $Q \times \frac{z^{\frac{2}{3}}}{7} = \frac{5}{2} \times -\frac{5c}{7a}$, id est, $-\frac{30ab z^{\frac{2}{3}} + 75bc}{28aa}$ $\times c - a z^{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{5}}$.

If. Newtoni Opuscula Tom. I.

V v

Quòd,

Quod, si res non successisset in hoc casu, existente r vel Fractione, vel Numero negativo, tunc tentassem alterum casum, purgando Terminum — $ax^{\frac{2}{3}}$ in ordinatim Applicatâ à Coefficiente $x^{\frac{2}{3}}$; hoc est, reducendo ordinatim Applicatam ad hanc formam, $kx - \sqrt[3]{x \times a + cz - \frac{r}{3}} - \frac{r}{3}$. Et, si r in neutro casu fuisset Numerus integer & affirmativus, concludissem Curvam ex earum numero esse, quæ non possunt geometricè quadrari. Nam, quantum animadverto, hæc Regula exhibet in infinitis Æquationibus Areas omnium geometricam Quadraturam admittentium Curvarum, quarum ordinatim Applicatæ constant ex Potestatibus, Radicibus, vel quibuslibet Dignitatibus Binomii cujuscunque; licet non directè, ubi Index Dignitatis est Numerus integer.

At quando hujusmodi Curva aliqua non potest geometricè quadrari; sunt ad manus alia Theoremata pro comparatione ejus cum conicis Sectionibus, vel saltem cum aliis Figuris simplicissimis, quibuscum potest comparari: ad quod sufficit etiam hoc ipsum unicum jam descriptum Theorema, si debite concinnetur.

Pro Trinomiis etiam, & aliis quibusdam Regulas quasdam concinnavi.

Sed in simplicioribus vulgòque celebratis Figuris vix aliquid relatu dignum reperi, quod evasit aliorum conatus, nisi fortè Longitudo Cissoïdis ejusmodi censeatur, Ea sic construitur.

Sit (*Fig. 2.*) V D Cissoïdis, A V Diameter Circuli, ad quem aptatur, V vertex, A F Asymptotos ejus, ac D B perpendiculare quodvis ad A V demissum. Cum semi-axe A F = A V, & semi-parametro A G = $\frac{1}{3}$ A V, describatur Hyperbola F k K; & inter A B & A V sumptâ A C mediâ proportionali, erigantur ad C & V Perpendiculara C k, V K, Hyperbolæ occurrentia in k & K; Et agantur Rectæ K T, k t, tangentes Hyperbolam in eisdem K, & k, & occurrentes A V in T & t, & ad A V constituatur Rectangulum A V N M æquale Spatio T K k t. Et Cissoïdis V D Longitudo erit sextupla Altitudinis V N. Demonstratio perbrevis est. Sed ad infinitas Series redeo.

Quam-

Quamvis multa restent investiganda circa modos approximandi, & circa diversa Serierum genera quæ possunt ad id conducere: tamen vix cum TSCHÜRNHAUSIO speraverim dari posse, aut simpliciora, aut magis generalia fundamenta reducendi Quantitates ad hoc genus Serierum, de quo agimus, quàm sunt Divisiones & Extractiones Radicum, quibus LEIBNITIUS & ego utimur; saltem non generaliora: quia pro Quadraturâ & *ευθύγραμμοις* Curvarum, ac similibus, nullæ possunt dari Series ex hisce simplicibus Terminis algebraicis, (unicam tantum indefinitam Quantitatem involventibus,) constantes, quas non licet hac Methodo colligere. •

Nam, non possunt esse plures convergentes Series ad idem determinandum, quàm sunt indefinitæ Quantitates, ex quarum Potestatibus Series conflentur: & ego quidem ex adhibitâ quacunque indefinitâ Quantitate Seriem novi colligere; & idem credo LEIBNITIO in potestate esse.

Nam, quamvis meâ Methodo liberum sit eligere, pro conflandâ Serie, Quantitatem quamlibet indefinitam, à quâ Quæsitum dependeat; & Methodus, quam ipse nobiscum communicavit, determinata videatur ad electionem talium indefinitarum Quantitatum, quibus opus commodè deduci potest ad Fractiones; quæ per solam Divisionem evadant Series infinitæ: tamen aliæ quæcunque indefinitæ Quantitates pro Seriebus conflandis adhiberi possunt, per Methodum istam, quâ affectæ Æquationes resolvuntur; dummodo resolvantur in propriis Terminis; hoc est, conficiendo Seriem ex solis Terminis, quos Æquatio involvit.

Præterea, non video cur dicatur his Divisionibus & Extractionibus Problemata resolvi *per accidens*: siquidem hæ Operationes eodem modo se habeant ad hoc genus Algebrae, ac vulgares Operationes Arithmeticæ ad Algebram vulgò notam.

Quod autem ad simplicitatem Methodi attinet; nolim Fractiones, & Radicales absque præviâ Reductione semper resolvi in Series infinitas: Sed ubi perplexæ Quantitates occurrunt; tentandæ sunt omnimodæ Reductiones; sive fiat augendo, minuendo, multiplicando, vel dividendo Quantitates indefinitas; sive per Methodum transmutatoriam LEIBNITII, aut alio quocunque modo, qui oc-

currat. Et tunc Resolutio in Series per Divisionem & Extractionem opportunè adhibebitur.

Hic autem præcipuè nitendum est, ut Denominatores Fractionum, & Quantitates in Vinculo Radicum, reducantur ad quàm paucissimas, & minimè compositas; & ad tales etiam, quæ in Seriem abeunt citissimè convergentem, etsi Radices neque convertantur in Fractiones, neque deprimantur. Nam, per Regulam initio alterius Epistolæ, Extractio altissimarum Radicum æquè simplex, & facilis est, ac Extractio Radicis quadraticæ, vel Divisio: & Series, quæ per Divisionem eliciuntur, solent minimè omnium convergere.

Hactenus de Seriebus unicam indefinitam Quantitatem involventibus locutus sum. Sed possunt etiam, perspectâ Methodo, Series ex duabus, vel pluribus assignatis indefinitis Quantitatibus pro arbitrio confici. Quinetiam, beneficio ejusdem Methodi possunt Series ad omnes Figuras efformari, *Gregorianis* ad Circulum & Hyperbolam editis affines; hoc est, quarum ultimus Terminus exhibebit quæsitam Aream. Sed calculum hic onerosiorem nolim lubens subire.

Possunt denique Series ex Terminis compositis eadem Methodo constitui. Quemadmodum, si sit $\sqrt{aa - ax + \frac{x^2}{a}}$ ordinatim Applicata Curvæ alicujus; pono $aa - ax = zz$, & ex Binomio $zz + \frac{x^2}{a}$ extractâ Radice, prodibit $z + \frac{x^2}{2az} - \frac{x^4}{8aaz^3}$ &c. Cujus Seriei omnes Termini quadrari possunt per Theorema jam antè descriptum. Sed hæc minoris facio, quòd ubi Series simplices non sunt satis tractabiles, aliam nondum communicatam Methodum habeo, quâ pro libitu acceditur ad quæsitum.

Ejus fundamentum est commoda, expedita, generalis Solutio hujus Problematis.

Curvam geometricam describere, quæ per data quoscunque Puncta transibit.

Docuit EUCLIDES descriptionem Circuli per tria data Puncta. Potest etiam conica Sectio describi per quinque data Puncta: Et Cur-

va trium Dimensionum per septem data Puncta: adeò ut in potestate habeam descriptionem omnium Curvarum istius ordinis, quæ per septem tantum Puncta determinantur. Hæc statim geometricè fiunt, nullo calculo interposito. Sed superius Problema est alterius generis: & quamvis primâ fronte intractabile videatur, tamen res aliter se habet. Est enim ferè ex pulcherrimis quæ solvere desiderem.

Seriei à LEIBNITIO pro quadraturâ conicarum Sectionum propositæ, affinia sunt Theoremata quædam, quæ pro comparatione Curvarum cum conicis Sectionibus in catalogum dudum retuli.

Possùm utique cum Sectionibus conicis geometricè comparare Curvas omnes, (numero infinities infinitas,) quarum ordinatim Applicatæ sunt.

$$\frac{dz^{n-1}}{e + fz^n + gz^{2n}} \text{ vel } \frac{dz^{2n-1}}{e + fz^n + gz^{2n}}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{dz^{\frac{1}{2}n-1}}{e + fz^n + gz^{2n}} \text{ vel } \frac{dz^{\frac{3}{2}n-1}}{e + fz^n + gz^{2n}}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}} \text{ vel } dz^{n-1} \times \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{dz^{n-1}}{\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}} \text{ vel } \frac{dz^{2n-1}}{\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{dz^{n-1} \times \sqrt{e + fz^n}}{g + bz^n} \text{ vel } \frac{dz^{2n-1} \times \sqrt{e + fz^n}}{g + bz^n}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{dz^{n-1}}{g + bz^n \times \sqrt{e + fz^n}} \text{ vel } \frac{dz^{2n-1}}{g + bz^n \times \sqrt{e + fz^n}}; \&c.$$

$$\text{Aut } \frac{\frac{d}{z} \sqrt{e + fz^n}}{g + bz^n} \text{ vel } dz^{n-1} \frac{\sqrt{e + fz^n}}{g + bz^n}; \&c.$$

V v 3

Hic

Hic d, e, f, g significant quasvis datas Quantitates cum suis signis $+$ & $-$ affectas; z Axem, vel Basem Curvæ; & $n, 2n, \frac{1}{2}n - 1, \frac{3}{2}n - 1, n - 1, 2n - 1$ Indices Potestatum vel Dignitatum z , five sint affirmativi vel negativi, five integri, vel fracti, & singula bina Theoremata sunt duo primi Termini Seriei in infinitum progredientis. In tertio & quarto, $4eg$ debet esse non majus quàm ff , nisi e & g sint contrarii signi. In ceteris nulla est limitatio. Horum aliqua, (nempe, secundum, tertium, quartum, quintum & decimum tertium,) ex Areis duarum conicarum Sectionum conjunctis constant. Alia quædam, (ut nonum, decimum, & duodecimum,) sunt aliter satis composita. Et omnia quidem in continuatione Progressionum citò evadunt compositissima; adeò ut vix per Transmutationem Figurarum, quibus *Jacobus GREGORIUS*, & alii usi sunt, absque ulteriori fundamento inveniri posse putem.

Ego quidem hand quicquam generale in his obtinere potui, antequàm abstraherem à contemplatione Figurarum, & rem totam ad simplicem considerationem solarum ordinatim Applicatarum reducerem. Sed, cum hæc, & hisce generaliora, sint in potestate; non dubitabitur, credo de Binomialibus longè facilioribus, quæ in his continentur, & prodeunt ponendo Litteram aliquam e vel f vel $g = 0$, & $n = 1$ vel 2 ; etsi Series, in quas ista resolvantur, non posuerim in Epistolâ priori, nedum fortè computaverim; intentus, non in omnia particularia enumeranda, sed in illustrandam Methodum per unam & alteram in singulis rerum generibus instantiam, quæ ad ostendendam ejus generalitatem sufficere videbatur.

Ceterùm, hæc Theoremata dant Series plusquàm uno modo.

Nam, primùm, si ponatur $f = 0$, & $n = 1$, evadit $\frac{d}{e + g^{22}}$; unde

prodit Series nobis communicata. Sed, si ponatur $2eg = ff$, & $n = 1$; inde tandem obtinemus hanc Seriem $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} - \frac{1}{15}$; &c. pro Longitudine quadrantalis Arcus,

cūs, cujus chorda est Unitas: Vel, quod perinde est, hanc $\frac{1}{2} + \frac{1}{15}$
 $-\frac{1}{63} + \frac{1}{143} - \frac{1}{255}$, &c. pro Longitudine dimidii ejus. Et
 has fortè, quia æquè simplices sunt ac alteræ, & magis conver-
 gunt, non repudiabitis.

Sed ego rem aliter æstimo. Illud enim melius quod utilius est,
 & Problema minori labore solvit. Sic, quamvis hæc Æquatio x^2

$-x=1$ appareat simplicior hacce $yy - 2y\sqrt{\frac{81}{25}} - \sqrt{20}$
 $= \sqrt{20}$; tamen in confesso est posteriorem reverâ simplicio-
 rem esse, propterea quod Radicem ejus y Geometra facilius eruit.

Et ob hanc rationem, Series pro obtinendis Arcubus Circuli vel,
 (quod eodem recidit,) pro obtinendis Sectoribus conicarum Sec-
 tionum, pro optimis habeo, quæ componuntur ex Potestatibus Si-
 num.

Nam, si quis vellet per simplex computum hujus Seriei $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5}$
 $-\frac{1}{7} + \frac{1}{9}$, &c. colligere Longitudinem Quadrantis ad vigin-
 ti Figurarum. loca decimalia, opus esset 5.000.000.000. Ter-
 minis Seriei, circiter; ad quorum calculum milleni. anni require-
 rentur. Et res tardiùs obtineretur per Tangentem 45 Graduum.
 Sed, adhibito Sinu recto 45 Graduum, quinquaginta quinque vel
 sexaginta Termini hujus Seriei $\sqrt{\frac{1}{2}} \times 1 + \frac{1}{12} + \frac{3}{160} + \frac{5}{896}$, &c.
 sufficerent: quorum computatio tribus, ut opinor, vel quatuor
 diebus absolvi potest.

Et tamen hic non est optimus modus, computandi totam Peri-
 pheriam. Nam, Series ex Sinu recto 30 Graduum, vel Sinu ver-
 so 60 Graduum conflata, multò citiùs dabit Arcum suum; cujus
 sextuplum, vel duodecuplum. est tota Peripheria. Neque majori
 labore eruitur Area totius Circuli ex Segmento, cujus Sagitta est
 Quadrans Diametri. Ejus computi Specimen, siquidem ad manus
 est, visum fuit apponere; & unà adjungere Aream Hyperbolæ,
 quæ eodem calculo prodit.

Posito

Posito Axe transverso $= 1$, & Sinu verso, seu Segmenti Sagittâ $= x$; erit Semi-segmentum

$$\left. \begin{array}{l} \text{Hyperbolæ} \\ \text{Circuli} \end{array} \right\} = x^{\frac{1}{2}} \text{ in } \frac{2}{3}x \pm \frac{xx}{5} - \frac{x^3}{28} \pm \frac{x^4}{72}, \&c.$$

Hæc autem Series sic in infinitum producitur; fit $2x^{\frac{3}{2}} = a$, $\frac{ax}{2} = b$, $\frac{bx}{4} = c$, $\frac{3cx}{6} = d$, $\frac{5dx}{8} = e$, $\frac{7ex}{10} = f$; &c.; Et erit Semi-segmentum

$$\left. \begin{array}{l} \text{Hyperbolæ} \\ \text{Circuli} \end{array} \right\} = \frac{a}{3} \pm \frac{b}{5} - \frac{c}{7} \pm \frac{d}{9} - \frac{e}{11} \pm \frac{f}{13}, \&c.,$$

Eorûmque semi-Summa $\frac{a}{3} - \frac{c}{7} - \frac{e}{11}$, &c. & semi-Differen-

tia $\frac{b}{5} + \frac{d}{9} + \frac{f}{13} +$, &c. His ita præparatis, suppono $x = \frac{1}{4}$,

Quadrantem nempe Axis; & prodit $a (= \frac{1}{4}) = 0,25$; $b (=$

$$\frac{ax}{2} = \frac{0,25}{1 \times 2} = 0,03125; c (= \frac{bx}{4} = \frac{0,03125}{2 \times 2}) = 0,$$

$$001953125; d (= \frac{3cx}{6} = \frac{0,001953125}{8}) = 0,000244140625.$$

Et sic procedo usquedum venero ad Terminum depressissimum, qui potest ingredi opus. Deinde hos Terminos per 3, 5, 7, 9, 11, &c. respectivè divisos dispono in duas Tabulas: ambiguos cum primo in unam; & negativos in aliam; & addo, ut hîc vides;

0,0833333333333333	0,0002790178571429
6250000000000000	34679066051
271267361111	834465027
5135169396	26285354
144628917	961296
4954581	38676
190948	1663
7963	75
352	4
16	0,0002825719389575
1	
0,0896109885646618	

Tunc

Tunc à priori Summâ aufero posteriorem, & restat 0,0893284 166257043, Area semi-Segmenti Hyperbolici. Addo etiam eas Summas, & Aggregatum aufero à primo Terminò duplicato 0,166 666666666666, & restat 0,0767731061630473, Area semi-Segmenti circularis. Huic addo Triangulum istud, quo completur in Sectorem, hoc est, $\frac{1}{32}\sqrt{3}$, seu 0,0541265877365274, & habeo Sectorem sexaginta Graduum, 0,1308995938995747, cujus sextuplum 0,7853981633974482 est Area totius Circuli. Quæ divisa per $\frac{1}{4}$, sive Quadrantem Diametri, dat totam Peripheriam 3,1415926535897928; si alias artes adhibuisssem, potui per eundem Numerum Terminorum Seriei pervenisse ad multò plura loca Figurarum, puta, viginti quinque aut amplius: sed animus fuit hic ostendere, quid per simplex Seriei computum præstari posset. Quod sanè haud difficile est, cùm in omni opere Multiplicatores ac Divisores magnâ ex parte non majores quàm 11, & nunquam majores quàm 41 adhibere opus sit.

Per Seriem LEIBNITII etiam, si ultimo loco dimidium Termini adjiciatur, & alia quædam similia artificia adhibeantur, potest computum produci ad multas Figuras. Ut, & ponendo Sum-

$$\text{mam Terminorum } 1 - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{23} + \frac{1}{25} \\ - \frac{1}{31} + \frac{1}{33}; \text{ \&c. esse ad totam Seriem } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \\ + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} +, \text{ \&c., ut } \sqrt{2} \text{ ad } 2. \text{ Sed optimus ejus usus}$$

videtur esse quando, vel conjungitur cum duabus aliis persimilibus, & citissimè convergentibus Seriebus, vel sola adhibetur ad computandum Arcum 30 Graduum, posita Tangente $\sqrt{\frac{1}{3}}$. Tunc enim

$$\text{Series illa evadit } 1 - \frac{1}{3 \times 3} + \frac{1}{5 \times 9} - \frac{1}{7 \times 27} + \frac{1}{9 \times 81}, \text{ \&c., quæ} \\ \text{citò convergit. Vel, si conjunges cum aliis Seriebus, pone Circul}$$

Diametrum $= 1$, & $a = \frac{1}{2}$; & Area totius Circuli erit Summa
 harum trium serierum $\frac{a^2}{1} - \frac{a^4}{3} + \frac{a^6}{5} - \frac{a^8}{7} + \frac{a^{10}}{9} - \frac{a^{12}}{11} +$
 &c.

$$\frac{a^2}{1} + \frac{a^4}{3} - \frac{a^6}{5} - \frac{a^{10}}{7} + \frac{a^{14}}{9} + \frac{a^{18}}{11}, \text{ \&c.}$$

$$\frac{a^4}{1} - \frac{a^{10}}{3} + \frac{a^{16}}{5} - \frac{a^{22}}{7} + \frac{a^{28}}{9}, \text{ \&c.}$$

Hic consideravimus Series, quatenus adhibentur ad computan-
 dum totum Circulum. Sed, quando computandæ sunt partes ejus,
 tunc quælibet Series habet proprium usum, & in suo genere opti-
 ma est. Si datur Tangens satis parva, vel satis magna, non recur-
 rendum erit ad Sinum aliquem, ut inde computetur Arcus, neque
 vice versa. Series dato congruens est Æquatio pro solvendo pro-
 prio Problemate.

Credo CL. LEIBNITIUM, dum posuit Seriem pro determina-
 tione Co-sinus ex Arcu dato, vix animadvertisse Seriem meam pro
 determinatione Sinus versi ex eodem Arcu; siquidem hæc idem sunt.

Neque observasse videtur morem meum generaliter usurpandi
 Litteras pro Quantitatibus cum signis + & - affectis, dum divi-
 dit hanc Seriem $\frac{z}{b} + \frac{z^2}{2abb} + \frac{z^3}{6aab^2} + \frac{z^4}{24a^2b^3} +$, &c. Nam,,
 cum Area hyperbolica (Fig. 3.) BE, hic significata per z fit affir-
 mativa vel negativa, prout jaceat ex unâ vel alterâ parte ordinatim.
 Applicatæ BC; si Area illa in Numeris data sit l ; & l substituatur in
 Serie pro z , orietur vel $\frac{l}{b} + \frac{ll}{2abb} + \frac{l^3}{6aab^2} + \frac{l^4}{24a^2b^3}$, &c., vel
 $-\frac{l}{b} + \frac{ll}{2abb} - \frac{l^3}{6aab^2} + \frac{l^4}{24a^2b^3}$, &c., prout l sit affirmativa,
 vel negativa; hoc est, posito $a = 1 = b$, & l Logarithmo hy-
 perbolico, Numerus ei correspondens erit $1 + \frac{l}{1} + \frac{ll}{2} + \frac{l^3}{6}$
 $+ \frac{l^4}{24}$, &c., si l sit affirmativus; & $1 - \frac{l}{1} + \frac{ll}{2} - \frac{l^3}{6} + \frac{l^4}{24}$,
 &c., si l sit negativus. Hoc modo fugio Multiplicationem Theo-
 rematum,,

rematum, quæ aliàs in nimiam molem crescerent. Nam, verbi gratiâ illud unicum Theorema, quod supra posui pro Quadraturâ Curvarum, resolvendum esset in triginta duo Theoremata, si pro signorum varietate multiplicaretur.

Præterea, quæ habet Vir clarissimus de inventione Numeri Unitate majoris per datum Logarithmum hyperbolicum, ope Seriei

$$\frac{1}{1} - \frac{11}{1 \times 2} + \frac{1^3}{1 \times 2 \times 3} - \frac{1^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} +, \&c., \text{ potius quàm ope Seriei } \frac{1}{1} + \frac{11}{1 \times 2} + \frac{1^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4}, \&c., \text{ nondum perci-}$$

pio. Nam, si unus Terminus adjiciatur ampliùs ad Seriem posteriorem, quàm ad priorem, posterior magis appropinquabit. Et certè minor est labor computare unam vel duas primas Figuras adjecti hujus Terminì, quàm dividere * Unitatem per Numerum prodeuntem ex Logarithmo hyperbolico ad multa Figurarum loca extensum, ut inde habeatur Numerus quæsitus Unitate major. Utraque igitur Series, (si duas dicere fas sit,) officio suo fungatur.

Potest tamen $\frac{1}{1} + \frac{1^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}, \&c.,$ Series, ex

dimidiâ parte Terminorum constans, optimè adhiberi; siquidem hæc dabit semi-Differentiam duorum Numerorum, ex quâ, &

Rectangulo dato uterque datur. Sic, & ex Serie $1 + \frac{11}{1 \times 2} +$

$$\frac{1^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4}, \&c., \text{ datur semi-Summa Numerorum, indéque etiam}$$

Numeri. Unde prodit Relatio Serierum inter se, quâ ex unâ datâ dabitur altera.

Theorema de inventione Arcûs ex dato Co-sinu ponendo Ra-

dium = 1, Co-sinum = c , & Arcum = $\sqrt{6 - \sqrt{24c + 12}}$; mi-

nus appropinquat quàm primâ fronte videtur. Posito quidem Sinu

X x 2

verso

* Hæc Epistola habetur etiam in WALLISII Operibus Mathematicis Tom. III. pag. 634. Ibi autem legitur, quàm dividere Unitatem per prodeuntem Logarithmum hyperbolicum ad multa Figurarum loca extensum, ut inde habeatur Logarithmus hyperbolicus quæsitus.

verso = v , error erit $\frac{v^3}{90} + \frac{v^4}{194} + \&c.$ Potest fieri, ut 120

— 27 v ad 120 — 17 v , ita Chorda ($\sqrt{2v}$) ad Arcum; & error

erit tantum $\frac{61v^3\sqrt{2v}}{44800}$, circiter; qui semper minor est quam $\frac{1}{4}$

Minuta secunda, dum Arcus non fit major quam 45° Grad. Et singulis etiam bisectionibus diminuitur 128 vicibus.

$$\text{Series } \frac{a^3}{1 \times 2 \times 3} - \frac{a^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \frac{a^7}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} - \&c.$$

applicari posset ad computationem Tabulæ Segmentorum, ut observat Vir Clarissimus; sed res optimè absolvitur per Canonem Sinuum. Utpote, cognita Quadrantis Areâ, per continuam Additionem nonæ partis ejus, habebis Sectores ad singulos decem Gradus in Semicirculo: deinde per continuam Additionem decimæ partis hujus, habebis Sectores ad gradus; & sic ad decimas partes Graduum, & ultra procedi potest. Tunc, Radio existente = 1, ab unoquoque Sectore & ejus Complemento ad 180 Gradus, aufer dimidium communis Sinus recti, & relinquentur Segmenta in Tabulam referenda. Ceterum, quamvis Series hæc non profint, in aliis tamen locum obtinent: Et quoniam hoc ad earum usum spectat, non gravabor in aliquibus attingere.

Constructionem Logarithmorum non aliunde peti debere credetis: fortè, ex hoc simplici processu, qui ab istis pendet. Per Methodum supra traditam quærantur Logarithmi hyperbolici numerorum 10; 0, 98; 0, 99; 1, 01; 1, 02: id, quod fit spatio unius & alterius horæ. Dein, divisis Logarithmis quatuor posteriorum per Logarithmum Numeri 10, & addito Indice 2, prodibunt veri Logarithmi Numerorum 98; 99; 100; 101; 102; in Tabulam referendi. Hi per dena Intervalla interpolandi sunt, & exhibunt Logarithmi omnium Numerorum inter 980, & 1020: & omnibus inter 980, & 1000 iterum per dena Intervalla interpolatis, habebitur Tabula eatenus constructa. Tunc ex his colligendi erunt Logarithmi omnium primorum Numerorum, & eorum multiplicium, minorum quam 100: ad quod nihil requiritur præter Additionem

&c.

& Subtractionem. Siquidem, fit $\sqrt[10]{\frac{9984 \times 1020}{9945}} = 2$; $\sqrt[8]{\frac{8 \times 9963}{984}} = 3$; $\frac{10}{2} = 5$; $\sqrt{\frac{98}{2}} = 7$; $\frac{99}{9} = 11$; $\frac{1001}{7 \times 11} = 13$; $\frac{102}{6} = 17$;
 $\frac{988}{4 \times 13} = 19$; $\frac{9936}{16 \times 27} = 23$; $\frac{986}{2 \times 17} = 29$; $\frac{992}{32} = 31$; $\frac{999}{27} = 37$;
 $\frac{984}{24} = 41$; $\frac{989}{23} = 43$; $\frac{987}{21} = 47$; $\frac{9911}{11 \times 17} = 53$; $\frac{9971}{13 \times 13} = 59$;
 $\frac{9882}{2 \times 81} = 61$; $\frac{9849}{3 \times 49} = 67$; $\frac{994}{14} = 71$; $\frac{9928}{8 \times 17} = 73$;
 $\frac{9954}{7 \times 18} = 79$; $\frac{996}{12} = 83$; $\frac{9968}{7 \times 16} = 89$; $\frac{9894}{6 \times 17} = 97$. Et ha-

bitis sic Logarithmis omnium Numerorum minorum quàm 1000. restat tantum hos etiam semel atque iterum per dena intervalla interpolare.

Constructionis Tabulæ Sinum, à quâ pendet tota res Trigonometrica, fundamentum optimum est. continua Additio dati Anguli ad seipsum vel ad alium datum. Utpote, in Angulo (*Fig. 4.*) addendo BAE, inscribantur HI, IK, KL, LN, MN, NO, OP, &c., æquales Radio AB, & ad opposita Latera demittantur perpendiculares BE, HQ, IR, KS, LT, MV, NX, OY, &c. Et Angulorum HIQ, IKH, KLI, LMK, &c., differentiæ erunt. Angulus A, Sinus HQ, IR, KS &c., & Co-sinus IQ, KR, LS, &c. Detur jam aliquis eorum LMK, & ceteri sic eruentur. Ad SV, & MV, demitte Perpendicularia Ta & Kb; &, (propter similia Triangula ABE, TL_a; KM_b, ALT, AMV, &c.;) erit AB. BE :: TL. L_a (= $\frac{SL - LV}{2}$) :: KT (= $\frac{1}{2}$ KM).
 $\frac{1}{2}$ Mb (= $\frac{MV - KS}{2}$). Et AB. AE :: KT. S_a (= $\frac{SL + LV}{2}$)
 :: TL. T_a (= $\frac{KS + MV}{2}$). Unde dantur Sinus & Co-sinus KS,

Xx. 3

MV,

MV, SL, LV. Et simul patet ratio continuandi Progreſſiones. Nempe, AB. $2AE :: LV. TM + MX :: MX. VN + NY$, &c. $:: MV. TL + XN :: XN. MV + OY$, &c.; vel AB. $2BE :: LV. XN - TL :: MV. TM - MX :: MX. OY - MV :: XN. VN - NY$, &c. Et retrò AB. $2AE :: LS. KT + RK$, &c. Pone ergo $AB = 1$, & fac $BE \times TL = La$; $AE \times KT = Sa$; $Sa - La = LV$; $2AE \times LV - TM = MX$, &c. fed nodus eſt inventio Sinûs & Co-finûs Anguli A. Et hîc ſubveniunt Series noſtræ. Utpote, cognitâ ex ſuperioribus quadrantalîs Arcûs Longitudine 1, 57079, &c., & ſimul Quadrato ejus 2, 4694, &c., divide Quadratum hoc per Quadratum Numeri exprimentis Rationem nonaginta Graduum ad Angulum A; &, Quoto dicto 2, tres vel quatuor Termini hujus Seriei $1 - \frac{2}{2} + \frac{22}{24} - \frac{2^3}{720} + \frac{2^4}{40320}$, &c., dabunt Co-finum iſtius Anguli A. Sic, primò quæri poteſt Angulus quinque Graduum, & inde Tabula computari ad quinos Gradus; ac deinde interpolari ad Gradus vel dimidios Gradus per eandem Methodum. Nam, non convenit progredi per nimios ſaltus. Duæ tertiæ partes Tabulæ, ſic computatæ, dant reliquam tertiam partem, per Additionem vel ſubtractionem, more noto. Siquidem, poſito KT Co-finu ſexaginta Graduum, ſit $AE = SV$, & $BE = Mb$. Tunc ad decimas & centeſimas partes Graduum pergendum eſt per aliam Methodum: ſubſtitutis tamen priùs Logarithmis Sinuum inventorum, ſi ejus generis Tabula deſideretur.

Ad computum Tabularum aſtronomicarum KEPLERI, poſui fundamentum aliquod in alterâ Epiſtolâ. Ejus Seriei tres primi Termini, & aliquando duo ſufficiunt. Sed ad diverſas partes Ellipſeos diverſæ ejuſmodi Series aptari debent. Vel potiùs tales Series computandæ ſunt, quæ ex datâ Areâ Sectoris elliptici BGE, immediate exhibeant Aream Sectoris Circuli, cujus Angulus eſt BEG, Radius CB. Et habitis hiſce, computum earum ad duos, tres, aut fortè quatuor Terminos, beneficio Logarithmorum, haud gravius erit quàm ſolita Reſolutio tot Triangulorum in aliis hypotheſibus: Imò fortè minus grave, ſi Series priùs debite concinnentur; ſiquidem unus Logarithmus è Tabulâ petitus determinet omnes iſtos Ter-

Terminos, addendo ipsum & ejus multiplices ad Logarithmos datarum Coefficientium in promptu habitos.

Quæ de hoc genere Tabularum dicuntur, ad alias transferri possunt, ubi ratiocinia Geometrica, locum non obtinent. Sufficit autem per has Series computare triginta, vel viginti, aut fortè pauciores Terminos Tabulæ in debitis distantis: siquidem Termini intermedii. facillè interfuerunt per Methodum quandam, quam in usum Calculatorum ferè hic descripsissem; Sed pergo ad alia.

Quæ Cl. LEIBNITIUS à me desiderat explicanda, ex parte supra descripsi. Quod verò attinet ad inventionem Terminorum p , q , r in Extractione Radicis affectæ: primùm p sic eruo. Descripto Angulo recto BAC, Latera ejus BA, CA, divido in partes æquales; & inde Normales erigo distribuentes Angulare spatium in æqualia Parallelogramma, vel Quadrata,

B.

x^5	x^4y	x^3y^2	x^2y^3	xy^4	y^5	x^3y^6	x^2y^7
x^4	x^3y	x^2y^2	xy^3	y^4	x^4y^5	x^3y^6	x^2y^7
x^3	x^2y	xy^2	y^3	x^3y^4	x^2y^5	xy^6	y^7
xx	xy	y^2	xxy^3	xy^4	$xxxy^5$	xy^6	xy^7
x	xy	xy^2	xy^3	xy^4	xy^5	xy^6	xy^7
o	y	yy	y^3	y^4	y^5	y^6	y^7

A.

C

quæ concipio denominata esse à Dimensionibus duarum indefinitarum Specierum, puta, x , & y regulariter ascendentium à Termino A; prout vides in Figurâ superiore, inscriptas. Ubi y denotat Radicem extrahendam; & x alteram indefinitam Quantitatem, ex cujus Potestatibus Series conficienda est. Deinde, cùm Æquatio aliqua proponitur, Parallelogramma singulis ejus Terminis correspondentia insignio notâ aliquâ; & Regulâ ad duo, vel fortè plura, ex insignitis Parallelogrammis applicatâ, (quorum unum sit humillimum in Columnâ sinistrâ juxta AB, & alia ad Regulam dextrorsum sita, ceteraque omnia non contingentia Regulam supra eam jaceant,) seligo Terminos Æquationis per Parallelogramma contin-

tingentia Regulam designatos, & inde quæro Quantitatem Quotientis addendam.

Sic, ad extrahendam Radicem y , ex $y^6 - 5xy^5 + \frac{x^2}{2}y^4 - 7aaxxyy + 6a^3x^3 + 6bx^4 = 0$; Parallelogramma hujus Terminis respondentia signo notâ aliquâ *; ut vides in Fig. quintâ. Dein applico Regulam DE ad inferiorem è locis signatis in sinistra Columnâ; eamque ab inferioribus ad superiora dextrorsum gyrare facio, donec alium similiter, vel fortè plura è reliquis signatis locis, coeperit attingere. Videoque loca sic attacta esse x^3 , $xxyy$, & y^6 . Et Terminis itaque, $y^6 - 7aaxxyy + 6a^3x^3$, tanquam nihilo æqualibus, (& insuper, si placet, reductis ad $v^6 - 7vv + 6 = 0$, ponendo $y = v\sqrt{ax}$,) quæro valorem y , & invenio quadruplicem, $+\sqrt{ax}$, $-\sqrt{ax}$, $+\sqrt{2ax}$, & $-\sqrt{2ax}$, quorum quemlibet pro primo Termino Quotientis accipere licet, prout è Radicibus quampiam extrahere decretum est.

Sic, Æquatio $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$, quam resolvebam in priori Epistolâ, dat $-2a^3 + aay + y^3 = 0$, & inde $y = a$, proximè: Cùm itaque a sit primus Terminus valoris y , pono p pro ceteris omnibus in infinitum, & substituo $a + p = y$, (Obvenient hîc aliquando difficultates nonnullæ; sed ex iis, credo, LEIBNITIUS se proprio Marte extricabit.) Subsequentes verò Termini q , r , s , &c., eodem modo ex Æquationibus secundis, tertiis, ceterisque eruuntur, quo primus p è primâ, sed curâ leviori; quia ceteri valores y solent prodire dividendo Terminum involventem infimam Potestatem indefinitæ Quantitatis x per Coefficientem Radicis p , q , r , aut s .

Intellèxti, credo, ex superioribus, regressionem ab Areis Curvarum ad Lineas rectas, fieri per hanc Extractionem Radicis affectæ. Sed duo alii sunt modi, quibus idem perficio.

Eorum unus affinis est computationibus, quibus colligebam approximationes sub finem alterius Epistolæ, & intelligi potest per hoc Exemplum. Proponatur Æquatio ad Aream Hyperbolæ $z = x$

$$+ \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5, \text{ \&c. Et, partibus ejus multiplicatis}$$

tiplicatis in fe , emerget $zx = xx + x^3 + \frac{11}{12}x^4 + \frac{5}{6}x^5$, &c.
 $x^3 = x^3 + \frac{3}{2}x^4 + \frac{7}{4}x^5$, &c.; $z^4 = x^4 + 2x^5$, &c.; $z^5 = x^5$,
 &c. Jam, de z aufero $\frac{1}{2}zx$, & restat $z - \frac{1}{2}zx = x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{24}x^4 - \frac{13}{60}x^5$, &c. Huic addo z^3 , & fit $z - \frac{1}{2}zx + \frac{1}{6}z^3 = x + \frac{1}{24}x^4 + \frac{3}{40}x^5$, &c. Aufero $\frac{1}{24}z^4$, & restat
 $z - \frac{1}{2}zx + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 = x - \frac{1}{120}x^5$, &c. Addo
 $\frac{1}{120}z^5$, & fit $z - \frac{1}{2}zx + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5 = x$ quam-
 proximè; five $x = z - \frac{1}{2}zx + \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$, &c.

Eodem modo, Series de unâ indefinitâ Quantitate in aliam transferri possunt. Quemadmodum si posito r Radio Circuli, x Sinu recto Arcûs z , & $x + \frac{x^3}{6rr} + \frac{3x^5}{40r^4} + \text{&c.}$ Longitudine Arcûs istius; atque hanc Seriem à Sinu recto ad Tangentem vellem transferre; Quæro Longitudinem Tangentis $\frac{rx}{\sqrt{rr - xx}}$, & reduco in infinitam Seriem $x + \frac{x^3}{2rr} + \frac{3x^5}{8r^4} + \text{&c.}$ Vocetur hæc Quantitas $= t$. Colligo Potestates ejus $t^3 = x^3 + \frac{3x^5}{2rr}$, &c.; $t^5 = x^5 + \text{&c.}$ Aufero autem t de z , & restat $z - t = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{10}x^5 - \text{&c.}$ Addo $\frac{1}{3}t^3$, & fit $z - t + \frac{1}{3}t^3 = \frac{1}{5}x^5 + \text{&c.}$ Aufero $\frac{1}{5}t^5$, & restat $z - t + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{5}t^5 = 0$, quamproximè. Quare est $z = t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 - \text{&c.}$ Sed, siquis in usus

trigonometricos me jussisset exhibere expressionem Arcûs per Tangentem; eam non hoc circuitu, sed directâ Methodo quæsissem.

Per hoc genus computi colliguntur etiam Series ex duabus vel pluribus indefinitis Quantitatibus constantes; & Radices affectarum Æquationum magnâ ex parte extrahuntur. Sed ad hunc posteriorem usum adhibeo potius Methodum in alterâ Epistolâ descriptam, tanquam generaliorem, & (Regulis pro Elisione superfluatorum Terminorum habitis,) paulò magis expeditam.

Pro Regressione verò ab Areis ad Lineas rectas, & similibus, possunt hujusmodi Theoremata adhiberi.

T H E O R E M A I.

Sit $z = ay + byy + cy^3 + dy^4 + ey^5$, &c.

Et vicissim erit $y = \frac{z}{a}$

$$- \frac{b}{a^3} z z$$

$$+ \frac{2bb - ac}{a^5} z^3$$

$$+ \frac{5abc - 5b^3 - aad}{a^7} z^4$$

$$+ \frac{3aacc - 21abbc + 6aabd + 14b^4 - a^2e}{a^9} z^5 + \&c.$$

Exempli gratiâ. Proponatur Æquatio ad Aream Hyperbolæ;
 $z = y - \frac{1}{2} yy + \frac{1}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4 + \frac{1}{5} y^5$, &c. Et, substitutis in Regulâ 1. pro a , $-\frac{1}{2}$ pro b , $\frac{1}{3}$ pro c , $-\frac{1}{4}$ pro d , & $\frac{1}{5}$ pro e ; vicissim exurgit, $y = z + \frac{1}{2} z z + \frac{1}{6} z^3 + \frac{1}{24} z^4 + \&c.$

T H E O-

THEOR. II.

Sit $z = ay + by^3 + cy^5 + dy^7 + ey^9, + \&c.$ Et vicissim

$$\text{erit } y = \frac{z}{a}$$

$$- \frac{b}{a^3} z^3$$

$$+ \frac{3bb - ac}{a^7} z^5$$

$$+ \frac{8abc - aad - 12b^3}{a^{10}} z^7$$

$$+ \frac{55b^4 - 55abbc + 10aabd + 5aacc - a^5e}{a^{13}} z^9, + \&c.$$

Exempli gratiâ. Proponatur Æquatio ad Arcum Circuli $z = y + \frac{y^3}{6rr} + \frac{3y^5}{40r^4} + \frac{5y^7}{112r^6}, \&c.$, Et, substitutis in Regulâ, i pro a ; $\frac{1}{6rr}$ pro b ; $\frac{3}{40r^4}$ pro c ; $\frac{5}{112r^6}$ pro d ; &c. orietur $y = z - \frac{z^3}{6rr} + \frac{z^5}{120r^4} - \frac{z^7}{5040r^6} + \&c.$

Alterum modum regrediendi ab Arcis ad Lineas rectas celare statui.

Ubi dixi omnia penè Problemata solubilia existere, volui de iis præsertim intelligi, circa quæ Mathematici se hætenus occuparunt, vel, faltem, in quibus ratiocinia mathematica locum aliquem obtinere possunt. Nam, alia sanè adeò perplexis conditionibus implicata excogitare liceat, ut non fatis comprehendere valeamus; & multò minùs tantarum computationum onus sustinere, quod ista requirerent.

Y y 2

Attamen.

Attamen, ne nimum dixisse videar, inverſa de Tangentibus Problemata ſunt in poteſtate, aliâque illis difficiliora. Ad quæ reſolvenda uſus ſum duplici Methodo; unâ concinniori, alterâ generali. Utramque viſum eſt in præſentiâ litteris tranſpoſitis conſignare, ne propter alios idem obtinentes, inſtitutum in aliquibus mutare cogerer * *ſaccda 10effh 12i4l3m 10n6oqq7s 11t 10u3x: 11ab 3cdd 10eag 10ill4m7n6o3p3q6r5s 11t 7ux, 3aca 4egh 6i4l4m5n8oq4r3s6t.4u, aadda eeeee iii mm nn oo p rrr sssss tt uu.*

Inverſum hoc Problema de Tangentibus, quando Tangens inter Punctum Contactûs, & Axem Figuræ eſt datæ Longitudinis, non indiget his Methodis. Eſt tamen Curva illa mechanica, cujus determinatio pendet ab Areâ Hyperbolæ.

Ejuſdem generis eſt etiam Problema, quando pars Axis inter Tangentem, & Ordinatim applicatam datur Longitudine.

Sed hoſ caſus vix numeraverim inter † Ludos Naturæ. Nam, quando in Triangulo Rectangulo, quod ad illâ Axis parte, & Tangente, ac Ordinatim applicatâ conſtituitur, ratio duorum quorumlibet Laterum per Æquationem quamlibet deſinitur, Problema ſolvi poteſt abſque meâ Methodo generali: Sed, ubi pars Axis ad Punctum aliquod poſitione datum terminata ingreditur Vinculum, tunc res aliter ſe habere ſolet.

Communicatio Reſolutionis affectarum Æquationum per Methodum LEIBNITII pergrata erit; juxta & explicatio quomodo ſe gerat, ubi Indices Poteſtatum ſunt Fractiones; ut in hac Æquatione, $20 + x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{2}{3}} \S - y^{\frac{7}{11}} = 0$, aut ſurdæ Quantitates, ut in

hac

* Id eſt; Una Methodus conſiſtit in Extraſtione ſuæ Quantitatis ex Æquatione ſimul involvente Fluxionem ejus. Altera tantum in aſſumptione Seriei pro Quantitate quâlibet incognitâ, ex quâ cetera commodè derivari poſſunt, & in collatione Terminorum homologorum Æquationis reſultantis ad evadendos Terminos aſſumptæ Seriei.

† Vide ſupra Opusculo hoc Art. 1. pag. 326.

§ In Walliſii Operibus mathematicis Tom. III. pag. 645 habetur pro hoc Terminò — $x^{\frac{6}{5}} y^{\frac{2}{3}}$.



44

hac $x^{\sqrt{2} + x^{\sqrt{7}}} \big| \sqrt[3]{x^2} = y$; ubi $\sqrt{2}$, & $\sqrt{7}$, non designant
Coefficients ipsius x , sed Indices Potestatum, aut Dignitatum ejus;
& $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ Indicem Dignitatis Binomii $x^{\sqrt{2}} + x^{\sqrt{7}}$. Res, credo,
mea Methodo patet; aliter descripsissem.

Sed meta tandem prolixæ huic Epistolæ ponenda est. Litteræ fa-
nè excellentissimi LEIBNITII valdè dignæ erant, quibus fusiùs
hoc responsum darem. Et volui hac vice copiosior esse, quia credi-
di amoeniora tua negotia severiori hoc scribendi genere non debere
à me crebrò interpellari.

Tui Studiosissimus

Is. NEWTON.

Yy 3

OPUSCU

OPUSCULUM XII.

FRAGMENTUM EPISTOLÆ
ISAACI NEWTONI

A D

COLLINSIUM.

A. D. 8. Novembr. 1676.

Nulla extat Curva, cujus Æquatio ex tribus constat Terminis, in quâ, licet Quantitates incognitæ se mutuò afficiant, vel Indices Dignitatum sint surdæ Quantitates, (verbi gratiâ, $ax^{\lambda} + bx^{\mu}y^{\sigma} + cy^{\tau} = 0$, ubi x designat Basim; y Ordinatam; $\lambda, \mu, \sigma, \tau$, Indices Dignitatum ipsius x , & y ; & a, b, c Quantitates cognitæ unâ cûm signis suis $+$, vel $-$,) nulla, inquam, hujusmodi est Curva, de quâ, an quadrari possit, nec-ne, vel quænam sint Figuræ simplicissimæ, quibuscum comparari possit, sive sint conicæ Sectiones, sive aliæ magis complicatæ, intra horæ octantem respondere non possim. Deinde Methodo directâ, & brevi, imò Methodorum omnium generalium brevissimâ, eas comparare queo. Quin etiam, si duæ quævis Figuræ per hujusmodi Æquationes expressæ proponantur, per eandem Regulam, eas, modò comparari possint, comparo.

Affirmatio, quidem, videri potest temeraria, propterea quod perdifficile sit dictu, an Figura quadrari, vel cum aliâ comparari possit, nec ne; mihi autem manifestum est ex eo, unde deduxi, fonte; quanquam id aliis demonstrare in me suscipere nollem. Eadem Methodus Æquationes quatuor Terminorum, aliâque complectitur, haud tamen adeo generaliter.

OPUS-

OPUSCULUM XIII
EXCERPTUM
EX
DUABUS EPISTOLIS
ISAACI NEWTONI
A D
JOHANNEM WALLISIUM



E X C E R P T U M

E X

D U A B U S E P I S T O L I S

A B

ISAACO NEWTONO

A D

JOHANNEM WALLISIUM

Datis A. D. 27. Augusti & 17. Septembris 1692.

J Amque † (NEWTONUS) in Litteris ad me datis Aug. 27 ; & Sept. 17. 1692, scribit Progressiones esse horum Theorematum, (de Curvis quadrandis) in infinitum pergentes ; quæ tamen omnia in hujusmodi Theorematis generalioribus comprehendi possunt.

Wallis.
Oper.
Math.
Tom. II.
pag. 391.

Si Curvæ Abscissa sit $= z$ & pro Terminis hujus Seriei $a + bz^n + cz^{2n} + dz^{3n} + \text{etc.}$ hujusque $e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n} + \text{etc.}$ vel pro eorum quotlibet, scribantur Q & R respectivè ; nempe, Q pro primis, & R pro secundis ; Sit autem Ordinatum applicata $z^{p-1} \times QR^{q-1}$, & ponatur $\frac{\theta}{z} = r; r + \lambda = s; s + \lambda = t; t + \lambda = u$ &c. erit Area Curvæ

† Harum Epistolarum, quod scire potuerim, exemplar vulgatum non est ; sed hoc excerptum exhibuit WALLISIUS plerumque suis (NEWTONI scilicet) verbis. Vide Elenchum contentorum Tom. II. pag. 3. sub Num. XCV.

If. Newtoni Opuscula, Tom. I

Zz

z⁰ R^λ

$$\begin{aligned}
& x^0 R^\lambda \text{ in } \frac{\frac{1}{\eta} a}{re} \\
& + \frac{\frac{1}{\eta} b - sfA}{r + 2 \times e} x^\eta \\
& + \frac{\frac{1}{\eta} c - \frac{1}{1} fB - tgA}{r + 2 \times e} x^{2\eta} \\
& + \frac{\frac{1}{\eta} d - \frac{1}{2} fC - \frac{1}{1} gB - v hA}{r + 3 \times e} x^{3\eta} \\
& + \&c.
\end{aligned}$$

Ubi A, B, C, &c. denotant Coefficientes datas Terminorum. Se-
necum signis suis, nempe.

A primi Termini Coefficientem. $\frac{\frac{1}{\eta} a}{re}$,

B secundi Coefficientem $\frac{\frac{1}{\eta} b - sfA}{r + 1 \times e}$, & sic deinceps.

Quâ Methodo in hujusmodi Series incidit, minimè explicuit.
Eandem tamen litteris quibusdam celavit, quæ recto ordine disposi-
te conficiunt hanc sententiam, *Data Equatione, Fluente quot-
cunque Quantitates involvente, Fluxiones invenire: & vice versâ.*
Per *Fluentes Quantitates* intelligit indeterminatas, id est, quæ in
generatione Curvarum per Motum localem perpetuò augentur vel
diminuuntur; & per earum *Fluxionem* intelligit Celeritatem Incre-
menti vel Decrementi. Nam, quamvis *Fluentes Quantitates* & ea-
rum *Fluxiones* primâ fronte conceptu, difficiles videantur, (solent
enim.

enim nova difficilius concipi,) earundem tamen notionem citò faciliorem evasuram putat, quàm sit notio *Momentorum* aut *partium minimarum* vel *differentiarum infinitè parvarum*; propterea quòd Figurarum & Quantitatum generatio per Motum continuum magis naturalis est, & facilius concipitur, & Schemata in hac Methodo solent esse simpliciora, quàm in illà partium. Attamen, non negligit Theoriam talium partium, sed eà etiam utitur, quoties ipsa, vel opus brevius reddit, & magis perspicuum, vel ad rimandas Fluxionum proportionem conducit. Abscissam Curvæ, aliàmve aliquam Quantitatem Fluentem, uniformiter augeri supponit, & pro ejus Fluxione Unitatem ponit; pro reliquis autem Quantitatibus Fluentibus ipsas ponit Quantitates Punctis notatas in hunc modum. Sint v, x, y, z Fluente Quantitates, & earum Fluxiones his Notis $\dot{v}, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$, designabuntur respectivè. Et, quoniam hæ Fluxiones sunt etiam indeterminatæ Quantitates, & perpetuà mutatione redduntur majores, vel minores, considerat velocitates, quibus augentur, vel diminuuntur, tanquam earum Fluxiones, & Punctis binis notat in hunc modum $\ddot{v}, \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}$, & perpetuum Incrementum, vel Decrementum harum Fluxionum considerat ut ipsarum Fluxiones, & Punctis ternis sic notat $\dddot{v}, \dddot{x}, \dddot{y}, \dddot{z}$, & harum Fluxiones Punctis quaternis sic $\ddddot{v}, \ddddot{x}, \ddddot{y}, \ddddot{z}$. Quà Ratione \dot{v} est Fluxio Quantitatis v , & \ddot{v} Fluxio ipsius \dot{v} , & \dddot{v} Fluxio ipsius \ddot{v} . Et, si Quantitates Fluente, vel fractæ sunt vel surdæ, Fluxiones earum sic notat, Quantitatum $\frac{yy}{b - x}$, & $\sqrt{aa - xx}$, Fluxiones sunt $\frac{\dot{y}\dot{y}}{b - x}$ & $\frac{\dot{y}\dot{y}}{\sqrt{aa - xx}}$, & harum Fluxiones sunt $\frac{\ddot{y}\ddot{y}}{b - x}$ & $\frac{\ddot{y}\ddot{y}}{\sqrt{aa - xx}}$ & sic porrò. His autem expositis, Methodum suam in Propositione hacce problematica fundat.

PROBL. I.

*Datæ Equationes Fluente quotcunque Quantitates involvente,
invenire Fluxiones.*

SOLUTIO.

Multiplicetur quilibet Equationis Terminus separatim per Indices singulos Dignitatum. Quantitatum omnium Fluentium, quæ in Terminis illo continentur; & in singulis Multiplicationibus mutetur Latus unum Dignitatis in ejus Fluxionem; & Aggregatum Productorum omnium sub propriis signis componet Equationem novam, quæ Relationem Fluxionum involvet.

EXPLICATIO.

Sint a, b, c, d , &c. Quantitates determinatæ & immutabiles; & proponatur Æquatio quævis Quantitates Fluente x, y, z , &c. involvens, puta, $x^3 - xyy + aaz - b^3 = 0$. Multiplicentur Termini primò per Indices Dignitatum ipsius x in ipsis contentarum respective; & in quâlibet Multiplicatione pro uno Latere Dignitatis, (hoc est, pro x unius Dimensionis) scribatur x & Summa Productorum erit $3xxx - xyy$. Idem fiat in y , & producetur $-2xyy$. Idem fiat in z , & producetur $+aaz$. Summa Productorum omnium æquetur nihilo; & habebitur Æquatio $3xxx - xyy - 2xyy + aaz = 0$. Dico, quòd hæc erit Æquatio Relationem Fluxionum involvens.

DEMONSTRATIO.

Sit enim, o Quantitas infinitè parva, & sint ox, oy, ax synchrona Momenta, seu Incrementa momentanea, Quantitatum fluentium x, y , & z ; & hæ Quantitates proximo Temporis momento

to per accessum Incrementorum momentaneorum evadent $z + oz$, $y + oy$, $x + ox$; quæ in Æquatione primâ pro z , y , & x , scriptæ, dant hanc Æquationem. $x^3 + 3xxox + 3xoox + 3x^2$
 $a^3 - xyy - xoyy - 2xoyy - 2xooyy + xooyy + x^2oyy$
 $+ aax + aaoz - b^3 = 0$. Subduc Æquationem primam, &
 residuum divisum per o erit $3xxx + 3x^2ox + x^2oo - xyy$
 $- 2xyy - 2xoyy + xoyy + xooyy + aax = 0$. Ter-
 minos multiplicatos per o , tanquam infinitè parvos, dele, & ma-
 nebit Æquatio. $3xxx - xyy - 2xyy + aax = 0$. Q.E.D.

Simili Methodo Æquatio $x^3 - xyy + aa\sqrt{ax} - yy - b^3 = 0$.
 Evadit $3xxx - xyy - 2xyy + aa\sqrt{ax} - yy = 0$. Ubi,

si Fluxionem $\sqrt{ax} - yy$ eliminare velis, pone $\sqrt{ax} - yy$
 $= z$, & per consequens $ax - yy = zz$, & Propositio da-
 bit $ax - yy = 2zz$ id est, $\frac{ax - yy}{2z} = z$ seu $\frac{ax - yy}{2\sqrt{ax} - yy}$

$= \sqrt{ax} - yy$. Et inde Æquatio primò inventa fit. $3xxx$
 $- xyy - 2xyy + \frac{a^3x - 2aayy}{2\sqrt{ax} - yy} = 0$.

Et eadè Methodò pergere licet ad Fluxiones secundas ac ter-
 tias. Ponatur Æquatio $zy^3 - z^4 + a^3 = 0$, & Propositio inde da-
 bit $zy^3 + 3zyyy - 4zz^3 = 0$, & hæc Æquatio, per operatio-
 nem repetitam, evadet $zy^3 + 6zyyy + 3zyyy + 6zyyy -$
 $4zz^3 - 12zzzz = 0$; & sic deinceps.

Ut applicetur hæc Methodus ad Quadraturam Curvarum, NEW-
 TONUS pro Fluxione Abscissæ, uniformi positâ, Unitatem assumit;
 & Ordinatam ponit pro Fluxione Areæ; deinde Relationem inter

Zz. 3j

Abscis-

Abscissam & Aream per Æquationem quamvis assumptam definit; & inde colligendo earum Fluxiones obtinet Æquationem novam, quâ Relatio inter Abscissam & Ordinatam definitur; & tum demum ad quadrandas Curvas efficit, ut hæc Æquatio formam quamvis desideratam acquirat. Et hac Methodo dicit se computo brevissimo & facillimo Theoremata supra posita invenisse. Sed & eadem Methodo comparat diversas Curvas inter se, ponendo, scilicet, earum Ordinatas Fluxionibus Abscissarum reciproce proportionales.

Sub finem Epistolæ anni 1676 scribit etiam Problema determinandi Curvas per conditiones Tangentium in suâ potestate esse, unâ cum aliis difficilioribus; ad quæ solvenda se usum esse dicit duplici Methodo, unâ concinniore, alterâ generaliore: & utramque litteris transpositis celat: quæ, in ordinem redactæ, hanc sententiam exhibent. *Una Methodus consistit in Extractione fluentis Quantitatis ex Æquatione simul involvente Fluxionem ejus. Altera tantum in assumptione Seriei pro Quantitate quâlibet incognitâ, ex quâ cetera commodè derivari possunt; & in collatione Terminorum homologorum Æquationis resultantis ad eruendos Terminos assumptæ Seriei.* Harum Methodorum secunda ex verbis jam recitatis absque ulteriore explicatione intelligi potest; priorem ab Auctore jam accepi, ut sequitur.

Hæc Methodus, ait, ejusdem est generis cum eâ pro extrahendo Radices ex Æquationibus affectis superius descriptâ. Pone, quòd Problema resolvendum reducatur ad Æquationem fluentes Quantitates y , & z , unâ cum earum Fluxionibus \dot{y} & \dot{z} involventem, & quòd Fluxio ipsius z uniformis sit. Ut hæc Fluxio ex Æquatione evanescat, pro eâ ponatur Unitas, & manebit Æquatio solas y , z , & \dot{y} , involvens, quam *Resolvendam* vocat. Proponitur inventio ipsius y in Serie infinitâ convergente, quæ solam z involvet. Hoc in aliquibus Æquationibus impossibile est, in aliis præparationem Æquationum requirit, ubi verò directè confici possit, Resolutio est hujusmodi.

PROBLEMA II.

Ex Æquatione, Fluxionem Radicis involvente, Radicem extrahere.

RESOLUTIO.

OPERATIO PRIMA.

Termini omnes, ex eodem Æquationis latere consistentes, æquentur nihilo, & ipsarum y , & \dot{y} , Dignitates, (si opus sit,) exaltentur vel deprimantur, sic ut earum Indices nec alicubi negativi sint, nec tamen altiores quàm ad hunc effectum requiritur; & sit kx^{λ} Terminus infimæ Dignitatis eorum, qui neque per y , neque per ejus Fluxionem \dot{y} , neque per earum Dignitatem quamvis, multiplicatur. Sit $kx^{\mu}y^{\alpha}\dot{y}^{\beta}$ Terminus alius quilibet, & omnes ordine Terminos percurrendo, collige ex singulis seorsim numerum $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ sic, ut tot habeas ejusmodi Numeros, quot sunt Termini. Horum Numerorum maximus vocetur ν , & x^{ν} erit Dignitas primi Termini Seriei. Pro ejus Coefficiente ponatur a , & in Æquatione, quæ resolvenda dicitur, scribe ax^{ν} pro y , & $\nu ax^{\nu-1}$ pro \dot{y} ; ac Termini omnes resultantes, in quibus x ejusdem est Dignitatis ac in Termino kx^{λ} , sub propriis signis collecti, ponantur æquales nihilo. Nam, hæc Æquatio, debite reducta, dabit Coefficientem a . Sic habes ax^{ν} , Terminum primum Seriei.

OPERATIO SECUNDA.

Pro reliquis omnibus hujus Seriei Terminis nondum inventis pone p , & habebis Æquationem $y = ax^{\nu} + p$, & inde etiam (per Problema L.) Æquationem $\dot{y} = \nu ax^{\nu-1} + \dot{p}$. In Resolvendâ pro y , & \dot{y} , scribe hos eorum valores; & habebis resolvendam novam, ubi p officium præstat ipsius y ; & ex hac Resolvendâ primum extrahes Terminum Seriei p eodem modo atque Terminum primum Seriei totius $y = ax^{\nu} + p$ ex Resolvendâ primâ extraxisti.

OPERA-

OPERATIO TERTIA, ET SEQUENTES.

Dein, tertiam Resolvendam eadem ratione invenies atque secundam invenisti, & ex eâ Terminum tertium Seriei totius extrahes. Et similiter Resolvendam quartam invenies, & ex eâ quartum Seriei Terminum, & sic in infinitum. Series autem sic inventa erit Radix Equationis, quam extrahere oportuit.

EXEMPLUM.

OPERATIO PRIMA.

Ex Equatione $yyzz - xxy - ddzz + dxzz = 0$, extrahenda sit Radix y . Pone $z = 1$, & Aequatio evadet $yy - xzy - dd + dx = 0$, quæ est Resolvendâ. Jam verò Terminus infimus, in quo nec y neque z reperitur, est dd , qui, ipsi kz^λ æquatus, dat $\lambda = 0$. Terminis reliquis yy , $-xzy$, pone $1z^\mu y^a j^\beta$ æqualem successivè, & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $a = 2$, $\beta = 0$; & in secundo $\mu = 2$, $a = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{a + \beta}$ fit in primo casu 0, in secundo -1 . Unde, est 0, & az' , & az'^{-1} , sunt a , & 0; quarum ultimæ duæ, a , & 0, in Resolvendâ pro y , & j , scriptæ, producunt $aa + 0zz - dd + dx$; & Termini aa , & $-dd$, in quibus Index Dignitatis z est λ seu 0, positi æquales nihilo dant $a = d$. Unde primus Seriei Terminus az' evadit d .

OPERATIO SECUNDA.

Pro Terminis reliquis pone p , & habebis Aequationem $y = d + p$, & inde (per Problema I.) $y = p$; qui valores in Resolvendâ pro y , & j , substituti dant Resolvendam novam $2dp + pp - xzp + dx = 0$, ubi p , & p , vices subeunt ipsarum y & j . Terminus unicus, in quo nec p neque j reperitur, est dx , qui cum Termino kz^λ collatus, dat $\lambda = 1$. Terminis reliquis $2dp$, pp & $-xzp$ pone $1z^\mu p^a j^\beta$ æqua-

α qualem successivè; & inde in primo casu habebis $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo $\mu = 0$, $\alpha = 2$, & $\beta = 0$; & in tertio $\mu = 2$, $\alpha = 0$, & $\beta = 1$. Et hinc $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ evadit primo casu 1, in secundo $\frac{1}{2}$, in tertio 0. Unde v est 1, & ax^v , & vax^{v-1} , sunt ax , & a . Termini duo ultimi ax , & a , in Resolvendâ pro p , & \dot{p} , respectivè scripti, producunt $2dax + aaxx - axx + dx$. Et Termini $2dax$, & dx , in quibus Index Dignitatis x est λ seu 1, positi α quales nihilo, dant $a = -\frac{1}{2}$. Unde ax^v , Terminus primus Seriei p , fit $-\frac{1}{2}x$.

O P E R A T I O T E R T I A.

Pro Terminis reliquis nondum inventis pone q ; & habebis Equationem $p = -\frac{1}{2}x + q$, & inde (per Problema I.) $\dot{p} = -\frac{1}{2} + \dot{q}$: Qui valores, pro p , & \dot{p} , in Resolvendâ novissimâ substituti, producunt Resolvendam novam $2dq - xq + qq + \frac{3}{4}xx - xz\dot{q} = 0$. Ubi q , & \dot{q} , vices suppleant ipsorum y , & \dot{y} . Terminus unicus, in quo neque q nec \dot{q} reperitur, est $\frac{3}{4}xx$, qui, cum kx^λ collatus dat, $\lambda = 2$. Terminis reliquis, $2dq$, $-xq$, $+qq$, $-xz\dot{q}$, pone $1x^\mu q^\alpha \dot{q}^\beta$ α qualem successivè; & inde, in primo casu habebis, $\mu = 0$, $\alpha = 1$, & $\beta = 0$; in secundo, $\mu = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$; in tertio, $\mu = 0$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$; in quarto $\mu = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$: & inde, $\frac{\lambda - \mu + \beta}{\alpha + \beta}$ evadit in primo casu, 2; in secundo, tertio, & quarto, 1. Et hinc v est 2, vel ax^v , & vax^{v-1} , sunt axx , & $2ax$: qui valores in Resolvendâ pro q , & \dot{q} , substituti, dant $2daxx - ax^3 + aax^2 + \frac{3}{4}xx - 2ax^3$; & Termini $2daxx + \frac{3}{4}xx$, in quibus Index Dignitatis x est λ seu 2,

Jf. Newtoni Opuscula, Tom. I.

A a a

positi

positi æquales nihilo, dant $a = -\frac{3}{8d}$. Unde, az' , Terminus primus Seriei q , evadit $-\frac{3z^2}{8d}$.

O P E R A T I O Q U A R T A.

Pro reliquis Seriei Terminis nondum inventis pone r ; & habebis. Æquationes $q = -\frac{3z^2}{8d} + r$, & $\dot{q} = -\frac{3z}{4d} + \dot{r}$; & inde. Resolvendam novam $2dr + \frac{9z^3}{8d} - zr + \frac{9z^2 \cdot 4d}{64dd} - \frac{3z^2 r}{4d} + rr - z\dot{r} = 0$; & ex eâ, per Methodum superiorem, habebis $-\frac{9z^3}{16dd}$, Terminum primum Seriei r . Et sic pergitur in infinitum.

Est igitur Radix extrahenda $y = d + p = d - \frac{1}{2}z + q = d - \frac{1}{2}z - \frac{3z^2}{8d} + r = d - \frac{1}{2}z - \frac{3z^2}{8d} - \frac{9z^3}{16dd}$, &c. Et, operationem continuando, producere licet Radicem ad Terminos plures.

Et eâdem Methodo, dicit NEWTONUS, Radices Æquationum, Fluxiones secundas, tertias, quartas, ($\ddot{y}, \ddot{\dot{y}}, \ddot{\ddot{y}}$) aliâsque involventium, extrahi posse.

His utitur Radicum Extractionibus ubi aliæ Methodi nil profunt. Nam, in Epistolâ prædictâ anni 1676 docet, quod in Solutione Problematum de Tangentibus inverforum, casus aliqui dantur, in quibus hæc Methodus generalis non requiritur: & particulariter, si in Triangulo rectangulo, quod ab Ordinâtâ, Tangente, & interjacente parte Abscissæ constituitur, Relatio duorum quorumlibet è Lateribus tribus per Æquationem quamvis definiatur, Problema absque Methodo hacce generali solvi poterit.

Methodi autem hæc omnes, tam particulares quàm generales, collectim sumptæ, Solutionem exhibent secundæ partis Problematis, quod NEWTONUS sub initio istius Epistolæ his verbis proposuit. *Datâ Æquatione, quotcunque Fluentes Quantitates involvente, Fluxiones invenire, & vice versâ.* Nam, tota Fluxionum Methodus in hujus directâ & inversâ Solutione consistit.

O P U S C U L U M.

OPUSCULUM XIV.

ISAACI

NEWTONI

EPISTOLA

AD

CHAMBERLAYNUM.

Aaa 2

ART. I.

EXCERPTUM

EX

EPISTOLA LEIBNITII

AD

CHAMBERLAYNUM

LONDINI degentem.

Vindobonæ A. D. 28. Aprilis An. 1714.

GRATIAS ago tum cùm de eo, quod tam benignè te offers ad refarciendam amicitiam inter me, & NEWTONUM. Ego quidem eam non discidi. Sed KEILLIUS quidam, cùm aliqua mihi contraria inferuisset *Transactionibus* vestris *Philosophicis*, obtupui, & ut hæc repararentur petivi per Epistolam à SLOANE Societatis à secretis, qui mihi misit scriptum quoddam KEILLII, in quo jus suum ita tuebatur, ut fidem meam aggrederetur. Privatum hominis stomachum id effecisse sum arbitratus, nullo pacto suspicans Societatem aut NEWTONUM ipsum hujus negotii participes esse; & litigare nolens cum homine rerum antèactarum ignaro, & opinans, NEWTONUM ipsum, res gestas melius cognoscentem, laboraturum, ut jus meum mihi servaretur, persecutus sum satisfactio- nem mihi debitam.

Sed quidam, nescio quâ captiunculâ & nimis callidâ juris interpretatione, perfecerunt, ut ego putarer causam dicere apud Societatem, méque ejus jurisdictioni submittere, quod nunquam mihi venerat in mentem. Insuper justitia postulat, ut certior fierem de eo, quod Societas rem penitus discutere volebat, & ut mihi liceret decla-

A a a 3.

rare.,

rare , an illi rationes meas exponere vellem , & an non aliquis ex Judicibus mihi foret suspectus. Itaque sententia dicta fuit unâ tantum parte auditâ , ita ut nullitas sit manifesta. Ego tamen non credo , quod sententia hæc haberi possit tanquam Societatis decretum.

Nihilo-minus hanc ipsam sententiam NEWTONUS per totum Terrarum orbem divulgandam curavit libro quodam * ad hoc ipsum edito , ut nomini meo nota inuretur , & misso , tanquam à Societate , in Germaniam , Galliam , & Italiam. Hoc , (ut vocatur ,) Judicium , & injuria hæc , qua immeritò appetitus est Vir , qui jamdudum in Societatem hanc receptus fuit , eamque non decoravit , multis certè non approbabitur , & plures è Societate ipsâ , ut spero , dissentient. Multi nonnulli , Galli , Itali , & aliarum gentium hæc aperte improbant , & mirantur , ac futilia , (de quibus rebus Epistolæ apud me sunt ,) judicant , quæ contra me fuerunt allata.

Ego quidem semper humanus , & comis , quam maximè potest , in NEWTONUM fueram , & , quanquam nunc vehementer dubitari possit , utrum habuerit Methodum , quam ego inveneram , antequam illam ex me didicisset , attamen locutus fueram , tanquam si proprio ingenio sibi parasset aliquid meæ Methodo simile. Ille verò , inconsultis quibusdam Adultatoribus malè credens , se adduci eo sivit , ut me acerbè laceggeret. Tu nunc vide , sis , uter nostrum præcipuè facere debeat , quod necessarium est ad litem hanc terminandam.

Cum sum Vindobonæ , id est , in ultimam Germaniam , nondum vidi librum contra me divulgatum ; huc enim quam ferò hujusmodi libri afferuntur ; nec dignatus sum eum per Tabellarios publicos mihi ferendum curare ; itaque nondum facere potui Apologiam negotio convenientem ; non desunt tamen , qui meæ famæ jam rationem habuerunt.

Eruditos homines acriter & duriter inter se concertare molestissimè fero , & , né in turbas hujus generis inciderem , semper diligentissimè curavi : nunc autem omnibus artibus ad certandum compulsus sum ; si tuâ operâ , quam adeò benignè polliceris & offers , malum hoc sanari posset , profectò gauderem ; & jam nunc de hoc valde te amo , &c.

A R T. II.

* Intelligit *Commercium Epistolicum* COLLINSII & aliorum.



ART. II.

EPISTOLA.

NEWTONI

A D.

CHAMBERLAYNUM

A. D. II. Maii 1714. V. S.

LINGUAM Gallicam non adeò penitus novi, ut sentire possim totam vim verborum, quibus utitur LEIBNITIUS in Epistola sua; tamen intelligo, quòd putat injuriam sibi allatam esse à Regiâ Societate, & à me.

Quæ FATIUS in eum scripsit, (a) scripta sunt me prorsus ignaro.

Ante, circiter, novem annos LEIBNITIUS famam meam læsit, (b) insinuans, me ab illo mutuasse Methodum Fluxionum. KEILLIUS (c) me defendit: & ego penitus ignoravi, quæ LEIBNITIUS ediderat in Actis Lipsiensibus, donec huc pervenit primum ejus responsum ad KEILLIUM, in quo reipsâ petebat LEIBNITIUS, ut earum rerum, quæ divulgaveram, (d) palinodiam canerem.

Si quid indicare potes, in quo illum injuriâ affecerim, curabo ut ei satisfaciam, sed palinodiam canere nolo rerum, quas veras scio. Opinor autem Conventum Regiæ Societatis iniquè in illum se non gessisse.

(a) In *geometricâ Investigatione Lineæ brevissimi descensus*.

(b) Vide Acta Lipsiensia Mensis Januar. An. 1705.

(c) Transl. Philos. Mensium Septemb. & Octob. An. 1708.

(d) In introductione ad *Curvarum Quadraturam*. Vide pag. 204. hujus.

OPUSCULUM



OPUSCU-

OPUSCULUM XV.
ISAACI
NEWTONI
EPISTOLA
AD
ABBATEM CONTI.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

Bbb

ART. I.



ART. I

P A R S E P I S T O L Æ

S C R I P T Æ A

L E I B N I T I O

A D

A B B A T E M C O N T I *

EN Epistolam, quâ uti poteris, si voles. Nunc ad rem. Gaudio te esse in Britannia, ubi proficere licet; fatendum enim est quòd ibi sunt doctissimi, & acutissimi viri, qui tamen haberi vellent ferè soli Inventores; at ut opinor, voti compotes non fient. Non constat NEWTONUM habuisse ante me Characteristicam & Algorithmum infinitesimalem, ut optimè censuit BERNOULLIUS; quanquam facile *habere potuisset, si animum advertisset*, ut facile APOLLONIUS pervenisset ad *Cartesianam* Curvarum Analysim, si animum advertisset. Ii, qui contra me scripserunt, cum non veriti sint aggredi sinceritatem meam interpretationibus longè remotis à verbis meis, & fundamento destitutis, impetrare non poterunt, ut respondeam futilibus rationibus hominum tam malignè se gerentium, & ceteroquin à scopo aberrantium. Agitur enim de Calculo Differentiali, at illi ad *Series* se divertunt, in quibus NEWTONUS mihi sine dubio præiit. Tamen denique inveni Methodum generalem, quâ *Series* eruo, & eà repertâ, opus amplius non habui Extractionibus, ad quas ille confugit. Melius fecissent, si in-

B b b 2

tegras

* Data fuit hæc Epistola sub finem anni 1715. Comm. Epist. ad Lectorem in principio.

tegras Epistolas edidissent, ut me consentiente VALLISIUS, qui nullam litem mecum habuit, ut homines illi credi vellent. Adversarii nostri illam *Commercii Epistolici Collinsiani* partem luci dederunt, quam non repugnare malis eorum interpretationibus existimârunt. Novi COLLINSIUM, cùm iterùm essem in Britannia; nam, cùm primò, ibi brevi moratus sum, quia Ministrum publicum comitabar, & Geometriam abstrusiores prorsus ignorabam, ac ne verbum quidem audieram de mutuis COLLINSII, GREGORII, & NEWTONI litteris; ut satis patebit ex meis Epistolis ad OLDEMBURGIUM, & OLDEMBURGII ad me, quæ scriptæ fuerunt circa tempus illud, & paulò post.

Sed, cùm secundò venissem in Britanniam, COLLINSIUS mihi ostendit Commercii sui partem, ubi observavi NEWTONUM ipsum fassum esse ignorantiam suam circa plura, &, inter cetera, eum dixisse nihil se invenisse de Dimensionibus Figurarum Curvilinearum celebrium, præter *Cissoïdis* dimensionem. Sed omnia hæc suppressa fuerunt. Ægrè fero NEWTONUM, tantum Virum, nimis assentiendo consiliis nonnullorum Adulatorum, qui eum mihi inimicum reddere voluerunt, incidisse in Doctorum censuram.

Ejus Philosophia aliquantisper paradoxa videtur, & dubito an Sectatores inventura sit. Si omne Corpus grave est, *Gravitas* necessariò (licet multa dicant ejus Patroni, & multum excandescant) est aut *qualitas occulta scholastica*, aut *miraculi* effectus. Olim BAYLIO probavi miraculosum esse quidquid ex Creaturarum naturâ nequit explicari. Satis non est dixisse, Deus hanc Naturæ Legem instituit, ergo res naturalis est. Oportet, ut Creaturarum vires legem hanc exequi valeant. Si Deus, exempli gratiâ, Corpori libero hanc legem imposuisset, ut verteretur circa aliquod Centrum, oporteret ut, aut adderet alia Corpora, quæ illud impellendo semper retinerent in orbe circulari; aut Angelum illi alligaret; aut denique Deus ipse ratione quâdam extraordinariâ ad hoc faciendum concurreret; nam, per suam naturam Corpus illud ab Orbe per Tangentem dilaberetur. Deus perpetuò agit in Creaturis earum naturas servans, & hæc servatio est continua productio earum rerum, quæ Creaturarum perfectiones sunt. Deus est *Intelligentia supra-mundana*, non est enim Anima Mundi, & *Sensorio* non eget.

Rationes à NEWTONO ejusque Sectatoribus allatæ demonstrare mihi non videntur *Vacuum*; non inquam, magis quàm Gravitationem illam, quàm sibi universalem persuadet, aut Atomos. Tenuitate dumtaxat ingenii impellimur in Vacuum, & Atomos. CLARKIUS disputat contra *Cartesianorum* sententiam, affirmantium Deum destruere non posse materiei partem, ut Vacuum efficiatur; sed miror eum non videre, quòd, si spatium est substantia à Deo diversa, eadem redit difficultas. Asserere autem Deum esse spatium est Deo partes tribuere. Spatium est quidem aliquid, sed ut Tempus; utrumque enim est generalis rerum ordo; nempe spatium Ordo rerum simul existentium, & Tempus Ordo rerum successivè existentium; vera quidem sunt hæc, sed phantastica, ut Numeri.

Materies ipsa substantia non est, sed tantum *substantiatum*, Phænomenum benè fundatum, & quod nunquam fallit eos, qui progrediuntur ratiocinando juxta Leges phantasticas Arithmeticæ, Geometriæ, Dynamicæ, &c. Omnia, quæ de his assero, demonstrata videntur. Sed ecce alia quædam, quæ mihi in mentem revocat mentio, quæ injecta est de Dynamicâ, aut virium scientiâ. Miror NEWTONUM, ejusque Discipulos sibi persuasisse, quòd Deus ita malè machinam suam constituit, ut, nisi extra ordinem ei manus admoveat; automatum moveri quàm primùm desitutum sit. Extraordinariam voco omnem Dei operationem, quæ versatur circa aliud: quàm circa Creaturarum naturas conservandas. Igitur, quanquam eorum methaphisica suppellex curta, & mathematica satis parabilis mihi videatur, attamen plurimi facio Phisico-Mathematicas NEWTONI Meditationes; tūque, optimè de Publico merebis, si magnum hunc Virum exorabis, ut edat ipsas conjecturas suas de Physicâ. Optimum consilium puto educere, ut ille facit, è Phænomenis, omnia, quæ inde confici possunt, nihil supponendo, quanquam aliqua non liceret assequi nisi per conjecturas. Tamen, quando *Data* non sufficiunt, fas est, (ut aliquando fit cum explicantur incognitæ Epistolarum notæ,) Hypotheses fingere, quæ, si felices sunt, interim retinentur, quoad nova experimenta sufficiant nobis *nova Data* aut ea, quæ BACONUS appellat *Experimenta Crucis*, quibus optima Hypotheseon seligitur. Cum mihi relatum fuerit aliquos *Anglos* meam Philosophiam malè

B. h. b. 3

repræ-

representasse in eorum *Transactionibus*, non dubito, quin his quæ nunc scribo, defendi possim. Valde faveo Philosophiæ experimentalis, sed ab eâ NEWTONUS longè aberrat, asserens omnem materiem esse gravem, (aut quamcunque materiæ partem aliam attrahere,) quod experimenta nullo pacto confirmant, ut optimè censuit HUGENIUS. Materia gravifica habere non potest hanc gravitatem, cujus causa est, & NEWTONUS nullum affert experimentum, nullam rationem sufficientem, unde probentur aut Vacuum, & Atomi, aut mutua generalis Attractio, sed non ideo, quia non hactenus perfectè, & sigillatim novimus, quomodo efficitur gravitas, aut vis elastica, vel magnetica &c., non ideo, inquam eas referre licet inter qualitates occultas scholasticas, aut inter miracula; & multò minùs licet terminis circumscribere Dei sapientiam, & potentiam, illique tribuere *Sensorium* aliquod, & similia. Ceterùm, miror NEWTONI sectatores nihil edere, quod fidem faciat eos ab illo accepisse bonam Methodum. Felicior quidem fui Discipulis. &c.



ART. II.



ART. II.

EPISTOLA
SCRIPTA A
NEWTONO
AD

ABBATEM CONTI

Quâ respondetur superiori Epistolæ LEIBNITII.

Londini 26. Febr. 1716. V. S.

HAUD ignoras *Commercium Epistolicum* continere Epistolas, & alia scripta jam antiqua, quæ aliquo pacto pertinent ad negotium, de quo disputant LEIBNITIUS, & KEILLIUS, & quæ servata fuerunt, aut in Tabulariis *Regiæ Societatis*, aut in COLLINSII Bibliothecâ; neque ignoras hæc scripta collecta, & edita fuisse à frequenti Virorum illustrium ex diversis nationibus conventu, quem ad hanc rem convocaverat Regia Societas. LEIBNITIUS hætenus responsum huic commercio negavit, optimè sciens res de facto nullâ responsione posse infirmari. Silentium suum excusaturus principio causatus est se non vidisse librum hunc, nec sibi satis otii esse ad illum perlegendum: dixitque se curam hujus rei commississe celebri cuidam Mathematico. Responsum, quod Mathematicus ille, verus aut fictus, dederat die 7 Junii 1713, insertum fuit Libello famoso scripto die undetricesimo Mensis Julii ejusdem anni, & edito in *Germaniâ*, sine nomine nec Auctoris, nec Typographi, nec loci, quo excusus fuerat. Omnia hæc deinde in gallicam linguam versa fuerunt, & inserta Epistolæ ejusdem stili, & ut videtur, ejusdem Auctoris; hisce respondit KEILLIUS mense Julio 1714; neque hætenus huic quidquam responsum fuit.

Novâ:

Novâ nunc excusatione utitur LEIBNITIUS, ne respondeat; non vult scilicet adeo *Anglis* morem gerere, ut respondeat futilibus eorum rationibus. Nihilominus, ut me in diverticulum conjiciat, conatur me disputationibus Philosophicis implicare, & mihi proponit Problemata solvenda, sed hæc disputationes, & hæc Problemata nihil ad rem.

Si quis vellet ad examen revocare ejus Philosophiam, non difficulter ostendere posset LEIBNITIUM ab usu communi detorquere significationem verborum, dum exempli gratiâ, appellat *Miracula*, ea, quæ fiunt, naturâ leges suas, ut solet, servante; dum notat nomine *Qualitatum occultarum*, ea, quarum causæ latent; aut dum vocat *animam*, id quod non animat corpora humana.

Ostendi posset, quod ejus *Harmonia præstabilita*, est verum miraculum, & adversatur experientiæ omnium hominum; cum quisque gaudeat facultate videndi suismet oculis, & movendi suum corpus, ut libet. Merito reprehendi possit, quod post-habeat Hypothesibus inductiones ductas ab experimentis; quod me criminetur, mihi tribuens sententias, in quas nunquam fui, & quod proponat Hypotheses, quas recipi vult antequàm ponderentur; cum proponere deberet quæstiones experimentorum examini subjiciendas, priusquàm in Phisicâ recipiantur. Sed hæc nihil ad *Commercium Epistolicum*.

Queritur Consensum se non æquum prodidisse, dum omittit quædam contra me facientia; sed quærimoniam suam non probat. Affert ille quidem verba desumpta ex unâ mearum Epistolarum, quibus fatebar ignorantiam meam, & quæ omissa fuisse asserit; sed hæc verba sunt in *Commercio* pag. 74. * versic. 10. 11, nec me hujus confessionis pudet. Cum tamen COLLINSIUS LEIBNITIO iterum Londinum visenti mense Octobri 1676. hæc verba ostenderit, patet LEIBNITIUM eundem vidisse Epistolam, in quâ scripta erant hæc verba, & quæ data fuerat A. D. vicesimum quartum. Octob. 1646. Hæc autem Epistola, quin-etiam aliæ præcedentes, continent descriptionem meæ Methodi Fluxionum. Insu-

per

* Primæ editionis, scilicet; sed secundæ pag. 153, versiculo penultimo & ultimo. & Opusc. XI. pag. 338. hujus.

per hanc ipsam Epistolam continetur descriptio duarum Methodorum generalium pro *Seriebus* obtinendis, in quarum alteram jus aliquod modò sibi vindicat LEIBNITIUS.

Certè persuasum habes; quòd *Æquitas* postulat ut LEIBNITIUS sibi constet, & nunc fateatur, quæ ante hos quindecim annos fatebatur, nec inficias eat quæ tunc concedebat.

In Epistolâ datâ A. D. vicesimum Maii 1675. fatebatur se ab OLDEMBURGIO accepisse litteras datas A. D. decimum quintum Aprilis, quæ complectebantur plures Series convergentes; idemque nunc eum fassurum spero. Plures Clari Viri ex *Italia*, *Gallia*, & *Germaniâ*, & tute inter alios, vidistis litteras autographas, & eas quæ hinc desumptæ fuerunt, & quæ simul repositæ fuerunt in thecâ papyrorum Regiæ Societatis; igitur diffiteri non potest se vidisse Seriem *Gregorianam*, quæ est in ipsis OLDEMBURGII litteris datis A. D. decimum quintum Aprilis 1675, & in *Gregorianis* datis A. D. Decimum quintum Februarii 1671.

In Epistolâ datâ A. D. duodecimum Maii 1676. quæ lecta fuit ab iisdem Viris; fatebatur se non compotem esse Methodi, quâ extenditur ea Series, quæ exprimit Arcum ex Sinu, nec quæ Sinum ex Arcu; Hoc autem erat fatèri, se has Series ignorasse, cum daret Epistolam A. D. vicesimum sextum Octobris 1674., idem nunc eum fassurum spero.

In responsione, quam dederat ad FATIUM, & quam impressam videmus in Actis *Lipsiensibus* Maii 1700; cum FATIUS dixisset me esse primum Inventorem, & LEIBNITIO pluribus annis prævisse, LEIBNITIUS fatetur, se neminem scire, qui habuerit Methodum Fluxionum, aut Differentiarum ante me, & ipsum, & neminem editis libris probasse, sibi hanc Methodum innotuisse; me hanc Methodum habuisse, antequàm ille eam vulgasset, quin-etiam antequàm in *Germaniâ* nemini illam tradidisset. Fatetur meum librum de *Principiis* ostendere, me hanc Methodo frui, eundemque continere prima, quæ edita essent, specimina applicationis Methodi hujus ad difficiliora Problemata. Spero igitur LEIBNITIUM semper idem fassurum. Non negabat tunc, quæ asseveraverat FATIUS; si nunc negat, dici poterit eum malâ fide agere.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

C c c

In

In unâ ex ejus Epistolis datâ A. D. septimum Maii 1693, quæ nunc est in Scriniis Regiæ Societatis, legi possunt hæc verba. *Mirificè ampliaveras Geometriam tuis Scribis, sed edito Principiorum Opere, ostendisti patere tibi, quæ Analyfi receptæ non subsunt. Conatus sum ego quoque, notis commodis adhibitis, quæ Differentias, & Summas exhibent, Geometriam illam, quam Transcendentem appello, Analyfi quodammodo subjicere; nec res malè processit.* Debet nunc quoque mihi tribuere, quæ tunc tribuebat.

In Epistolâ datâ A. D. vicesimum primum Junii 1677, quâ respondet ad meam datam A. D. vicesimum quartum Octobris 1676, ait mecum sentire, quòd Methodus, quâ SLUSIUS utebatur ad Tangentes ducendas, perfecta nondum erat, quâ occasione descripsit Methodum Differentialem, quâ Tangentes determinat, & quæ ipsissima est, quam BAROVIVS divulgaverat anno 1670; sed, quia hanc Methodum sibi tribuebat, eam aliquantisper texit novâ notatione, ac ostendit, quòd magis extendi, & Methodo à me descriptæ æquari poterat; Inde inferens Methodum suam à meâ non adeò differre; cum præsertim ea quoque Quadraturas faciliores redderet. Hujus Elementa tradidit in Actis *Lipsiensibus Octobris* 1684, addens eam se extendere ad Problemata difficiliora, quæ facile solvi non possent sine hac, aut aliquâ simili Methodo. Tunc igitur temporis fatebatur, me, cum scriberem Epistolam de quâ supra, datam A. D. vicesimum quartum Octobris 1676, compotem esse Methodi æquè vastæ ac suæ; quapropter id, ut æquum est, nunc pariter fateri debet, præsertim, cum jam explicatæ sint tum secretæ notæ, quæ erant in hac Epistolâ, tum quædam alia, quæ ad hanc Methodum referuntur, & cum Compendium, de quo ibi mentio fit, editum sit.

Dicebat in Epistolâ datâ A. D. vicesimum septimum Augusti 1676, se non credere meas Methodos tam esse generales, quàm ego affirmabam in Epistolâ à me datâ A. D. decimum tertium Junii præcedentis, & dari Problemata adeò difficilia ut neque Æquationibus, neque Quadraturis subjicerentur, quale, inter cetera, est inversum Problema de Tangentibus; His verbis patet LEIBNITIUM fateri se nondum invenisse rationem revocandorum Problematum ad Æquationes

tiones Differentiales. Quod tunc ipse fatebatur, fatentur etiam Acta *Lipsiensia* Aprilis 1691 paginâ 198, & ipse nunc pariter, ut æquum est, fateri debet.

WALLISIUS in Præfatione ad duo prima suorum Operam Volumina edita anno 1695 indicat me meis Litteris scriptis per annum 1676 explanavisse LEIBNITIO Methodum, ut eam voco, Fluxionum, & ut ille, Differentialem, méque invenisse hanc Methodum decem annos antea (id est, anno 1666, aut antea). Cum autem LEIBNITIUS ex illo tempore habuerit cum WALLISIO commercium Epistolicum, nec iis, quæ WALLISIUS asseruerat, repugnaverit, imò nihil, quod reprehenderet, invenerit, spero eum nunc quoque consensurum.

Sed, quia jam-dudum accusationem mihi intentavit, quâ Plagiatus infimulor, si in eâ persistit, debet eam, juxta leges constitutas, probare, alioquin calumniæ reus habebitur. Hactenus satis duxit dare ad eos, ad quos scribit, litteras plenas affirmationum, querelarum, & cogitationum nihil probantium. Sed Actor est, & probare debet id; cujus reum me dicit.

Ab his singillatim tractandis abstineo, quia rem totam cognoscere potes ex *Commercio Epistolico*; & ex ejus *Recensione*, ad quæ remitti non ægrè feres. Tuus &c.





OPUSCUL

OPUSCULUM XVI.
ISAACI NEWTONI
N O T Æ
IN EPISTOLAM
LEIBNITII
AD
ABBATEM CONTI

Ccc 3

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
L. H. CO. 7
MICHIGAN LIBRARY
E I T I N I E A
CO. 1
LITHO S. METAL

1 1 2



ART. I.

E P I S T O L A
L E I B N I T I I

A D

A B B A T E M C O N T I

Quâ respondetur superiori NEWTONIANÆ

Hannoveræ A. D. 9. Aprilis An. 1716.

A MORE procul - dubio Veritatis provinciam suscepisti mihi mittendi quendam, quasi libellum provocatorium à NEWTONO. Manum conferere nolui, cum militibus emissariis, quos in me compulerat, nempe, neque cum eo, qui se Accusatorem gessit *Commercio Epistolico* innixus, neque cum eo, qui Præfationem acerbitalis plenam præmisit recenti Editioni ejus *Principiorum*; nunc autem, cum ipse in Arenâ descenderit, illi satisfacere gestio.

Hujus disputationis initio miratus sum me dici Aggressorem; nomen enim memineram me de NEWTONO minus humaniter & officiosè locutum. Sed deinde vidi in hunc sensum detorqueri quædam verba, quæ sunt in *Actis Lipsiensibus* Januarii 1705; scilicet: Pro *Differentiis* Leibnitianis D. NEWTONUS *adhibet, semperque adhibuit, Fluxiones*. Ubi Auctor Observationum in *Commercium Epistolicum* ait, pag. 108. * *Sensus verborum est, quod NEWTONUS Fluxiones Differentiis Leibnitianis substituit*. Sed hæc est malignæ interpretatio, hominis rixandi causam aucupantis; cui obviam ire voluiffe

* Editionis prioris; & pag. 223; Editionis secundæ.

voluisse videtur Auctor verborum, quæ in Actis Lipsiensibus sunt; dicit enim, quasi ob id ipsum, *adhibes, semperque adhibuit*; innuens NEWTONUM, non post visas Differentias meas, sed jam antea, Fluxiones usurpavisse. Quis unquam tribuere poterit his verbis, *semperque adhibuit*, sensum à meo diversum, nec rationi averfantem? sed verbum *substituit* adhibetur, cum sermo est de iis, quæ P. FABRIUS fecit post CAVALLERIUM. Unde sequitur, quòd, aut NEWTONUS se decipi passus est ab aliquo, qui acerbiorum significationem subfinxit his Actorum verbis, quæ divulgata me conscio putabantur, seque credidit Plagiatus accusari; aut libenter arripuit oblatam ansam sibi tribuendi, vel curandi, ut alii tribuerent ipsi, ceteris exclusis, inventionem novi hujus Calculi, (quem benè vertisse, & totum Orbem implevisse videbat,) contra ea, quæ sciebat, & falsus erat in suis *Principiis paginâ 253* primæ Editionis. Si quis se scrupulam, aut quærimoniæ causam in verbis *Actorum Lipsiensium* invenisse testatus esset, persuasum habeo, eos, qui ad hæc *Acta* scribenda conveniunt, scrupulum omnem remotos fuisse; sed putares quæsitam esse causam concertandi.

De frequenti Virorum Illustrum è diversis Nationibus conventu, quem ad hanc rem convocaverat Regia Societas, ne verbum quidem audieram; Nam, de eo certior factus non fueram, & hodie quoque ignoro nomina plurium ex iis, quibus constat, & præsertim eorum, qui ex Insulis Britannicis non sunt. Non credo iis probari omnia, quæ sunt in libro in me edito.

Facile potest intelligi, quòd *Commercium Epistolicum* ad me *Vindobonæ* morantem delatum fuerit aliquandiu, postquam editum fuerat, licet de eo mihi renuntiatum fuisset; quod sciens Amicus quidam non minùs mei studiosus quàm NEWTONI ejusdem adjutores, edidit scriptum à NEWTONO vocatum *famosum*; cujus tamen meritò queri non potest NEWTONUS, cum vehementius non sit iis, quæ contra me divulgata fuerant. Si Scripti hujus Auctor, & locus quo impressum fuerat, silentio teguntur, satis nota sunt nomen, & domicilium egregii illius Mathematici, qui scripsit Epistolam ibi relatam, & qui, à me rogatus, sententiam de Commercio dixit; quod sufficit; NEWTONUS, (cujus sectato-

res

res non latet hujus Mathematici nomen, ut ipsi ostenderunt,) eum appellat Mathematicum verum aut fictum, & cum totis viribus, sed incassum, ad sua castra illum trahere conatus fuerit, eum spernit, contra omnium, hunc inter primi ordinis Mathematicos referentium, sententiam & contra rerum evidentiam, quas ejus inventa confirmant.

Cum tandem in manus venit *Commercium Epistolicum*, vidi nihil esse in illo, quod ad rem faceret, litterasque, quas complectitur ne verbum quidem habere, unde dubitari possit quin ego inven- rim Calculum Differentialem, de quo agitur. Eo negotio prætermisso, observavi quod totus liber versatur circa *Series*, quarum gloria NEWTONO permittitur, & quod observationes constant interpretationibus insulis, aliquando ridiculis, aliquando etiam contra conscientiam aliquorum ex iis, qui eas fingebant vel probabant, fictis, quibus quærebatur, ut ego futilibus suscipionibus lacerarer.

Ut ergo de verbo ad verbum responderem libro in me edito; opus fuisset alio libro magno, saltem, æquè ac ille erat; opus erat singillatim retractare innumeras pusillas res gestas ante hos triginta, aut quadraginta annos, quarum fermè oblitus fueram; opus erat requirere veteres Epistolas, quarum plures, (ne dicam, quod plerumque mearum exemplaria non servavi,) amissæ sunt; reliquæ autem sepultæ jacent sub magno chartarum acervo, quem ut in ordinem redigerem, opus habebam otio & patientiâ. Otium autem deficiebat me occupationibus alterius generis distentum.

Præterea, observavi, quod in *Commercii Epistolici* editione suppressa fuerant Loca, quæ contra NEWTONUM facere poterant, cum nihil prætermisum fuerit, quod in me converti posse putaretur interpretationibus à verborum sensu alienis. Cum non dignatus fuerim attentius legere *Commercium Epistolicum*, mirum non est me exemplum perperam attulisse, quia scilicet illud non videram, aut me vidisse oblitus fueram. Sed aliud afferam. NEWTONUS in quâdam ex suis Epistolis ad COLLINSIUM datis fatebatur se conficere non posse Problema de sectionibus secundis, (aut segmentis secundis) sphæroidum aut solidorum similium; sed locus hic, vel hæc Epistola desideratur in *Commercio Epistolico*. Candidius erga Disputantes, & utilius erga Publicum editum fuisset. *Commercium Epistolicum* COLLINSII totum, saltem, ubi contine-

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I.

D d d

bat

hat aliquod scitu dignum, Epistolis præsertim non mutilatis; perpancæ enim restant inter mea scripta, aut quarum Exemplaria habeam.

Omnibus itaque consideratis, tot indiciis perspicuens eos malignè se præstare, nodumque in scirpo quærere, rem me indignam facturum putavi, si manum conferem cum hominibus tam fædè se gentibus. Videbam, quòd in iis refellendis difficile fuisset abstinere ab objurgationibus, & verbis acerbitatis plenis, qualia debebantur eorum instituto, neque hoc spectaculum Populo dare volebam, ad meliora destinans Tempus, cujus summa ratio mihi habenda est, & satis contemnens judicium eorum, qui hoc libro innixi, contra me sententiam dicere non verebuntur; præsertim cum ipsa Regia Societas nihil statuere voluerit, ut didici ex Epitome ejus Tabularum.

Non puto me dixisse, (quòd NEWTONUS mihi tribuit,) quòd *nolo* Anglis adeò morem gerere, ut respondeam *futilibus eorum rationibus*; non enim, opinor, omnes *Angli* suam ducunt NEWTONI causam; nam, non desunt, qui tam polleant ingenio & comitate, ut se totos tradere nolint affectibus, quibus nonnulli ex ejus Fautoribus urgentur.

NEWTONUS præterea me incusat, quòd eum in diverticulum conicere voluerim suam Philosophiam impugnans, & Problemata proponens; sed de Philosophiâ, meorum Principiorum partem edidi, sua non aggressus; aliqua tantum verba de iis injeci nonnullis Epistolis, cum id occasio postulare, & ansa mihi data fuerit. De Problematis autem; longè absum ab iis NEWTONO proponendis; cum egomet ea recusaturus sim, si mihi proponantur: ab iis abstinere nobis per ætatem licet; sed nobis sunt amici, qui vicem nostram implere possunt.

Hic singillatim recensere nolo; ea, quæ acerbius in meam Philosophiam, aut pro suâ loquitur NEWTONUS. Hujus Disputationis locus hic non est. *Miraculum* appello omne id, quod fieri nequit nisi Creatoris potentiâ, cum Creaturarum natura ejus Rationem non complectatur, &, quando hoc nihilo-minus tribuitur qualitatibus, aut viribus Creaturarum, tunc voco hanc *Qualitatem Qualitatem occultam Scholasticam*, quæ scilicet detegi non potest. Hujus generis esset Gravitas primitiva. Nam, Qualitates occultæ, quæ *fictitiæ* non sunt, *ex* sunt, quarum causam ignoramus quidem, sed

sed non excludimus. *Animam hominis* appello substantiam illam simplicem, quæ percipit ea, quæ fiunt in Corpore humano, & cujus appetitus, aut voluntates subsequuntur Corporei conatus. *Hypothesibus* non posthabeo *Argumenta* ducta per inductionem ab experimentis; sed nonnunquam obtruduntur peculiares observationes tanquam inductiones generales, & inter Hypotheses rejiciuntur propositiones demonstrativæ.

Harmonia mea præstabilita, quam hic NEWTONUS repræsentat, eadem non est, ac illa, quam norunt plures acuti Viri extra Britanniam; nonnulli etiam in ipsâ Britannia: tunc ipse, opinor, eam hoc vultu non vidisti, neque hodie vides, nisi fortè vehementer mutatus sis ab illo, qui quondam.

Nunquam inficiatus sum me, dum iterum effem in Britannia, vidisse apud COLLINSIUM aliquas NEWTONI Epistolas; sed nullas vidi, nec dum video in *Commercio Epistolico*, ubi NEWTONUS suam Fluxionum Methodum explicuerit.

Sed neque vidi ab eo explanatam Methodum ad *Series* spectantem, quam mihi vindico; puto eum intelligere de illâ, quæ consistit in assumptione *Seriei* alicujus ad libitum; hanc Methodum usurpavêram antequàm iterum Britanniam petissem; neque tamen affirmo NEWTONUM eam habere non potuisse; quinimo non ita difficile erat illam invenisse.

Vult NEWTONUS, ut fatear, & concedam, quæ falsus sum, vel quæ concesseram ante hos quindecim annos; quod si negem, confici, inquit, poterit me agere malâ fide. Idem ab ipso expectari, poterit jam enim præterierunt bis quindecim anni, ex quo in primâ suorum *Principiorum* Editione *paginis* 253, 254, concedit me invenisse Calculum Differentialem, sine suæ inventionis auxilio; sed postea, nescio quomodo, animum induxit, ut per alios huic concessioni adversaretur.

Sciendum est, quòd, cùm primò effem in Britannia anno 1673, prorsus ignorabam *Series infinitas*, quales MERCATOR nuper ediderat, æquè ac alia pertinentia ad Geometriam novis Methodis ampliata; nequidem satis versatus eram in *Analysi Curvesiarum*. Mathematica tractabam tanquam *Parergon*, & pauca notam præter *Caualterianam* indivisibilium Methodum, & quendam librum Patris

LEOTALDI, in quo erant Quadraturæ Lunularum, & similium Figurarum, unde mihi quoddam ulteriora cognoscendi desiderium.

Sed maximè delectabar Numerorum Proprietatibus, quarum perscrutandarum occasio fuerat Libellus, quem penè puer edideram Anno 1666 de Arte Combinationum. Et, cum jam tum animadvertissem quàm utiles essent Differentiæ ad inveniendas Summas, has Differentias ad Series Numerales traduxi. Primæ ex mutuis litteris *Oldenburgicis*, & meis, satis ostendunt me tunc vix ulteriùs progressum. Neque tum COLLINSIUM noveram, ut malignè fingitur.

Cùm *Lucretia Parisiorum* familiariter HUGENIUM inviserem, is me paulatim his mysteriis initiavit; Hæc institutio, & MERCATORIS liber, quem ex Britannia mecum attuleram, quia mihi de eo PELLIVS locutus fuerat, viam aperuerunt ad inveniendam sub finem anni 1673 meam arithmeticam Circuli Quadraturam, quam valde HUGENIO approbavi, & de quâ sermonem feci OLDEMBURGIO in litteris anni 1674. Tunc autem HUGENIUS, aut ego ne verbum quidem audiveramus de *Seriebus Newtonianis*, vel *Gregorianis*. Itaque me primum credidi, (credidit etiam HUGENIUS), exposuisse Aream Circuli Serie Numerorum rationalium. Hujus sensus Epistolas ad OLDEMBURGIUM dedi, qui respondit jam hujusmodi *Series* notas esse in Britannia; cujus rei me tunc ignarum esse facile judicari potest ex Epistola à me datâ A. D. decimum quintum Julii An. 1674. & ex eâ, quam ad me rescripsit OLDEMBURGIUS. A. D. octavum Decembris An. itidem 1674. Nam, si OLDEMBURGIUS, & COLLINSIUS, antea de his *Seriebus* me monuissent, ille id ipsum mihi in mentem revocasset. Tunc igitur tantum aliqua de *Seriebus* audivi; sed adhuc nesciebam tum rationem extrahendi Radices *Æquationum per Series*, tum *Regressionem*, aut *Extractionem Æquationis infinitæ*. Aliquantisper tunc eram harum rerum rudis. Attamen, statim inveni meam Methodum generalem per *Series* arbitrarias; & demum perveni ad meum Calculum Differentialem, ad quem penitiùs introspicendum non inutilia fuerunt ea, quæ, penè puer, observaveram de *Differentiis Serierum numeralium*; Nam, ad hunc Calculum perveni, non per *Linearum Fluxiones*, Sed per *Numerorum Differentias*; animadvertens tandem, quod hæc *Differentiæ applicatæ Quantitatibus* perpetuò crescentibus, evanescent. relative
adi

ad Quantitates differentes, quanquam super sint in Seriebus numerorum. Et hanc viam magis analyticam existimo. Cùm geometricus Differentiarum Calculus, qui idem est ac Calculus Fluxionum, sit casus peculiaris Calculi analytici Differentiarum in genere, qui casus peculiaris commodior fit ob Differentias evanescentes.

Deinde NEWTONUS affert loca, in quibus concedo eum novisse Calculum meo Differentiali similem; sed meminerit, quæso, se mihi tantundem tribuisse; si verò illi palinodiam canere licet, cur ego veter? Præcipuè post verisimilitudines à BERNOULLIO observatas. NEWTONUM adeò candidum putaveram, ut nudum ejus verbum fidem apud me faceret; sed dubitare, (ut æquum est,) coepi, & ex quo illum conniventem vidi in accusationibus, quas ipsemet falsas sciebat.

Hodie non possum neque fateri, neque diffiteri me scripsisse, aut recepisse Epistolas datas ante hos quadraginta annos, ejusdem tenoris, ac quæ editæ sunt. Cogor me referre ad ea, quæ sunt in scriptis allatis, sed nihil contra me invenio in Epistolis datis A. D. decimum quintum Aprilis, & vicesimum Maii An. 1675, ac vicesimum quartum Octobris An. 1676, quas NEWTONUS allegat, præter Interpretis mendacia. Si quas Demonstrationes, aut Methodos perveniendi ad aliqua, ad quæ proprio Marte pervenire facile potuissem ab OLDEMBURGIO petivi, ideo tantum, puto, feci, quia tunc rebus à Mathesi valde diversis me totum dabam, vivens scilicet *Latetia Parisiorum*, & quia à Calculis, quorum longitudine terrebar, vehementer abhorrebam. Exempli gratiâ, credo me ante diem duodecimum Maii An. 1676 adeptum fuisse meam Methodum *Seriei* arbitrariæ, quâ manuduci potuissem ad *Series*, quarum Demonstrationem postulabam. Nam, Serie arbitrariâ utor in veteri illo libello de Quadraturâ Arithmeticâ, quem perfeceram antequam à Galliâ exiissem. Tamen esto; alteri debeam *Series* de quibus meminit hæc Epistola, & quas me etiam ignorasse credo Anno 1674.

Cùm non satis intelligerem, quæ NEWTONUS dicit de *Actu Lipsiensibus* Maii Ann. 1700., librum illum consului, & perspicio eum non bene, quæ ibi dicta sunt, percepisse. Nam, illic ne verbum quidem de inventione novi Calculi Differentialis; sed agitur de arte quadam peculiari pro *maximis*, & *minimis* determinandis.

D d.d. 3.

quæ:

quæ ab eo non pendet, & mihi in mentem venerat multo antequam BERNOULLIUS proponeret Problema de breviori descensu, & quam existimaveram NEWTONO quoque in mentem venisse, cum daret Figuram suæ navis in *Principiis* suis. Itaque volui dicere eum se palam ante me ostendisse hujus Artis compotem, quod affirmare nequibam de Calculo Differentiarum, & Fluxionum, quia ejus utilitatem propalaveram ante libri illius editionem. Hæc ars peculiaris de *Maximis, & Minimis*, necessaria non est, quando agitur de Quantitate simplici, tunc enim FERMATII Methodus, perfectior reddita novis Calculis, sufficit; sed aliud quid requiritur, cum petitur tota Figura, quæ omnium optimè efficere debet id, quod postulabatur.

Hic NEWTONUS novam accusationem temerè intentat, quæ in eum recidet. Affirmat quòd, quæ ipsi communicanda scripseram ad OLDEMBURGIUM Anno 1677, omnino sunt Methodus *Baroviana* personata. Cum autem NEWTONUS fateatur in primâ *Principiorum* suorum Editione, *paginis 253, & 254 me ipsi* (tunc *Methodum communicasse à Methodo ipsius vix absudentem, præter quàm in verborum, & notarum formulis*; sequitur quòd ejus Methodus pariter nihil est nisi *Baroviana* personata.

Existimo illum, & me faciliè absolutos iri ab hac accusatione; nam, vah! Quot legent librum *Barovianum*, nec in eo nostrum Calculum deprehendent! Verum quidem est, quòd TSCHÜRNAUSIUS; qui paulò seriùs hujus Calculi commoda perspexit, contendit omnia hæc adipisci posse Methodis *Barovianis*: Ut Abbas CATELANUS Gallus dixit *Analyfim Cartesianam* ad hæc omnia sufficere; quod facilius dici quàm ostendi poterat.

Si quis autem nostrum aliquid est à BAROVIO mutuatus, verisimiliùs est id fecisse NEWTONUM, qui eo præceptore usus est, quàm me, qui, (ni malè recordor,) libros BAROVII non videram antequàm iterum essem in Britannia, & qui eos nunquam attentè legi, quia, cum in iis oculos iniecissem, perpexi, quòd considerans Triangulum Characteristicum, (cujus Latera sunt Elementa Abcissæ, Ordinatæ & Curvæ,) simile alicui Triangulo assignabili, perveneram quasi ludens ad Quadraturas, Superficies, & Solida, quæ conficiunt unum ex majoribus Capitibus Lectionum *Barovianarum*. Præterquàm, quod ad meum Geometricum Differentiarum Calculum.

Calculus non veni, quàm post cognitam earum utilitatem, (quemlibet minoris momenti,) in Numeris; ut indicare possunt primæ meæ Litteræ, quæ sunt in *Commercio Epistolico*. Fieri potest, ut BAROVIVS, plura sciens, quàm quæ Libro mandarat, vias, quas ignoramus, NEWTONO aperuit. Et si audaculis quibusdam similis essem, puris, & levibus indiciis nixus, affirmare possem, quòd NEWTONVS à BAROVIO Calculum Fluxionum, (quicumque demum illi sit,) didicerat.

Quæ Anno 1676 dixi de Problematibus, quæ resolvi non poterant neque per Æquationes, neque per Quadraturas, intelligenda certè sunt de Æquationibus tum vulgatis, de iis videlicet, quas præbet Analysis communis; cujus indicium est, quòd addo Quadraturas, velut quid majus his Æquationibus: at Æquationes differentiales etiam ultra Quadraturas extenduntur; & satis constat me loqui voluisse de Problematibus ipsis, qui egent harum Æquationum, tum ignotarum. Hæc objectio jam erat inter Adnotationes ad *Commercium*; sed NEWTONUM huc usque descendere posse non credideram.

Est in Epistolâ à me datâ ad Diem vicefimum septimum Augusti An. 1676. pag. 65. * in *Commercio Epistolico*,) quo inducor ad credendum me tunc esse compotem Calculi Differentialis; ibi enim assero me statim certâ *Analysis* resolvisse Problema (certâ *Analysis solvi*), quod BEAUNIVS CARTESIO proposuerat. Hæc autem Analysis erat Calculus Differentialis; sine quo tamen solvi potest illud Problema; & solvisset, puto, HUGENIVS, & BAROVIVS, si opus fuisset, ut plura alia; sed merus jocus est meâ Notatione. Exiguum mendum perspicio in hac paginâ; legitur enim † LUDUS *natura*, pro HUIUS naturæ; sed hoc vetus est, & esse puto in meâ Epistolæ exemplo ad NEWTONUM missò; NEWTONUS enim huic Epistolæ respondens litteris datis A. D. vicefimum quartum Octobris An. 1676. (paginâ 86. in *Commercio*.) ait *Hos casus vix numeraverim inter ludos naturæ*. Non intellexeram, quæ dicere voluerat, sed nunc perspicio erroris fontem.

Hodie nequeo dicere, utrùm animadverterim verba WALLESIJ; in quibus asserit NEWTONUM jam anno 1666. cognovisse Methodum Fluxionum ††. Sed, etiamsi animadvertissem, nihil contra, puto,

* Primæ editionis, secundæ verò pag. 129.

†† Hæc sunt infra.

† Vide supra Opus. XI. Art. I. pag. 326.

puto, dixissem. Tunc enim unum NEWTONI verbum fidem faciebat, sed ejus facta me de hoc cautiorem reddiderunt.

NEWTONUS ait se à me plagiatis insimulari. Sed ubi hoc feci? imò ejus Fautores visi sunt hanc accusationem in me intentare, & ipse in hoc connivit. Nescio an omnino consentiat omnibus iis, quæ illi ediderunt; sed assentior ei dicenti, quòd malignitas accusantis de hoc, & non probantis, Accusatorem calumniæ reum facit.

In extremo suæ Epistolæ capite, me aggressorem appellat; ego verò in hujus initio contrarium ostendi. Hoc præludium facile terminari poterit. Malè aliquid intellectum fuit, sed non meus est error.

Tuus &c.

POST-SCRIPTUM.

Solvisti Problema, quod NEWTONI Asteclæ solvere hæcenus non potuerant; nam, responsum à me extorsisti missâ Epistolâ ipsiusmet NEWTONI. Quo factò, adhortationes omnes supervacaneæ sunt. Si Quæstio fuisset tantum, uter NEWTONUS, an ego, prior invenisset Calculum, de quo disputatur, planè non laborassem. Difficile est enim definire, quid, & quandiu uterque silentio texisse potest. Sed quidam NEWTONI Fautor contendit, me à NEWTONO Calculum hunc didicisse; attamen postea verisimilius visum est nonnullis, & ipsi BERNOULLIO, rationem computandi, quam NEWTONUS edidit in WALLISII operibus fabricatam esse ad mei Differentialis Calculi jam editi imitationem. Nec vola nec vestigium Calculi Differentiarum, vel Fluxionum apparet in veteribus NEWTONI Epistolis, quas vidi; nisi fortè in eâ, quam dederat A. D. vicesimum quartum Octobris An. 1676; ubi etiam per ænigmata loquitur; & horum ænigmatum solutio, ab eo data decem post Annis, ostendit quidem aliquid, sed non omne id, quod postulari posset. Nihilominus, in NEWTONUM propensus, olim adeò facilis fui, ut loquerer tanquam si omnia ab eâ detegerentur, & me secuti alii idem dixerunt. Sed humanitas mea malè remunerata fuit. &c.

ART. II.

ART. II
ANIMADVERSIONES
NEWTONI

In superiorem LEIBNITII Epistolam

A D
ABBATEM CONTI

A. D. 12. Maii 1716.

DEfendit LEIBNITIUS in Epistola datâ A. D. undetricesimum Decembris An. 1711. locum, qui est in *Actis Lipsiensibus Januarii 1705. paginis 34. & 35.*; & sic proprium fecit, † nunc autem illum molliorem reddere frustra conatur, contendens verba *adhibet*; *semperque adhibuit* malignè interpretari verbo *substituit*; sed ab explicatione, quam obtrudere vellet, arcet vim terminorum *igitur*, & *quemadmodum*, à quorum primo verba, *semperque adhibuit*, sunt præcedentium confectarium; ab ultimo verum æquivalentia ipsi *substituit*; si autem reponas hæc omissa, videbis sustineri non posse sensum, quem his verbis nunc tribuere conatur. Merito igitur dixi eum se accusatorem in me gessisse. In duabus Literis ab eo datis ad SLOANE A. D. quartum Martii, & undetricesimum Decembris An. 1711, urgebat Regiam Societatem ad KEILIIUM condemnandum, & me volebat cogere ad sententiam meam aperiendam, licet ab hoc negotio prorsus abstinuissem.

En

† In hac Epistola ait LEIBNITIUS. *Frustra ad Exemplum Actorum Lipsien. sum provocat. (KEILIIUS,) ut sua dicta excuset; in illis enim circa hanc rem quicquam cuiquam detractum non reperio, sed potius passim suam cuique tributum. Commerc. Epistol. N°. LXXXV. pag. 239. Edit. secundæ.*

Is. Newtoni Opuscula Tom. I.

E c c

En verba secundæ Epistolæ * : *itaque vestra equitati committo ; an non coercenda sint vana, & injusta KEILII vociferationes, quas ab ipsa NEWTONO, Viro insigni, & gestorū optimè conscio, improbari arbitror ; ejusque sententia sua libenter daturum indicia mihi persuadeo.* Honestissima verba ; sed quæ sibi volunt, oportere, ut aut damnem KEILIIUM, aut cum LEIBNITIO contendam, quod accidit. Ille igitur Aggressor est. Hic enim omnes optimè norunt, me semper diligenter has lites vitavisse, quoad Regia Societas, & ego nos iis immiscere coacti fuimus.

In Epistolâ datâ A. D. quartum Martii 1711. N. S. à Regiâ Societate enixè rogavit, ut partibus inauditis KEILIIUM condemnaret ; & cum KEILIIUS † pro causâ suâ dixisset, LEIBNITIUS responsurum negavit **, & contendit iniquum esse instare ut responderet ; at interea ipse pervicaciter instabat, ut KEILIIUS damnaretur. †† Ratio hæc, quâ LEIBNITIUS se gerebat, coegit Societatem ad convocandum Confessum compositum ex ejus Membris, expensurum vetera Scripta, quæ ad rem facere poterant, & de hoc relaturum. Quod si eo inscio factum est, ejus culpa est. Nam, quæ ratio habenda erat hominis, qui à Societate vi rem extorquere volebat, contendens iniquum esse petere, ut *candorem* suum Apologiâ defenderet, & apud eam, *tanquam pro Tribunali* litigaret ? si ei copia facta non est indicandi eos, quos à Confessu remotos vellet ; id ideo factum est, quia se defendere recusabat ; quia Confessum cogere, vel eo non assentiente, licebat ; quia ipsi jus nullum erat criminandi quæ gesta sunt, ut ante-facta cognoscerentur. In eum nihil hætenus decretum est, quia Confessus non erat hominum sub jurejurando sententiam dicentium conventus, neque Regia Societas Collegium Judicum. Confessus satis habuit examinare Epistolas, & alia vetera,

* En verba primæ. KEILIIUS in hoc ipso volumine (Transact Philosoph.) mens. Sept. Oct. 1708. pag. 185. *renovare ineptissimam accusationem visus est, cum scripsit Fluxionum Arithmeticam à NEWTONO inventam, mutato nomine, & notationis modo à me editam fuisse, . . .* Id quidem quàm falsum sit nemo melius ipso NEWTONO novit . . . æquum esse vos ipsi, credo, judicabitis, ut KEILIIUS testetur publicè, non fuisse sibi animum imputandi mihi, quod verba insinquare videntur. Comm. Epistol. N°. LXXX pag. 224. Edit. secund.

† Vide Comm. Epistol. N°. LXXXI. pag. 226. Edit. seq.

vetera Scripta, de iis solum judicavit, & LEIBNITIO reliquit plenam libertatem se defendendi si potest. Satis est *Regiam Societatem* curavisse edendam hujus confessus relationem una cum Scriptis, quibus innititur; & LEIBNITIUM nihil probare potuisse contra KEILIIUM, licet jam ab horum editione fluxerint tres anni, & quatuor menses.

Ait LEIBNITIUS, quod, cum ejus Epistola, quam famosam nominavi, acerbior non sit iis, quæ in eum edita sunt, de ea queri nullo modo possum: sed acerba est ea Epistola, quia referta accusationibus, & considerationibus injuriis, omni probatione destituta; quæ scribendi ratio semper habita est indignissima: & usurpata in malis causis defendendis. *Commercium* verò acerbum non est, nisi quia continet facta, quæ divulgari permittunt jus & æquum. Epistola edita fuit clam, & quasi per insidias; ut passim sit de libellis *famosis*; compressum fuit nomen Auctoris, & *Mathematici*, cujus Epistola illi adnexa fuerat; æquè ac Typographi & Urbis, ubi impressa fuerat, & vix post duos ab editione annos audivimus Mathematicum, illum, qui dederat Epistolam junctam illi de quâ agitur, esse *Johannem BERNOULLIUM*. *Commercium* autem palam editum fuit *Londini* jussu Regiæ Societatis.

LEIBNITIUS ponens me non ignorare, quod Epistola data A. D. septimam Junii 1713, & inserta ei, de quâ memini, erat à BERNOULLIO, ægre fert me eum dixisse *Mathematicum*, aut *qui dicitur Mathematicus*; quod certè non dixi ut BERNOULLIUM deprimerem. Sed, cum *Mathematicus* ille, cujus hæc Epistola est, BERNOULLIUM memorans, (& quidem cum elogio, eum enim dixerat *eximium Mathematicum*), se ipse à BERNOULLIO diversum fecisset; & cum LEIBNITIUS nuper

E e e 2 rursus

** Vide Comm. Epistol. N°. LXXXV. pag. 239. Edit. sec.

†† Ait enim. *Quæ Johannes KEILIIUS nuper ad te scripsit, candorem meum apertius, quàm antè oppugnant; quem ut ego hac ætate, post tot documenta vitæ, Apologiâ defendam, & cum homine docto, sed novo, & parum perito rerum ante actarum cognitore, nec mandatum habente ab eo, cujus interest, tanquam pro Tribunali litigem, nemo prudens æquisque probabit.* Comm. Epistolæ. N°. LXXXV. pag. 239. Edit. secund.

rurfus. edens hanc Epistolam sub nomine BERNOULLII, & citationem supprimens, afferuisset eam à BERNOULLIO datam; quem crederem? An *Mathematicum*, qui se BERNOULLIUM non esse innuebat? An LEIBNITIUM, qui *Mathematicum* hunc esse BERNOULLIUM ipsum contendebat?

BERNOULLIUS LEIBNITIO debet Methodum differentialem; est princeps ejus Discipulorum; pro eo pugnavit in *Actis Lipsiensibus*, antequàm vidisset *Commercium Epistolicum*: Tunc ergo erat *homo novus*, & *rerum ante-actarum parùm peritus*, ut LEIBNITIUS KEILIO objecerat. Ad se ipsum defendendum scripsit, quæ ex illo tempore scripsit, & tota ejus Matheseum peritia non obstat, quin ad partes accesserit in hac contentione; igitur in hac causâ Judex integer federe non potest.

Queritur LEIBNITIUS Confessum à scopo aberrasse, cùm se ad *Series* infinitas convertit; sed in mentem revocare debuerat duas Methodos, quibus utor, esse velut duos ramos unius ejusdémque generalis Methodi Analyticæ. Eas junxeram in libello de Analyfi, quem BAROVIVS miserat COLLINSIO Anno 1669; eas invicem miscueram in Opusculo, quod scripseram Anno 1671, ut monueram in Litteris A. D. decimum Decembris An. 1672. & vicesimum quartum Octobris An. 1676. In Epistolâ à me datâ A.D. decimum tertium Junii An. 1676. dixeram meam Methodum *Serierum* se extendere ad ferè omnia Problemata; sed eam generalem non evadere sine auxilio aliarum Methodorum; quibus intelligebam, ut declaratum est in Epistolâ sequenti, * Methodos Fluxionum, & Serierum ad arbitrium assumptarum. Nunc autem auferre mihi has duas Methodos, nihil aliud est quàm me rejicere ad Methodum Serierum, id est, ad Methodum minùs generalem. In Epistolâ meâ datâ A. D. vicesimum quartum Octobris An. 1676 omnes has Methodos simul sumptas appello meam Methodum generalem, ut videri potest in *Commercii Epistolici* paginâ 86, lineâ 6. **. Cùm autem LEIBNITIO placuerit meam Methodum generalem in frustra discerpere, & mihi eripere nunc partem hanc, nunc illam, & hoc

* Datâ A. D. 24. Octobris An. 1676. Vide supra paginâ 356.

** Primæ Edition., & secundæ pag. 189. lin. 14. vide supr. Opusc. XL pag. 356.

hoc pacto reliquum mutilare, legitimam occasionem præbuit *Regia Societati*, ut Methodum hanc totam simul perperderet. Animadvertendum etiam est, quòd semper sibi ipsi testis est; Sed Testium fides ad trutinam revocari solet.

Contendit Conventum à Regiâ Societate convocatum omisisse plura, quæ faciebant contra me, & edidisse omnia, quæ in eum converti poterant *interpretationibus à verborum sensu alienis*. Hæc probaturus affert in penultimis Litteris monumentum meæ ignorantiae; quod à Confessu compressum dicit; sed editum nunc fatetur, seque per errorem contra affirmavisse. Habet autem aliud, quod afferat, me scilicet falsum esse in quâdam Epistolâ ad COLLINSIUM datâ, quòd invenire non poteram secunda sphæroidum segmenta; quem locum prætermisum asserit in Commercio. Melius quidem, puto, prætermisus fuisset; nihil enim ad rem facit; sed res longè aliter se habet; Siquidem COLLINSIUS in Epistolâ datâ ad Jacobum GREGORIUM A. D. vicesimum quartum Decembris An. 1670, & in alterâ ad BERTETUM datâ A. D. vicesimum primum Februarii An. 1671., (quæ ambæ sunt in Commercio paginis 24; & 26†,) ait Methodum meam ire ad secunda segmenta Solidorum Rotatione genitorum. Idem LEIBNITIO significaverat OLDEMBURGIUS Epistolâ ad Leibnitium datâ A. D. octavum Decembris An. 1674, ut videri potest ex *Commercio paginâ 39*†† Igitur LEIBNITIUS accusavit Conventum à Regiâ Societate convocatum, licèt certus non esset de suæ accusationis veritate; quæ est summa temeritas, ne quid acerbius dicam. Adeò abfuit Confessus ad se iniquum LEIBNITIO præstandum, ut tacuerit enim tunc Geometriæ ignarum, & omiserit plura, quæ contra eum fecissent; qualia sunt duæ Epistolæ quæ tum apud me erant * nec non pars Præfationis additæ à VALLISIO I. Tomo suorum Operum Mathematicorum **. Insuper observare poterant, quòd Exemplum

E e e 3 Episto-

† Primæ Edit., secundæ verò paginis 96., & 100.

†† Primæ Edit., & secundæ pag. 116.

* Hæ duæ Epistolæ datæ ad NEWTONUM à LEIBNITIO & WALLISIO Annis 1693. & 1695. sunt in adnexâ Appendice. Vide infra.

** Hæc etiam est in Appendice. Vide infra.

Epistolæ à GREGORIO datæ A. D. 5. Septembris Ann. 1670. missum fuit ad LEIBNITIUM mense Junio An. 1676. cum collectione Epistolarum *Gregorianarum*.

Confessus affirmat in Relatione sua, quòd omnia, quæ pertinebant ad negotium iis commissum, extracta fuerant ex Epistolis, Scriniis, & aliis veteribus Scriptis, quæ habebat pro fidelibus, & authenticis. LEIBNITIUS eum criminatur, quòd non ediderit Epistolas totas, tum quæ spectabant ad negotium de quo agitur, tum quæ ab eo prorsus erant alienæ; tanquam si non liceret afferre, aut extrahere locum aliquem è libro quopiam, ipso toto libro non allato. Queritur ergo non satis amplum esse *Commercium Epistolare*; quod tamen nimis amplum ei videtur, cum respondere debet, & ait illud postulare responsum ejusdem voluminis. Oportet igitur remove omnes authenticas tabulas, ut quæstio degeneret in frivolas contestationes de Philosophiâ, & aliis rebus nihil ad rem facientibus. Oportet, ut eximius Mathematicus ille, qui, ut melius videatur Judex integer, abscondit nomen suum in Epistolâ ad LEIBNITIUM datâ A. D. septimum Junii An. 1713., nunc in apertum prodeat, se certamini immisceat, per LEIBNITIUM omnes *Britanniæ* Mathematicos provocet; tanquam si prælium singulare, aut forte pugna inter eos, quos ille vocat meos Milites emissarios, & illum Discipulorum exercitum, quem LEIBNITIUS jactat, melius definire posset utrius causa melior est in hac contentione, quàm vetera & authentica Scripta; & tanquam si in posterum Mathesis referta esse deberet amplissimis Equitum errantium gestis, & non rationibus, ac demonstrationibus.

Fatetur LEIBNITIUS, quòd, cum iterum esset in Britannia, vidit apud COLLINSIUM nonnullas ex meis Epistolis, & inter alias, illas, in quibus agitur de *Seriebus*, & nominatim meminit de duabus, nempe de illâ, quæ data fuerat A. D. vicesimum quartum Octobris An. 1676. & de illâ, in quâ fateor, ut ipse dicit, ignorantiam meam circa secunda Segmenta. Unde sequitur, quòd non potest dubitari, quin præcipuè optaverit videre Epistolam, in quâ erant præcipuè meæ Series, eæ præsertim, quæ pertinebant ad rationem inveniendi *Arcûs è Sinu*, & *Sinûs ex Arcu*, earumque Serierum Demonstrationem; quam quidem Epistolam, (quæ
incri-

inscribitur *Analysis per Aequationes numero Terminorum infinitas*,) ut sibi à COLLINSIO impetraret, OLDEMBURGIIUM obsecraverat paucos ante menses. Nihilominus dicit se nescire, ubi applicaverim Methodum Fluxionum, nec ejusdem vestigium se videre in *Commercio Epistolico*; in quo tamen sunt tum hæc *Analysis*, cum Epistolæ à me datæ A. D. decimum Decembris An. 1672; decimum tertium Junii An. 1676; & vicesimum quartum Octobris Anni pariter 1676. Puto eum ideo dicere, quòd hanc Methodum ibi non videt, quia nulla ibi est Littera puncto aucta. Eodem ratiocinio ipse, & BERNOULLIUS, conficere possunt, quòd Methodus Fluxionum omninò abest ab Introductione à meum Libellum de *Quadraturis*.

Asserit quoque se non videre, ubi explicuerim Methodum, quam mihi tribuo, sumendi scilicet Series Arbitrarias; sed, si perspicere dignatur *Commercii Epistolici* paginas. 56, & sequentes usque ad 86, videbit me compotem fuisse hujus Methodi Anno 1676. five potius quinque Annis antè. Vidisse etiam potest in secundo volumine Operum WALLISII *paginâ* 393, *lineâ* 32. quòd hæc Methodus non eget explicatione ampliori, quàm illâ, quæ à me data, & ibi relata est. Fieri quidem potest, (non inficior,) ut LEIBNITIUS hanc Methodum proprio ingenio detexerit; sed certè postquam ego inveneram, & omnes norunt secundis Inventoribus nullum in inventa jus esse.

Contendit, quòd in meo *Principiorum* Libro, *paginis* 253. & 254. concessi eum habuisse Calculum Differentialem sine me, & ait, quòd mihi nunc tribuens ejus inventionem, revoco, quæ concesseram; sed in Articulò, quem citat, nec verbum quidem invenio, quod pro eo faciat. Quinimo ibi significo, me de meâ Methodo monuisse LEIBNITIUM antèquam ipse me de suâ monuisset; & ei necessitatem impono probandi se hanc Methodum invenisse antè diem, ad quem data fuerat mea Epistola, id est, octo menses saltem ante diem, ad quem ipse suam dederat. Insuper, cum ibi rejiciam ad Epistolas, quæ inter me, & LEIBNITIUM intercesserant decem annis antè, Lectoribus relinquo curam consulendarum harum Epistolarum, quæ explicare possunt Articulum, de quo disputatur. Ex his;

his enim Epistolis videre poterant, me quinque annis antequàm scriberentur, (id est, anno 1671,) composuisse librum de hac, & Serierum Methodis simul junctis. Itaque Articulus ille, quem affert, satis indicat, quid de hac re sentiendum sit; sed paucis verbis, quia libri illius scopus non erat hujus negotii discussio.

Ait, quòd, cùm primò esset Londini mensibus Januario, & Februario Anni 1673, prorsus ignorabat Series infinitas, & Geometriam sublimem, neque COLLINSIUM noverat, ut *malignè fingitur*. Sed qui finxit, aut quæ fingendi necessitas? Prorsus nescio. Tunc temporis jam PELLIIUS ei locutus fuerat de Serie, quam MERCATOR invenerat pro quadrandâ *Hyperbolâ*; secum *Lutetiam Parisorum* attulit MERCATORIS Librum, quamquam Geometriam sublimiorem adhuc ignorabat, & ii, quibus COLLINSIUS communicaverat meas, & *Gregorianas* Series, poterant aliquid de illis ei dixisse, licèt COLLINSIUM ipsum non nosceret.

Dicit, quòd, postquam è *Londino Lutetiam* se contulisset, prius scripsit Epistolas de rebus à Geometriâ alienis, donec hanc eum HUGENIUS docuisset; quòd invenit Circuli *Quadraturam Arithmeticam* sub finem Anni 1673; quòd de illâ scribere cœpit ad OLDEMBURGIUM Anno sequenti; quòd paulò post invenit Methodum generalem Seriei ad libitum assumptæ, & *Calculus Differentialem* Anno 1676, quem deduxerat è Seriebus numeralibus, ubi Differentiæ considerantur; & quod verba *Certâ Analyfi*, quæ sunt in Litteris ab eo datis A. D. vicesimum tertium Augusti Ann. 1676, intelligenda sunt de Analyfi differentiali. Sed nonne, & ego æquè benè mihi testis esse possum, & affirmare, quòd inveneram Methodum Serierum & Fluxionum Anno 1665; quòd eam protuli Anno 1666; quòd etiam nunc apud me sunt plura scripta mathematica, Annorum 1664, 1665, & 1666; quorum nonnullis dies adscriptus est, & inter quæ unum, datum A. D. decimum tertium Novembris 1665, continet Methodum directam Fluxionum his verbis.

P R O.

P R O B L E M A.

Datâ Æquatione exprimente Relationem duarum, aut plurium, linearum x ; y ; & z &c. simul descriptarum à duobus, aut pluribus Mobilibus A ; B ; C ; &c. invenire Relationem celeritatum p ; q ; r ; earumdem.

S O L U T I O.

Pone omnes Æquationis Terminos ad unam eandemque partem, ita ut sint æquales nihilo; multiplica quemque Terminum per toties $\frac{p}{x}$, quot Dimensiones habet x in illo Termino; Deinde, multiplica quemque Terminum per toties $\frac{q}{y}$, quot Dimensiones habet y in illo Termino; Tertiò multiplica quemque Terminum per toties $\frac{r}{z}$, quot Dimensiones habet z in illo Termino &c. & Summa horum Productorum erit æqualis nihilo; quæ Æquatio dat Relationem ipsarum p ; q ; r ; &c.

Addere possum, quòd hæc Solutio ibi illustratur pluribus Exemplis; demonstratur; applicatur ad Problemata, quæ pertinent ad Tangentes, & Curvaturas Curvarum; quod aliud scriptum, datum A. D. decimum sextum Maii Ann. 1666, continet generalem Methodum resolvendi Problemata ad Motum spectantia explicitam septem Propositionibus, quarum ultima est ipsam Problema, de quo supra, scriptum A. D. decimum tertium Novembris An. 1665; quòd in Libello, scripto mense Novembri 1666, eadem septem Propositiones repetuntur, sed septima ita extenditur, ut eam non morentur neque Fractiones, neque Quantitates surdæ, neque denum eæ, quæ nunc dicuntur Transcendentes; quòd hic Libellus insuper continet octavam Propositionem, quæ complectitur inversam Fluxionum Methodum, qualem tunc temporis habebam; id est, quatenus pendet à Figurarum curvilinearum Quadraturis, à tribus Regalis, quibus innititur mea Analysis per Æquationes numero Terminorum infinitas, & à fere omnibus aliis Theorematis, quæ sunt in Scholio decimæ Propositionis mei Libri de Quadraturâ.

Is. Newtoni Opuscula, Tom. I

F f f

dratum

draturis; quòd in eo Libello Area proveniens ab aliquò ex Ordinatz Terminis, quoties exprimi nequit Analyfi vulgari, exponitur symbolo \square ante hunc Terminum scripto; Exempli gratià, si Abscissa est x , & Ordinata $ax - b + \frac{bb}{a+x}$, Area totalis est $\frac{1}{2} \times$
 $axx - bx + \square \frac{bb}{a+x}$; quòd ibi aliquando usurpavi litteras unico Puncto notatas pro Quantitatibus Fluxiones primas involventibus, aliquando easdem litteras, sed duobus Punctis auctas pro Quantitatibus Fluxiones secundas involventibus; quòd huic Libello innitebatur majus quoddam opus, quod scripseram Anno 1671 & de quo memineram in Epistolà datà A. D. vicesimum quartum Octobris An. 1676, & quod initium ducebat à Reductione Quantitatum finitarum in Series convergentes, & à Solutione horum duorum Problematum.

II.

Relatione Quantitatum Fluentium inter se datà, Fluxionum Relationem determinare.

I II.

Exposità Æquatione Fluxiones Quantitatum involventes, invenire Relationem Quantitatum inter se; & quòd hunc Librum scribens adeò generalem, Methodis Serierum, & Fluxionum simul junctis, Analyfim meam effeceram, ut ferè ad omnigena Problemata se extenderet; quod innueram in Litteris datis A. D. decimum tertium Junii An. 1676; & quòd hæc est Methodus, quam descripseram in Epistolà à me datà A. D. decimum Decembris An. 1672.

Anno 1684. LEIBNITIUS vulgavit tantum Elementa Calculi Differentialis, quem applicavit ad aliquas Quæstiones de Tangentibus, & ad quasdam alias, quæ pertinent ad Methodum de *Maximis, & Minimis*, quod FERMATIUS, & GREGORIUS fecerant ante eum; & ostendit quomodo in his Quæstionum generibus procedi possit non sublatiis Quantitatibus, irrationalibus; sed Problemata sublimioris Geometriæ non attigit. Liber de *Principiis Mathematicis* continet prima specimina, (quæ quidem edita sint,) hujus;

NEWTONI ANIMAD. IN SUPER. EPIST. 411

hujus Calculi applicati ad profundiora Problemata; & sic acceperam, quæ LEIBNITIUS dixerat in *Actu Lipsiensibus* Mensis Maii An. 1700 *paginâ* 206. Sed LEIBNITIUS animadvertit, quòd ea, quæ tunc dixerat, intelligenda sunt de peculiari quâdam Arte circa *Maxima, & Minima*, quam mihi patuisse fatetur, cum indicarem in meis *Principiis* Figuram Navis, aut Solidi minimè omnium resistentis. Sed, cum hæc Ars Methodum Differentialem cognitam supponat, quinimò cum ultra ejus fines progrediatur; cum alioquin huic Arti LEIBNITIUS, ejusque Discipuli debeant Solutionem Problematum, quæ pluris ille facit, cum denique LEIBNITIUS appellet hanc Artem Methodum maximi momenti, & vastissimæ extensionis, mihi satis est eum fallum esse, quòd ego primus opere vulgato ostendi me hanc Artem novisse.

Anno 1689. LEIBNITIUS pro suis edidit præcipuas Propositiones libri de *Principiis*, idque tribus scriptis, quorum tituli *Epistola de Lineis Opticis: Schediasma de Resistentiâ medii, & motu Projectilium gravium in medio resistente; & Tentamen de Motuum Cælestium Causis*: has Propositiones à se inventas contendens ante editionem Libri de Principiis; &, ut melius sibi vindicaret præcipuam ex his Propositionibus, censuit addendam Demonstrationem, quam ipse extruxerat; quæ cum erronea esset, ipse suam causam prodidit, & ostendit se non intellexisse rationem procedendi ad secundas Differentias. Hoc fuit secundum specimen palàm editum hujus Methodi applicatæ ad sublimiorem Geometriam. Hactenus parum cognita fuerat, sed uno, aut altero Anno præ omnium manibus esse coepit.

Vulgaverat BAROVIVS Anno 1670. differentialem suam Methodum pro Tangentibus; GREGORIUS hanc Methodum suæ conferens sibi comparavit Methodum generalem, quæ Calculo non indigebat, de quâ COLLINSIVM certiore fecit Epistolâ datâ A. D. quintum Septembris An. 1670. SLUSIVS mense Novembri An. 1672. cum OLDEMBURGIO communicavit Methodum similem. Ego verò ad COLLINSIVM misi Methodum iis proximant Litteris datis A. D. decimum Decembris 1672, & addidi me de eâ locutum fuisse BAROVIO dum *Lectiones suas Geometricas ex*

cudendas curabat, & intellexisse Methodos GREGORII & SLU-
 SII cum meâ convenire; hanc autem, nihil esse nisi Ramum, aut
 Corollarium cujusdam Methodi generalioris, quæ sine molesto com-
 puto complectebatur non solum Tangentes, sed alia Problemata
 abstrusiora, ut sunt, quæ spectant ad Curvarum Curvaturas, Areas,
 Longitudines, Centra Gravitatis &c.; & id quidem non remotis ab
 Equatione Quantitatibus irrationalibus. Addidi etiam me hanc Me-
 thodum conjunxisse cum Methodo Serierum infinitarum, in Libello
 scilicet, quem scripseram An. 1671. OLDEMBURGIVS, mense
 Junio 1676. ad LEIBNITIUM misit Exempla harum duarum Epis-
 tolarum cum Excerptis, ex GREGORII Litteris; pro quibus nihil
 non jam factum aut hisce ipsis Litteris renunciatum rependit LEIB-
 NITIUS Litteris datis A. D. vicesimum primum Junii 1677; cum
 Methodus differentialis pro Tangentibus, quam tunc misit esset ip-
 sissima *Baroviana*, quam celaverat novâ notatione, & extenderat
 ad Methodos *Gregorianam* & *Slusianam* pro Tangentibus, ad Equa-
 tiones Quantitatibus irrationalibus implicatas, & ad simpliciorum
 casum mearum Quadraturarum. Mihi verò, idem obijci nequit;
 nam, BAROVIVS viderat libellum meum de *Analyfi* Anno 1669, &
 sibi placuisse testatus fuerat; & è meâ Methodo generali dedu-
 xeram Methodos GREGORII, & SLUSII pro Tangentibus, ante-
 quam *Lectiones Geometricæ* ederentur. Tunc LEIBNITIUS
 ignorabat non solum Geometriam sublimiorem, sed etiam Algebram
 vulgarem.

Ejus Epistola data A. D. vicesimum septimum Augusti 1676. con-
 tinet hæc verba; *Quod dicere videmini plerasque difficultates (ex-*
cerptis Problematis Diophanteis) ad Series infinitas reduci; id mihi
non videtur. Sunt enim multa usque adeo mira, & implexa, ut ne-
que ab Equationibus pendeant, neque ex Quadraturis. Qualia
sunt, ex multis aliis, Problemata Methodi Tangentium inversa.
 Cum autem respondissem hæc Problemata esse in meâ potestate, re-
 posuit Epistolâ datâ A. D. vicesimum primum Junii 1677. quod
 ego fortè intelligebam per Series infinitas, sed quod ipse locutus
 erat de Equationibus vulgaribus; quod autem responsum fuerit vi-
 deri potest in *Commercio Epistolico* paginâ 92.

Dicitur

Dicit intelligi posse, quòd, cùm scriberet Epistolam A. D. vicesimum septimum Augusti 1676, aliquatenus progressus erat in Calculo Differentiali, quia in hac Epistolâ ipse indicat se solvisse Problema *Beaunianum certâ Analyfi*. Sed quid? si ostendero hoc Problema solvi posse *certâ Analyfi* non adhibitâ Methodo Differentiali. Ad hoc enim nulla alia requiritur Analysis, quàm hæc; quòd scilicet oportet, ut Ordinata ad Curvam petitam crescat, aut descrescat in continuâ geometricâ Proportionem, dum Abscissa crescit in continuâ Proportionem arithmeticâ; & idcirco ut Abscissa, & Ordinata eandem inter se Relationem habeant, ac Logarithmus, & Numerus ei respondens. Sed hinc inferre, quòd Methodus Differentialis penitus LEIBNITIVM non latebat, idem planè esset ac asserere eam ARCHIMEDI notam fuisse, quia scivit Tangentes ducere ad Spiraalem, quadrare Parabolam, & invenit Rationem Sphæræ ad Cyliindrum; sive eam non fugisse CAVALLERIUM, FERMATIUM, & WALLISIUM, quia confecerunt plura ejusdem generis.

A P P E N D I X.

Cùm Confessus à *Regiâ Societate* convocatus edidit *Commercium Epistolicum*, non viderat Epistolas, & alia scripta, quæ apud me erant. Habebam autem duas Epistolas, alteram à LEIBNITIO datam A. D. $\frac{7}{17}$ Martii 1693, alteram verò a WALLISIO datam A. D. 10. Aprilis 1695, quæ, re postulante, jam duo sunt Anni, productæ fuerunt, perpenfæ, & repositæ in Scriniis *Regiæ Societatis*. Prima palam facit, quæ LEIBNITIUS de hac re sentiebat; cùm mea symbola ignorabat; de Methodo Fluxionum nihil sciebat, nisi quæ didicerat ex meis litteris, aliisque scriptis Anno 1676, aut antea, compositis, aut ex meis *Principiis Mathematicis*, id est, cùm nondum in mentem mihi venisse poterat voluntas eum decipiendi. Ex eâ apertè patet, quòd tunc me sibi anteferebat. Secunda verò, si conferatur cum præfatione Operum Mathematicorum WALLISII, ostendet, quid censerent Mathematici tum *Angli*, tum *exteri*, cùm audierunt hanc Methodum differentialem percrebrescere in Hollandiâ, & ejus inventionem tribui LEIBNITIO; Hic addidimus primam Epistolam totam, & alterius partem.

Eff. 3,

EPIS.



E P I S T O L A
 L E I B N I T I I
 A D
 N E W T O N U M
 I L L U S T R I V I R O
 I S A A C O N E W T O N O
 G O D E F R I D U S G U I L L E L M U S L E I B N I T I U S S . P . D

Hannoveræ $\frac{7}{17}$ Martii 1693.

Quantum tibi Scientiam rerum Mathematicarum, totiusque Naturæ debere arbitrer occasione datâ, etiam publicè sum professus. Mirificè ampliaveras Geometriam tuis Seriebus; sed, edito Principiorum Opere, ostendisti patere Tibi etiam quæ Analyfi receptæ non subsunt. Conatus sum ego quoque, Notis commodis adhibitis, quæ Differentias & Summas exhibent, Geometriam illam, quam Transcendentem appello, Analyfi quodammodo subicere; nec res malè processit. Sed à te adhuc magni aliquod expecto ad summam manum imponendam; tum ut Problemata, quæ ex datâ Tangentium proprietate quærunt Lineas, reducantur optimè ad Quadraturas; tum ut Quadraturæ ipsæ, (quod valdè vellem,) reducantur ad Curvarum Rectificationes; ubique Superficierum, aut Corporum dimensionibus simpliciores.

Sed super omnia optem, ut, Geometricis absolutis, Naturam, ut coepisti, mathematicè tractare pergas; in quo genere certè tu unus cum paucissimis ingens operæ pretium fecisti. Mirificum est, quòd invenisti Ellipses *Keplerianas* prodire, si tantummodo Attrac-

tio,

tio, five Gravitatio & Trajectio in Planetâ concipiantur. Tametsi enim eo inclinem, ut credam hæc omnia Fluidi ambientis motu five effici, five regi; analogia Gravitationis, & Magnetismi apud nos, nihil tamen ea res dignitati & veritati inventi tui detraxerit.

Quæ summus & ipse Mathematicus *Christiannus* HUGENIUS in suâ notavit Appendice Libelli de causâ Luminis & Gravitationis, expensa tibi non dubito; & sententiam tuam vicissim velim. Vestra enim amicâ collatione potissimum, qui in hoc genere eminentis, erui Veritas potest.

Cum verò maximum tu quoque lumen ipsi Dioptricæ intuleris, explicatis Colorum Phænomenis inexpectatis, velim quid sentias de *Hugenianâ* explicatione Radiationis, utique ingeniosissimâ, cum feliciter adeò prodeat Lex Sinuum. Significavit mihi HUGENIUS, nescio quæ nova Phænomena Colorum sibi à Te communicata. Ego valde optem, ut ratio Colorum, quos fixos vocant, ex apparentibus deduci possit; seu, ut ostendatur ratio efficiendi per Refractiones, ut tota aliqua Superficies certum Colorem ostendat.

In Librorum apud Anglos editorum indicibus, occurrere mihi aliquoties Libri mathematici Auctore NEWTONO, sed dubitavi an à Te essent, quod vellem, an ab alio homonymo.

HEINSIUS noster redux testis fuit benevolentiae erga me tuæ. De cultu verò meo erga Te, non ille tantum testari potest; sed & STEPNEIUS, tecum ejusdem olim Collegii habitator, nunc Magnæ Britanniae Regis negotia apud Cæsarem, nuper apud Serenissimum Electorem Brandenburgicum, curans.

Hæc scribo magis, ut studia erga Te mea intelligas, quæ nihil tot annorum silentio amittere, quam ut Tua ego studia, quibus auges humani Generis opes, interrompere velim. vacuis Litteris & supervacuis, vale.

EXCERPT-

EXCERPTUM EPISTOLÆ

A

W A L L I S I O

A D

N E W T O N U M

Datæ Oxoniæ A. D. 10. Aprilis An. 1695.

UTinam typis ederes prolixas illas duas Epistolas Junii & Augusti (Octobrem *dicere debuit*) 1676. Ex Hollandiâ certior factus sum amicos ibi tuos hoc postulare; quia notiones tuæ (de Fluxionibus) LEIBNITIO ibi ascribuntur, sub nomine *Calculi Differentialis*. Hoc ex *Hollandiâ* accepi cum totus hic Tomus, præter partem Præfationis, jam prælo subjectus esset, ita ut nihil aliud inferere hic potuerim, dum cessarent operæ, præter brevem illam, quam ibi reperies, narrationem. Non tam æquus es vel tuo vel Gentis tuæ honori, quàm oportebat; cum res quantivis pretii tamdiu in Scriniis celas, donec alii honorem tibi debitum præripiant. Conatus sum *in eo negotio debitum tibi reddere*.

En Præfationis *Wallisiana*, editæ mense Aprilis An. 1695, locum de quo supra mentio facta est.

Quæ in secundo Volumine habentur, in Præfatione eidem præfixâ dicitur. Ubi (inter alia) habetur NEWTONI Methodus de *Fluxionibus*, (ut ille loquitur,) consimilis naturæ cum LEIBNITII, (ut hic loquitur,) *Calculo Differentiali*, (quod qui utramque Methodum contulerit, satis animadvertat, utut sub loquendi formulis diversis,) quam ego descripsi (*Algebra Cap. 91. &c. præfertim Cap. 95.*) ex binis NEWTONI Litteris, (aut earum alteris,) Junii 13. & Octob. 24. 1676. ad OLDEMBURGIIUM datis, cum LEIBNITIO tum communicandis, (iisdem ferè verbis, saltem leviter mutatis, quæ in illis Litteris habentur;) ubi Methodum hanc LEIBNITIO exponit, tum ante decem annos, nedum plures, ab ipso excogitatam. Quod moneo ne quis causetur de hoc *Calculo Differentiali* nihil à nobis dictum esse.

FRAGMEN.

FRAGMENTUM BREVIARII
 OPERUM WALLISIANORUM
 DATI IN
 ACTIS ERUDITORUM

Mens. Jun. An. 1696. Pag. 257; 258.

Ceterum ipse NEWTONUS, non minus candore quam præclaris in rem mathematicam meritis insignis, publicè & privatim agnovit LEIBNITIUM tum, cum (interveniente celeberrimo Viro *Henrico* OLDEMBURGIO *Bremensi* Societatis Regiæ *Anglicanae* tunc Secretario) inter ipsos, (eiusdem jamtum Societatis socios,) commercium intercederet, id est, jam ferè annos viginti, & ampliùs, Calculum suum differentialem, Seriesque infinitas, & pro iis quoque Methodos generales habuisse; quod WALLISIUS in Præfatione Operum factæ inter eos communicationis mentionem faciens, præterit; quoniam de eo fortasse non satis ipsi constabat.

Ceterum Differentiarum consideratio *Leibnitiana*, cujus mentionem facit WALLISIUS, (ne quis scilicet, ut ipse ait, causaretur de Calculo Differentiali nihil ab ipso dictum fuisse,) meditationes aperuit, quæ aliunde non æquè nascebantur. Est enim Differentia Analyticum quiddam, & Calculi capax, &, quod rei caput est, Summæ reciprocum.

ANIMADVERSIONES NEWTONI

In superius Actorum Lipsiensium Fragmentum.

Afferueram quidem in Epistolis à me datis A. D. decimum tertium Junii, & vicesimum quartum Octobris An. 1676. me adeptum fuisse Methodum Fluxionum aliquot Annos antè; sed nunquam fallus
Is. Newtoni Opuscula, Tom. I. G g g sum

sum LEIBNITIUM habuisse Methodum differentialem ante Annum 1677. Nesciebam, quid sibi tunc tribueret, cum patefacere animum suum cœpisset solummodo Epistolâ datâ A. D. viciesimum primum Junii eodem Anno. Nunquam concessi suam Transmutationum Methodum generalem esse pro Seriebus, neque tunc sciebam eum recepisse Anno superiore ab OLDEMBURGIO Seriem à LEIBNITIO mihi missam, nec illam inventam fuisse à GREGORIO Anno 1611. Methodus Transmutationum non est Methodus obtinendi Series, sed Theorema peculiare, quo una Figura in aliam transmutatur. Talia sunt Theoremata GREGORII, & BAROVII. Scholium adnexum secundo Lemmati secundi libri meorum *Principiorum Mathematicorum*, quod toties malè allatum est contra me, scriptum non fuit, ut hujus Lemmatis gloria LEIBNITIO tribueretur, sed ut mihi assereretur. Utrùm LEIBNITIUS illud post me invenerit, aut ex me mutuatus fuerit, quæstio est nullius momenti, nam secundis Inventoribus nullum jus in Inventâ est.

WALLISIUS Litteris datis Kalendis Decembribus An. 1696, & editis in tertio suorum Operum Tomo LEIBNITIUM monuit de verbis, quæ inferuerat Præfationi primi voluminis, & de quibus supra meminimus; neque tunc LEIBNITIUS inficiatus est, quæ WALLISIUS dixerat, nempe à me illi explicatam fuisse Anno 1676. Methodum Fluxionum, quam inveneram decem, aut pluribus Annis antè; neque de WALLISIO questus est. Ait in Epistolâ datâ A. D. undetricesimum Martii 1697. *De te autem queri nunquam mihi in mentem venit, quem facile apparet nostra in Actis Lipsiensibus prodita non satîs vidisse.* Fatebatur has Methodos esse similes †, ut Wallisius affirmaverat; quamobrem in Epistolâ datâ A. D. duodetricesimum Maii 1697. ait se itaque communi nomine designare solere *Analyseos Infinitesimalis*. Deinde addit, *quemadmodum, & Vietæ, & Cartesiana Methodus Analyseos Speciosæ nomine venit; discrimina tamen nonnulla supersunt: ita fortasse & Newto-*

† En ejus verba *Methodum Fluxionum profundissimi NEWTONI cognitam esse Methodo meâ Differentiali non tantum animadverti, postquam opus ejus, & tuum prodit, sed etiam professus sum in Actis Eruditorum, & alias quoque monui.* Epist. ad Wall. 28. Maii 1697. Vide Comm. Epist. N°. LXXVI. pag. 216. Edit. secundæ.

Newtoniana, & mea differunt in nonnullis. Sic innuens ea differre Additionibus, quibus hæc cumulaverat. Quapropter excusat WALLISIUM, qui de his Additionibus non meminerit, quia ea in *Actis Lipsiensibus prodita non satis viderat*, & testatur sibi de WALLISIO *queri nunquam in mentem venisse* quâcumque aliâ de causâ.

Sed, si CARTESIUS nunquam se asseruit Auctorem *Analyseos speciosa Vietæ*, aliter se gessit LEIBNITIUS circa Methodum Infinitesimalem, quam semper appellavit suam Methodum; unde FATIUS impulsus est ad sequentia scribenda.

EXCERPTUM

E Libro Nicolai FATII DUILLERII inscripto

*Investigatio Geometrica Solidi rotundi, in quod minima fiat
resistentia.*

Et edito An. 1699.

Quæret forsan Cl. LEIBNITIUS, unde mihi cognitus sit iste Calculus, quo utor. Ejus equidem fundamenta, ac plerasque Regulas proprio Marte anno 1687., circa Mensẽ Aprilem, & sequentes, aliisque deinceps annis, inveni; quo tempore neminem eo Calculi genere, præter me ipsum, uti putabam. Nec mihi minus cognitus foret, si nondum natus esset LEIBNITIUS. Alii igitur gloriatur Discipulis, me certè non potest. Quod satis patebit, si olim Litteræ, quæ inter Clarissimum HUGENIUM meque intercefferunt, publici juris fiant. NEWTONUM tamen primum ac pluribus annis vetustissimum hujus Calculi Inventorem, ipsâ rerum evidentiâ coactus agnosco; à quo utrùm quicquam mutuatus sit LEIBNITIUS, secundus ejus Inventor, malo eorum, quàm meum sit Judicium, quibus visæ fuerint NEWTONI Litteræ, aliisque ejusdem Manuscripti Codices. Neque modestioris NEWTONI silentium, aut prona LEIBNITII sedulitas, inventionem hujus Calculi sibi passim tribuentis, ullis imponet, qui ea pertractârint, quæ ipse evolvi, Instrumenta.

